

qQE
821
P78
1890
INVZ

W

565.57
P48

9 QE
821
P78
1890
IMVZ

Beiträge zur Naturkunde Preussens

herausgegeben

von der

Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft zu Königsberg.

—❧— 7. —❧—

Die

Trilobiten-Fauna

der

Ost- und Westpreussischen Diluvialgeschiebe

von

^{Josef}
J. F. Pompecki.


Mit 6 lithographierten Tafeln.

—❧—

Königsberg in Pr.

In Kommission bei Wilhelm Koch.

1890.



191868

Vorliegende Arbeit soll den Zweck erfüllen, den Sammlern von Diluvialgeschieben unserer Provinzen ein bequemes Hilfsmittel zur Bestimmung der in denselben gefundenen Trilobiten zu liefern. Sie soll es dabei überflüssig machen, auf die bisher zum Bestimmen dieser Trilobiten unumgänglich notwendigen Specialwerke zurückgehen zu müssen, welche sich der Sammelnde in der Regel nicht anzuschaffen vermag. Sie soll also, indem sie auf solche Weise das Bestimmen der gefundenen Dinge ermöglicht, überhaupt zum weiteren Sammeln anregen.

Um dem gedachten Zwecke vollständig zu dienen, sind neben genauen Beschreibungen sämtlicher, mir aus unseren Geschieben bekannten Trilobitenformen, soweit es irgend thunlich war, auch Abbildungen aller Formen gegeben.

Das Material, auf welches ich meine Untersuchungen stützte, gehört den Sammlungen des Mineralogischen Instituts der Universität Königsberg, des Provinzial-Museums zu Königsberg, der Herren Dr. Vanhöffen-Wehlau, Dr. Gagel-Königsberg, Dr. Kiesow-Danzig, Lehrer Zinger-Pr. Holland und Konrektor Seydler-Braunsberg.

Zu ganz besonderem Danke für Unterstützungen bei der vorliegenden Arbeit bin ich verpflichtet:

Dem Direktor des hiesigen Mineralogischen Instituts, Herrn Prof. Dr. Branco, welcher mich mit der Ausführung der vorliegenden Arbeit betraute und mir in liebenswürdigster Weise die Sammlungen des Mineralogischen Instituts zur Verfügung stellte. Herrn Prof. Dr. Branco verdanke ich ausserdem vielfache Unterstützungen bei der oft sehr schwierigen Beschaffung der einschlagenden Litteratur;

Herrn Prof. Dr. Jentzsch, durch welchen mir die reichhaltigen Sammlungen und die wertvolle Bibliothek des Provinzial-Museums zu Königsberg zugänglich wurden;

Herrn Prof. Dr. Chun für die Ueberweisung der Litteratur über Trilobiten aus der Bibliothek des hiesigen Zoologischen Instituts;

Ferner den Herren Dr. Vanhöffen, Dr. Gagel, Dr. Haase, welche mir ihre Unterstützung in dankenswertester Weise zu teil werden liessen; den Herren Dr. Kiesow, Lehrer Zinger und Konrektor Seydler, welche mich ihre wertvollen Trilobitensammlungen benutzen liessen.

Herr Prof. Lindström in Stockholm war so liebenswürdig, mir auf mehrere an ihn gerichtete Fragen in bezug auf einzelne zweifelhafte Geschiebe und Arten gütige Auskunft zu erteilen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen wärmsten Dank ausspreche.

Königsberg, im Juli 1890.

Die Trilobiten der palaeozoischen Diluvialgeschiebe der Provinzen Ost- und Westpreussen sind bereits mehrfach in der Litteratur der Geologie und Palaeontologie der Norddeutschen Tiefebene erwähnt worden. Ausser den Arbeiten von Jentzsch¹⁾ Nötling,²⁾ Römer,³⁾ Kiesow,⁴⁾ welche die Trilobiten nur insoweit berücksichtigten, als

1) Jentzsch: „Uebersicht der silurischen Geschiebe Ost- und Westpreussens.“ Zeitschr. d. geol. Ges. 1880. Bd. XXXII.

2) Nötling: „Die Cambrischen und silurischen Geschiebe der Provinzen Ost- und Westpreussen.“ Jahrb. d. K. pr. geol. Landesanstalt 1882. pag. 261 ff.

3) Römer: „Lethaea erratica.“ Dames u. Kayser. Pal. Abhandl. Bd. II. 1884—85.

4) Kiesow: „Ueber Sil. u. Devon. Geschiebe Westpreussens.“ Schr. d. Naturforsch. Ges. z. Danzig. N. F. Bd. VI. H. I.

sie zur Alters- und Heimatbestimmung der einzelnen Geschiebe wichtig sind, erschien im Jahre 1874 eine Arbeit Steinhardts,¹⁾ welche sämtliche, damals aus dem Gebiete unserer Provinzen bekannten Trilobitenformen umfasste. Die Arbeit Steinhardts kann heute, nachdem die Erforschung der russischen und skandinavischen Trilobitenfaunen durch Schmidt, Holm und Lindström so wesentlich gefördert ist, kaum mehr als ausreichendes Hilfsmittel zum Bestimmen unserer Trilobitenformen genügen. Ausserdem ist seit dem Erscheinen der Steinhardt'schen Arbeit das Trilobitenmaterial aus den Geschieben unserer Provinzen so erheblich angewachsen, dass wir jetzt eine Fauna von über 140 Formen haben, während Steinhardts Arbeit nur 49 Arten enthält.

Der Gang der vorliegenden Arbeit soll nun der sein, dass im Anschluss an Nöttings Geschiebearbeit in einem „Petrographischen Teile“ diejenigen trilobitenführenden Geschiebe einer Betrachtung unterzogen werden, welche mir seit dem Erscheinen von Nöttings Arbeit als neu bekannt geworden sind, resp. solche, deren Verbreitungsbezirk sich durch neuere Erfunde als ein anderer erweist, als der von Nötling angegebene.

An diesen „Petrographischen Teil“ knüpft sich der „Palaeontologische Teil“, in welchem die sämtlichen, mir bekannten Trilobitenformen aus unseren Provinzen untersucht und beschrieben werden. Die Familien der Phacopiden, Cheiruriden, Lichiden, Illaeniden konnten mit Hilfe der wichtigen Arbeiten Schmidts²⁾ und Holms³⁾ ohne grössere Schwierigkeiten bearbeitet werden; bei anderen, so namentlich bei der Familie der Asaphiden, über die es bis jetzt eine zum Teil nur mangelhafte Literatur giebt, sah ich mich mehrfach genötigt, neue Arten aufzustellen.

In bezug auf das Alter der Trilobiten kommen in den Provinzen Ost- und Westpreussen nur Geschiebe vom Alter des Cambrium und Silur in betracht. Eine einzige typisch devonische Form, *Phacops latifrons*, liegt mir in einem angeblich aus Ostpreussen stammendem Stücke vor; doch da mir aus den Heimatsgebieten unserer Geschiebe weder diese Form, noch ein derartiges Gestein, wie das des betreffenden ostpreussischen Stückes bekannt ist, erwähne ich diese Art nur mit aller Reserve. (S. S. 9.)

Was die Heimat unserer Trilobiten anbetrifft, so ist diese, wie die aller unserer palaeozoischen Geschiebe auf die Ostseeprovinzen Russlands, auf Schweden und auf ein jetzt vom Meere bedecktes Mittelgebiet, das „Balticum“, zurückzuführen. Auf dieses Balticum beziehe ich Formen, welche bis jetzt aus Schweden und Russland unbekannt sind, resp. solche, deren Gesteinsmaterial nicht mit dem in den genannten Ländern als anstehend bekannten übereinstimmt. Immerhin ist es möglich, dass Formen unserer Geschiebe, welche bisher noch nirgendwo anstehend gefunden sind, doch noch in Estland oder Schweden gefunden werden; denn so genau sind

1) Steinhardt: „Die bis jetzt in pr. Gesch. gef. Trilobiten.“ Beiträge zur Naturk. Preussens St. 3. 1874.

2) Fr. Schmidt: „Revision der Ostbaltischen Silurischen Trilobiten“, in Mémoires d. l'Ac. imp. d. sciences de St. Petersb. I. Phacopiden, Cheiruriden, Eucrinuriden. 1882. II. Acidaspiden, Lichiden. 1885. III. (G. Holm): Illaeniden. 1886.

3) G. Holm: „De Svenska arterna af Trilobitstägnet Illaenus“. Beh. t. K. Svenska Vet.-Ak. Staudlingar. 1882. Bd. VII, Nro. 3.

die Heimatsgebiete unserer Geschiebe wohl kaum schon durchforscht, dass man sagen dürfte: die eine oder die andere Form unserer Geschiebe kommt weder in Russland, noch in Schweden vor, sie muss also auf ein Mittelgebiet bezogen werden. Eine derartige Angabe hat also nach dem jetzigen Standpunkt der Erfahrung nur die Wahrscheinlichkeit nicht aber absolute Gewissheit für sich.

A. Petrographischer Teil.

I. Cambrische Geschiebe.

1. Schwarzer Stinkkalk mit *Agnostus pisiformis* Linné.¹⁾

Nötling erwähnt schwarzen Stinkkalk mit *Agn. pisiformis* aus Westpreussen. Ausser einem angeblich von Neukuhren stammenden Stücke bereits stark verwitterten Stinkkalkes lag mir noch ein Stück desselben Alters von Schettניהnen bei Braunschweig (Ostpreussen) vor.

Das Heimatsgebiet ist Schweden.

2. Schwarzer Stinkkalk mit *Agnostus pisiformis* Linné var. *socialis* Tullb. und *Olenus truncatus* Boeck.²⁾

Ein sehr grosses Geschiebe feinkörnigen, schwarzen Stinkkalkes, welches beim Zerschlagen einen ausserordentlich stark bituminösen Geruch verbreitete, war dicht angefüllt mit Resten von *Olenus truncatus* Boeck und *Agn. pisiformis* Linné var. *socialis* Tullb. Beide Formen kamen jedoch nicht mit einander vermischt vor; das Geschiebe liess vielmehr zwei Zonen unterscheiden, eine, in welcher allein *O. truncatus* — namentlich auf Schichtflächen — in grossen Massen vorkam, und eine zweite, welche ganze Nester von *Agn. pisiformis* var. *socialis* enthielt.

Fundort: Bäckermühle bei Marienwerder, Westpreussen.

Heimat: Nach einer Mitteilung des Herrn Prof. Lindström stimmt das Gestein auffallend mit dem Alaunschiefer (*Olenusschiefer*) Westgotlands überein; Schweden ist daher als Heimat des Geschiebes 2 zu betrachten.

3. Schwarzer Stinkkalk mit *Peltura scarabaeoides* Wahlenberg und *Sphaerophthalmus alatus* Boeck.

Ein plattenförmiges zum Theil sehr feinkörniges Geschiebe schwarzen Stinkkalkes enthielt neben Kopfschildern von *Pelt. scarabaeoides* solche von *Sphaer. alatus*.

Fundort: Bäckermühle bei Marienwerder, Westpreussen.

Heimat: Das Geschiebe ist auf die in Schweden weit verbreitete obere Zone des *Olenusschiefers* zurückzuführen.^{3) 4)}

1) cfr. Nötling. l. c. pag. 267.

2) Nötling erwähnt l. c. pag. 268 dieses Geschiebe nach einer Mitteilung des Herrn Prof. Jentzsch als typischen *Agnostuskalk*.

3) Remelé: Unters. üb. d. versteinierungsf. Diluvialgesch. d. Nordd. Flachlandes. St. I, pag. 45, 59, 82.

4) Römer: Leth. erratica. pag. 35.

3a. Schwarzer Stinkkalk mit *Peltura scarabaeoides* Wahlenberg.

Ein kleines, plattenförmig spaltendes Geschiebe, das durch Verwitterung bereits fast ganz braun gefärbt ist, zeigt einzelne Kopfschilder von *Pelt. scarabaeoides*, durch welches Fossil das Geschiebe als demjenigen der No. 3 ungefähr gleichalterig bestimmt wird.

Fundort: Pr. Holland, Ostpreussen.

Heimat: jedenfalls, wie bei No. 3, Schweden.

II. Untersilurische Geschiebe.

a) Schichtengruppe B. Fr. Schmidts.

α) Glaukonitkalk. B₂.

1. Nötling¹⁾ erwähnt unter No. 5c. seiner Arbeit ein Geschiebe „buntfarbigen, etwas erdigen mürben Glaukonitkalkes mit grossen dunkelgrünen Glaukonitkörnern.“ Dasselbe sollte nach Nötling enthalten:

Orthisina cf parva.

Megalaspis sp.

Niobe sp.

Mir lag dasselbe Stück vor: es enthielt neben ganz unbestimmbaren Bruchstücken einer Asaphidenart, die möglicherweise zu *Megalaspis* gehören kann,

Orthis Christianiae Kjerulf

Amphion priscus n. sp.

Fundort: Belschwitz in Westpreussen.

Heimat: Das Geschiebe ist auf Schweden zurückzuführen.²⁾

2. Roter Kalk mit Endoceren. In Bezug auf die Nötlingschen³⁾ Varietäten a und c kann ich die Mitteilung Vanhoeffens,⁴⁾ der beide Varietäten auch aus Ostpreussen erwähnt, während sie nach Nötling nur in Westpreussen vorkommen, bestätigen, da neuerdings derartige Geschiebe namentlich in der Umgegend von Königsberg häufiger gefunden worden sind.

Ein der Varietät a Nötlings entsprechendes Geschiebe — braunroter, erdiger ziemlich weicher Kalk, von zahlreichen, bräunlich gefärbten Kluftflächen durchsetzt — enthielt neben Resten von *Megalaspis limbata* Boeck ein Schwanzschild von

Holometopus? laevis n. sp.

Die Heimat der roten Endocerenkalke ist Schweden, resp. Oeland.

b) Schichtengruppe D. Fr. Schmidts.

α) Jewesche Schicht D.

Zu Nötling 10 a⁵⁾ erwähne ich ein sehr grosses Geschiebe dichten grauen Kalksteins, der sehr an Echinospaeritenkalk erinnert; es enthielt:

1) Nötling. l. c. pag. 271.

2) Römer. l. c. pag. 36.

3) Nötling. l. c. pag. 273, 274.

4) Vanhoeffen: „Einige für Ostpreussen neue Geschiebe.“ Zeitschr. d. d. geol. Ges. Jahrg. 1886. Sep.-Abdr. pag. 2.

5) Nötling l. c. pag. 281.

Strophomena tenuistriata Murch.

Bellerophon sp.

Monograptus sp.

Illaenus sp.

Asaphus Branconis n. sp.

Das betr. Geschiebe wurde in Craussen bei Königsberg gefunden. Geschiebe dieser Art sind sowohl in Ost- als Westpreussen nicht selten.

Heimat: Estland.

β) Kegelsche Schicht D₂.

Nötling¹⁾ kennt kein Geschiebe dieses Alters, während sie jetzt in beiden Provinzen mehrfach gefunden sind. Es sind gelbgraue bis braune, ziemlich feste, oft etwas mergelige Kalke mit dunkelbraunen Kluftflächen, welche zahlreiche, allerdings meistens schlecht erhaltene Bruchstücke von *Phacops maxima* Fr. Schmidt enthalten.

Die Heimat dieser Geschiebe ist Estland.

Nötling erwähnt a. a. O. bei der Besprechung der Kegelschen Schicht eine Mitteilung Schmidts über *Phacops Kegelsensis* Schmidt aus einem ostpr. Geschiebe. Ich hatte Gelegenheit, das betreffende Geschiebe von Kaidau-Ostpreussen zu untersuchen. Dasselbe gehört der Sammlung des hiesigen Provinzialmuseums; es enthält neben *Ph. Kegelsensis* Bruchstücke von *Asaphus jevensis* Fr. Schmidt und besteht aus hellgrauem dichtem Kalk vom Alter der Jeweschen Schicht D₁.

γ) Backsteinkalke^{2) 3)}.

Mehrere Geschiebe dieser Art lagen mir vor:

1. Ein ziemlich grosses Geschiebe typischen Backsteinkalkes enthielt:

Illaenus jevensis Holm,

Mastopora concava Eichwald,

Murchisonia sp.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg.

2. Ein kleines Geschiebe, welches erst zum teil in Backsteinkalk umgewandelt war und noch einen Kern bläulich grauen, kieseligen Gesteins zeigte, welches lebhaft an das der Lyckholmer Schicht erinnerte; dasselbe enthielt neben *Mastopora concava* Eichw. das Schwanzschild einer *Encrinurus*art, welche dem *Encrinurus Seebachi* Fr. Schmidt (vergl. pag. 39) nahe steht.

Fundort: Mewe-Westpreussen.

3. Ein weiteres kleines Geschiebe, das bereits ganz in Backsteinkalk umgewandelt war, enthielt eine *Glabella* von *Cheirurus* cf. *Plautini* Fr. Schmidt.

Fundort: Wehlau-Ostpreussen.

Das Alter und die Heimat der Backsteinkalke sind nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Die Varietät 1 wird durch *Illaenus jevensis* sicher als der Jeweschen

1) Nötling l. c. pag. 284.

2) cf. Nötling l. c. pag. 283.

3) cf. Kiesow. Sil. u. Devon. Geschiebe Westpreussens, pag. 11.

Schicht gleichalterig bestimmt und entweder auf Estland selbst oder im Nachbargebiet des Balticums zurückgeführt. Für die Varietäten 2 und 3 können weder Alter noch Heimat näher bestimmt werden.

c) **Wesemberger Schicht E. Fr. Schmidts.**

Nötling¹⁾ erwähnt unter No. 16 ein kleines Geschiebe „blutroten, sehr harten, splittrigen Kalkes vom Habitus des Wesemberger Gestein“ mit *Encrinurus* sp. Ein ganz ähnliches Geschiebe wurde bei Königsberg gefunden; es enthielt neben einem ganz übereinstimmenden *Pygidium*, das ich als *Encrinurus* cf. *Seebachi* bestimmte, *Orthis insularis* Eichw.

Beide Geschiebe stammen aus Ostpreussen; sie sind der Wesemberger Schicht gleichalterig zu erachten.

Heimat: Weder Estland noch Schweden besitzen eine entsprechende *Encrinurus*-art, die Geschiebe sind daher wohl auf das Balticum zurückzuführen.

d) **Schichtengruppe F. Fr. Schmidts.**

α) **Lyckholmer Schicht F.**

Gesteine vom Alter der Lyckholmer Schicht F. und zwar die Nötlingsche Varietät 1:²⁾ „weisser dichter kieselreicher Kalk, ähnlich dem Wesemberger, mit wenig Korallen, wohl ident mit Römers Sadewitzer Gestein“ sind auch in Westpreussen gefunden, während Nötling sie nur aus Ostpreussen kennt. Geschiebe dieser Art enthalten vornehmlich *Asaphus platyrhachis* Steinh. und *Chasmops Eichwaldi* Fr. Schmidt.

Heimat: Estland.

e) **Untersilurische Geschiebe unbestimmbaren Alters.**

1. Hellgelber, feinkörniger, zum Teil etwas mergeliger Kalk mit weissen Kalkspathausscheidungen.

Einmal wurde ein derartiges Geschiebe bei Königsberg gefunden. Es enthielt zwei Trilobitenformen, welche nach den vorhandenen Bestimmungen mit keiner der bekannten Arten übereinstimmen; ich nannte sie:

Asaphus obtusus n. sp.

und *Holometopus? radiatus* n. sp.

Die Schale der Trilobiten ist vollkommen weiss. Das Gestein ähnelt auffallend manchen obersilurischen Kalken; doch das Vorkommen einer *Asaphus*-art lässt es unzweifelhaft erscheinen, dass es untersilurischen Alters ist.

Heimat: Weder aus Estland noch aus Schweden ist mir ein entsprechendes Gestein bekannt, ich kann das vorliegende Geschiebe daher nur auf das Balticum beziehen.

2. Dunkelgelbgrauer, dichter bis körniger Kalk mit farblosen Kalkspathausscheidungen und mit dendritischen Ausscheidungen von Manganoxiden auf den Kluftflächen.

1) cf. Nötling l. c. 287.

2) Nötling l. c. pag. 288.

Mehrere Geschiebe dieser Art lagen vor. Sie enthielten neben
Strophomena sculpta Gagel
 und *Strophomena pecten* Linné

den Abdruck eines kleinen Phacopidenschwanzschildes und reichliche Bruchstücke einer Asaphidenart, für deren Bestimmung ich leider keinen Anhalt finden konnte. Würde das Geschiebe nicht durch die vorhandenen Bruchstücke von *As. sp.* als untersilurisch charakterisiert sein, so würde das Auftreten der beiden Brachiopodenformen für ein Obersilurisches Alter sprechen; wahrscheinlich gehört es einer Grenzschiebt zwischen Unter- und Obersilur an.

Fundort: Pr. Holland in Ostpreussen.

Heimat: Weder aus Estland noch aus Schweden habe ich ein ähnliches Gestein erwähnt gefunden, es stammt also wahrscheinlich aus dem Balticum.

3. Braungrauer körniger Kalk von quarzitähnlichem Aussehen.

Nur ein kleines Geschiebe dieser Art liegt mir vor. Es enthielt ein Schwanzschild einer kleinen *Illaenus*-art, die ich mit keiner der vorhandenen Bestimmungen in Einklang bringen konnte. Um der vorzüglich ausgeprägten Merkmale des Schwanzschildes willen habe ich auf dasselbe eine neue Art begründet, für welche ich den Namens *Illaenus nuculus* vorschlage (cf. pag. 69). Ebensowenig, wie mir eine entsprechende *Illaeniden*-form aus dem baltischen Silur bekannt ist, habe ich Nachrichten über ein gleichartiges Gestein gefunden.

Fundort: Ostpreussen ohne nähere Ortsangabe.

Heimat: Das vorliegende Geschiebe ist wie die beiden vorhergehenden auf das Balticum zurückzuführen.

III. Obersilurische Geschiebe.

a) Geschiebe vom Alter der unteren Oeselschen Schicht I und der unteren und mittleren Gotländischen Schichten.

Nötling¹⁾ führt zwei Gesteinsvarietäten dieses Alters, von denen die eine, b, mehrfach gefunden ist; Nötling charakterisiert sie die „Blaugraue weiche Kalke oder Kalkmergel“ mit *Encrinurus punctatus* und *Ptilodictya sp.* Derartige Geschiebe enthielten ausser den von Nötling genannten Versteinerungen noch andere, welche einen wesentlicheren Anhalt zur Heimatbestimmung derselben lieferten. Wir können darin unterscheiden:

1. Blaugraue mergelige Kalke mit *Encrinurus punctatus*, sowohl in Ost- als Westpreussen gefunden.

Heimat: Das Obersilur Estlands wie Schwedens.

2. Blaugrauer, mergeliger Kalk mit *Lichas Salteri* Fletcher, einmal in Ostpreussen bei Gumbinnen gefunden.

Heimat: Gotland.

3. Grauer, mergeliger Kalk mit *Proetus verrucosus* Lindstr., einmal bei Belschwitz in Westpreussen gefunden.

Heimat: Gotland.

1) cf. Nötling l. c. pag. 294.

b) Graptolithengestein.

Zu dem von Nötling¹⁾ nur aufgezählten Graptolithengestein möchte ich bemerken, dass dasselbe keineswegs den höchsten obersilurischen Schichten gleichalterig ist, wie Nötling angiebt, sondern dass es ungefähr der Gotländer Zone c²⁾ gleichzustellen ist.

Graptolithengesteine sind sowohl in Ost- als Westpreussen gefunden.

Ihre Heimat ist das Balticum.

Kiesow erwähnt³⁾ von Trilobiten aus dem Graptolithengestein allein *Calymene Blumenbachi* Brongn.

Mir lag nur einmal ein trilobitenführendes Stück dunkel graugrünen Graptolithengesteins von Pr. Holland-Ostpreussen vor, dasselbe enthielt; *Acidaspis mutica* Emmer. und *Cyphaspis* sp.

c) Geschiebe vom Alter der Oberen Oeselschen Schicht H.

1. Braunlich grauer, feinkörniger Kalk mit:

Atrypa reticularis Linné,
Strophomena Pompeckii Gagel,
Lichas aranea Lindström,
Encrinurus punctatus Wahlenbg.

Einmal bei Marienwerder in Westpreussen gefunden.

Heimat: Das Geschiebe wird durch *Lichas aranea* als gotländischen Ursprungs bestimmt. Lindström⁴⁾ erwähnt die Art *Lichas aranea* von Färö aus seiner Zone d, die den ältesten Schichten der Oberen Oeselschen Gruppe Estlands gleichalterig ist.

2. Grauer, etwas mergeliger Kalk, an Beyrichienkalk erinnernd, mit:

Encrinurus punctatus Wahlenb.,
Calymene intermedia Lindstr.,
Cheirurus dubius n. sp.
Cybele sp. b.,⁵⁾
Beyrichia Buchiana var. *nutans* Kiesow,
Atrypa reticularis Linné,
Ptilodictya sp.

Nur einmal bei Rosenberg in Westpreussen in einem kleinen Geschiebe gefunden.

Als Heimat dieses Geschiebes muss das Balticum erachtet werden.

3. Rötlicher, sehr harter Kalkstein mit Ausscheidungen von weissem Kalkspath.

Zwei Geschiebe dieser Art liegen vor. Sie enthalten neben zahlreichen Korallenresten und Crinoidenstielen

Atrypa marginalis Dalm.
und *Lichas Lindströmi* n. sp.

Fundort: Wehlau in Ostpreussen.

1) cf. Nötling l. c. pag. 305.

2) cf. Lindström: „Ueber die Schichtenfolge des Silur auf der Insel Gotland. Neues Jahrb. 1888. pag. 163.

3) cf. Kiesow l. c. pag. 19.

4) cf. Lindström, „Förteckning på Gotlands siluriska Crustaceer.“ pag. 94.

5) vergl. *Cybele* sp. b. pag. 38. Taf. VI, Fig. 35.

Herr Prof. Lindström, welcher die Liebenswürdigkeit hatte, das betreffende Geschiebe zu begutachten, teilte mir mit, dass auf Gotland auf der Anhöhe Sandarfve ein ganz ähnlicher, doch etwas weicherer Kalk vorkäme; es würde unseren beiden Geschieben, falls sie dem Kalk von Sandarfve gleichaltrig sind, dann das Alter der obersten gotländischen Zone h zuzuschreiben sein. Ihre Heimat ist wohl das Balticum in der Nähe Gotlands.

Obersilurischen Alters ist ferner ein Geschiebe von Dirschkeim Ost-Preussen. „Lichtgrüner, sehr harter, dichter Kalk mit *Phacops caudata* Emmr.“

Nötling¹⁾ stellt dieses Geschiebe zu den Gesteinen vom Alter der Wesenberger Schicht. Soweit mir bekannt, gehört *Phacops caudata* nur dem Obersilur an. Lindström²⁾ erwähnt die Art aus den Mergelschiefern Gotlands vom Alter seiner Zone c. Salter³⁾ kennt seine *Phacops vulgaris* auch nur aus dem Obersilur, und zwar dem Wenlocklimestone, welcher ungefähr der Lindströmschen Gotländer Zone d entspricht. Aus welchem Grunde Nötling das betr. Geschiebe der Wesenberger Schicht zuzählt, geht aus seiner Arbeit nicht hervor. Die von Nötling an dieses Geschiebe geknüpfte Bemerkung, dass die Untersuchungen Fr. Schmidts das Fehlen der *Phacops caudata* in Estland erwiesen haben, schliesst auch aus, dass Nötling durch eine Angabe Nieszkowskis,⁴⁾ welcher eine *Phacops caudata* von Jewe und Wesenberg beschreibt, irre geleitet sein kann. Die Bestimmung Nieszkowski's hat sich nach Schmidt⁵⁾ als irrig erwiesen; die betr. Schwanzschilder gehörten keiner Art der im Untersilur Schwedens und Estlands überhaupt fehlenden Untergattung *Dalmania*, sondern einer *Peterygometopus*art an. Ist so als unzweifelhaft erwiesen, dass Geschiebe mit *Phacops caudata* nicht untersilurischen Alters sein können, so fehlt noch die genauere Heimatsbestimmung des vorliegenden Geschiebes.

Wie bereits erwähnt kommt *Phacops caudata* in der Zone c des gotländischen Obersilurs vor. Die Gesteinsbeschaffenheit des vorwiegenden Stückes schliesst aus, dass es von Gotland selbst herzuleiten ist; es gehört jedenfalls einem der Insel Gotland benachbarten Gebiete des Balticums an.

Von Herrn Konrektor Seydler wurde mir ein Geschiebe übersandt, welches unzweifelhaft den echten *Phacops latifrons* Burm. enthielt. Ein Vergleich des vorliegenden Fossils mit den Exemplaren aus dem Devon der Eifel zeigte eine vollkommene Uebereinstimmung des mir vorliegenden Exemplares mit jenen. Das Gesteinsmaterial unseres Stückes ist dichter, dunkelgrauer nicht sehr harter Kalk, der in seinem Aussehen auffallende Aehnlichkeit mit den eifeler Kalken, in denen *Phacops latifrons* gefunden wird, zeigt. Die in unseren Provinzen gefundenen devonischen Geschiebe zeigen dagegen stets einen anderen Gesteinscharakter als das vorliegende Stück, es sind meistens Sandsteine, Dolomite und dolomitische Kalke. Ebenso wenig,

1) cf. Nötling: l. c. pag. 286.

2) cf. Lindström: Förteckn. pag. 93.

3) cf. Salter: a monograph. pag. 54.

4) cf. Nieszkowski: „Versuch einer Monographie der i. d. sil. Sch. d. Ostseeprovinzen vork. Trilobiten.“ Arch. f. Naturk. Liv-, Est-, Kurlands. Ser. I. Bd. I. pag. 26.

5) cf. Fr. Schmidt: Rev. I, pag. 92.

wie ich das Gestein mit dem unserer devonischen Geschiebe übereinstimmend gefunden habe, ist mir eine wirklich authentische Nachricht über das Vorkommen von *Phacops latifrons* in Russland bekannt.¹⁾ Es bleibt also wohl sehr zweifelhaft, ob das betr. Stück wirklich ein Ostpreussisches Geschiebe ist; dass es in Ostpreussen gefunden ist, muss ich auf die Mitteilung des Herrn Seydler hin annehmen, trotzdem kann es durch irgend welchen Zufall hierher verschleppt worden sein.

Als Fundort gab Herr Konrektor Seidler die Umgegend von Braunsberg an. Steinhardt²⁾ erwähnt aus der Mascke'schen Sammlung eine schlechte Glabella, die er zu *Phacops latifrons* stellt. Es ist aus Steinhardt's Beschreibung und Abbildung kaum zu entscheiden, was für eine Art ihm vorgelegen hat.

Im vorstehenden sind 23 Geschiebearten besprochen worden, von denen 11 im Gebiete beider Provinzen neu sind. Die Verteilung und mutmassliche Heimat der neuen Geschiebe erläutert folgende Tabelle:

	Ost- Preussen.	West- Preussen.	Estland.	Balticum.	Schwe- den.
I. Cambrium.					
1. Stinkkalk m. <i>Agnostus pisiformis</i> var. <i>socialis</i> Tullb. u. Ol.					
truncatus Böck	—	+	—	—	+
2. Stinkkalk m. <i>Pelt. scarab.</i> u. <i>Sphaer. alatus</i> Böck	—	+	—	—	+
3. Stinkkalk m. <i>Peltura scarab.</i> Wahlb.	+	—	—	—	+
II. Untersilur.					
4. Gelber Kalk mit <i>As. obtusus</i> n. sp. und <i>Hol? radiatus</i> n. sp.	+	—	—	+	—
5. Brauner Kalk mit <i>As. sp.</i> , <i>Stroph. pecten</i> Linné u. <i>Stroph. sculpta</i> Gag.	+	—	—	+	—
6. Quarzitähnl. Kalk mit <i>Ill. nuculus</i> n. sp.	+	—	—	+	—
III. Obersilur.					
7. Mergeliger Kalk m. <i>Lich. Salteri</i> Fletch.	+	—	—	—	+
8. „ „ m. <i>Proët. verrucosus</i> Lindstr.	—	+	—	—	+
9. Bräunlicher körniger Kalk m. <i>Lichas aranea</i> Lindstr.	—	+	—	—	+
10. Grauer mergel. Kalk mit <i>Cal. intermed.</i> Lindstr. <i>Cheir. dubius</i> n. sp. <i>Cybele</i> sp. etc.	—	+	—	+	—
11. Roter harter Kalk mit <i>Lich. Lindströmi</i> n. sp. und <i>Atrypa marginalis</i> Dalm.	+	—	—	+	—
	6	5	—	5	6

Ausserdem konnten neuere Fundorte nachgewiesen werden für:

1. Typischen *Agnostuskalk*: Braunsberg Ostpr.
2. Roten *Endocerenkalk*: Ost- und Westpreussen; Nötling kennt ihn nur aus Westpreussen.

1) Das von Eichwald in Leth. rossica pag. 1428 angegebene Vorkommen von *Phacops latifrons* in Estland beruht mindestens auf einem Irrtum dieses Autors.

2) cf. Steinhardt: l. c. pag. 12. Taf. I. Fig. 1.

3. Kegelsches Gestein: Ost- und Westpreussen; Nötling kennt derartige Geschiebe überhaupt nicht.
4. Backsteinkalke: Ost- und Westpreussen; Nötling behauptete, sie fehlten in Ostpreussen wahrscheinlich ganz.

Es ergab sich endlich bezüglich des Alters einiger der von Nötling beschriebenen Geschiebe das Folgende:

1. Das Geschiebe mit *Phacops Kegelensis* Fr. Schmidt gehört nicht der Kegelschen, sondern der Jeweschen Schicht an;
2. Das Graptolitengestein entspricht nicht dem obersten Obersilur, sondern den mittleren Gotländer Schichten;
3. Das von Nötling citierte Geschiebe mit *Phacops caudata* gehört keineswegs der Wesenberger Zone E. Fr. Schmidts an, sondern ist der Lindströmschen Gotländer Zone c des Obersilurs als gleichalterig zu erachten.

B. Palaeontologischer Teil.

Im folgenden reihe ich die Trilobiten nach dem Auftreten und Verlauf der grossen Gesichtsnah des Kopfschildes aneinander und stelle die Gattungen mit gleichem oder sehr ähnlichem Verlauf dieser Naht in Gruppen, Familien, zusammen. Ich verkenne nicht, dass eine derartige Gruppierung etwas sehr gekünsteltes haben wird, indem oft vielleicht ähnlich aussehende Formen von einander getrennt werden. Ich beabsichtige aber auch durchaus nicht, hiermit ein System der Trilobiten aufzustellen, sondern will nur im Sinne der Aufgabe dieser Arbeit ein bequemes Hilfsmittel geben, die Trilobiten unserer Geschiebe zu bestimmen.

Ein System, wie das von Quenstedt¹⁾ nach der Anzahl der Leibesringe aufgestellte, würde unseren Zwecken kaum gute Dienste leisten. Ebenso wenig kann das System Barrandes,²⁾ welcher namentlich die Beschaffenheit der Pleuren zur Klassifizierung der Trilobiten benutzt, den Sammlern von Geschiebetrilobiten wesentliche Hilfe leisten, da man die beiden eben genannten Systeme nur dann mit Erfolg anwenden kann, wenn man vollständige Trilobitenkörper findet: diese sind aber in unseren Geschieben so ausserordentlich selten, dass man kaum Gelegenheit haben wird, sich dieser Systeme zu bedienen. Das System von Goldfuss³⁾ nach der Ausbildung der Augen allein ist nicht gerade besonders praktisch, da oft nahestehende Gattungen getrennt und umgekehrt fernstehende zusammengestellt werden.

Da man in unseren Geschieben in den allermeisten Fällen nur einzelne Teile von Trilobiten findet, erachte ich die Ausbildung des Kopfschildes, insbesondere der Gesichtsnah als das am meisten praktische Hilfsmittel zur Gruppierung der Trilobiten

1) cf. F. A. Quenstedt: Handbuch der Petrefactenkunde. III. Aufl. 1885. pag. 428 ff.

2) cf. J. Barrande: Système silurien du centre de la Bohême. Vol. I. prg. 332 ff.

3) cf. Goldfuss: „Systematische Uebersicht der Trilobiten und Beschreibung einiger neuen Arten.“ Neues Jahrb. 1843. pag. 537 ff.

und ordne sie danach, indem ich andere Charaktere nur als nebensächlichere Faktoren für diesen Zweck benutze.¹⁾ So ergibt sich der folgende Schlüssel zum Bestimmen unserer Trilobitengattungen:

I. Ohne Gesichtsnäht, ohne Augen:

Der Leib besteht aus zwei Segmenten; Kopf- und Schwanzschild sind beinahe gleich gestaltet:

I. Fam. **Agnostidae**.

Gatt. *Agnostus*.

II. Mit Gesichtsnäht:

Der Leib besteht aus mehr als zwei Segmenten:

A. augenlose, oder ocellentragende.

- a) Die Gesichtsnäht verläuft in ihrer ganzen Länge auf dem Rande des Kopfschildes; die Augen bestehen aus einzelnen, wenigen Linsen:

II. Fam. **Harpidae**. [Rumpf: 20 u. mehr Segm.]

Gatt. *Harpes*.

- b) Die Gesichtsnäht verläuft auf der Oberseite des Kopfschildes; Augen fehlen vollständig:

III. Fam. **Ampycidae**. [Rumpf: 5 u. 6 Segm.]

Gatt. *Ampyx*.

B. Augentragende. Die Augen sind deutlich facettiert, bis sehr fein netzförmig:

- a) Die Gesichtsnähte gehen vom Seitenrande des Kopfschildes aus:

α) ohne Schnauzennaht:

Die Gesichtsnähte stossen auf dem Vorderrande zusammen; Schnauzennaht und -schild fehlen. Augen gröb facettiert:

IV. Fam. **Phacopidae**. [Rumpf: 11 Segm.]

Gatt. *Phacops*.

β) Mit Schnauzennaht und -schild:

1. Das Schwanzschild ist weniger als 6 gliederig:

V. Fam. **Cheiruridae**. [Rumpf: 11 (9, 18) Segm.]

Gatt. *Cheirurus*, *Amphion*.

2. Das Schwanzschild ist mehr als 6 (—18) gliederig.

VI. Fam. **Encrinuridae**. [Rumpf: 12, 11 Segm.]

Gatt. *Cybele*. *Encrinurus*.

- b) Die Gesichtsnähte gehen von den Hinterecken aus;

1) Vergl. auch das von Gerstäcker in Bronn's Klassen u. Ordnungen des Tierreichs Bd. V. Arthropoden I, pag. 1238 ff. gegebene System, welches ebenfalls die grosse Gesichtsnäht als erstes Hauptunterscheidungsmittel enthält, bei welchem aber der Autor ausserdem im wesentlichsten die Form der Glabella betont, wodurch er zu einer anderen Gruppierung kommt, als dieses in der folgenden Uebersicht der Fall ist.

VII. Fam. **Calymenidae**. [Rumpf: 13 Segm.]

Gatt. Calymene. Homalonotus.

c) Die Gesichtsnähte gehen vom Hinterrande aus:

α) mit Schnauzennaht und -schild:

1. die Glabella ist ringsum deutlich durch Rückenfurchen begrenzt.

† Schwanzschild fast stets mit Seitenzähnen oder -Stacheln, 2—3gliederig:

* Schwanzschild mit Seitenzähnen, meistens länger als das Kopfschild; Rumpf 11gliederig:

VIII. Fam. **Lichidae**.

Gatt. Lichas.

** Schwanzschild mit Seitenstacheln, stets kürzer als das Kopfschild; Rumpf 9—10gliederig:

IX. Fam. **Acidaspidae**.

Gatt. Acidaspis.

†† Schwanzschild meistens ganzrandig, mehr als 3gliederig;

X. Fam. **Proëtidae**. [Rumpf: 10—17 Segm.]

Gatt. Proëtus, Cyphaspis.

[Phaëtonides].

2. Die Glabella geht nach vorne ohne Begrenzung in die Wölbung des Kopfschildes über.

XI. Fam. **Illaenidae**. [Rumpf: (8, 9), 10 Segm.]

Gatt. Illaenus.

β) Ohne Schnauzennaht und -schild:

1. die Gesichtsnähte stossen auf der Oberseite des Kopfschildes zusammen:

† sie gehen von der Mitte des Hinterrandes über die Augen zum Vorderrande, wo sie in einem Winkel oder Bogen zusammenstossen:

XII. Fam. **Asaphidae**. [Rumpf: 8 Segm.]

Gatt. Asaphus, Megalaspis, [Niobe], Nileus, Holometopus.

†† Sie gehen vom Hinterrande aus den Rückenfurchen aus, begrenzen die Glabella und erreichen den Vorderrand nicht:

XIII. Fam. **Remopleuridae**. [Rumpf: 11 Segm.]

Gatt. Remopleurides.

2. Die Gesichtsnähte stossen auf der Oberseite des Kopfschildes nicht zusammen, sondern überschreiten den Vorderrand:

XIV. Fam. **Olenidae**. [Rumpf: 10 u. mehr Segm.]

Gatt. Olenus. Sphaerophthalmus. Peltura.

In dieser systematischen Uebersicht sind nur diejenigen Gattungen aufgeführt, welche bis jetzt in ost- und westpreussischen Geschieben gefunden sind; es sind 23 an der Zahl, welche sich auf 14 Familien verteilen.

I. Fam.: Agnostidae.

Gattung: **Agnostus Brongniart.**

(Battus: Dalm. Emmr.)

Agnostus pisiformis Linné. Taf. IV. Fig. 23. 23 a.

1822. *Agnostus pisiformis* Brongniart: Hist. nat. d. Crustac. foss. pag. 38. Taf. IV. Fig. 4.

1828. *Battus pisiformis* Dalman: Palaeaden pag. 57. Taf. VI. Fig. 5 a—d.

1869. *Agnostus pisiformis* Linnarsson: Vestergötl. Cambr. och Siluriska Aflagr. pag. 81.
Taf. II. Fig. 50. 51.

1874. *Agnostus pisiformis* Steinhardt: Pr. Trilobiten, pag. 61. Taf. IV. Fig. 17.

1882. *Agnostus pisiformis* Linné in. W. C. Brögger: Sil. Etagen 2 u. 3. pag. 55.

In einem Stück verwitterten Steinkalkes lag mir die typische Form des *A. pisiformis* vor.

Das Kopfschild zeigt eine durch die vorn zusammenfliessenden Rückenfurchen begrenzte, hochgewölbte zungenförmige Glabella, von deren Vorderende eine Stirnfurche zur Randfurche geht. Nur die ersten und dritten Seitenfurchen sind vorhanden. Die ersten Seitenfurchen, senkrecht zur Axe liegend, fliessen zusammen und schnüren einen vorn abgerundeten Stirnlappen ab. Die dritten Seitenfurchen gehen schräg nach innen zum Hinterrande und begrenzen mit den hinten etwas auseinandergehenden Rückenfurchen die kleinen dritten Seitenlappen. Das ungeteilte Mittelstück der Glabella trägt auf seiner höchsten Wölbung die Andeutung einer kleinen kielförmigen Erhöhung. Die durch die Stirnfurche getrennten Seitenteile sind flacher gewölbt als die Glabella.

Leibesringe habe ich nicht beobachten können.

Das Schwanzschild trägt an seinem Hinterrande jederseits einen kurzen nach hinten gewendeten Stachel. Die Spindel, etwa von derselben Form und Grösse wie die Glabella, ist ungefähr um die halbe Breite der Seitenlappen vom Hinterrande entfernt, sie zeigt in ihrem vorderen Teile zwei schwache Querfurchen und einen etwas kräftigeren Kiel als die Glabella. Die Seitenteile sind nicht wie beim Kopfschild durch eine Furche getrennt.

Fundort: Neukuhren, Ostpreussen. Rosenberg, Westpreussen.¹⁾

Nach Linnarsson (Cambr. o. Sil. Aflagr. pag. 81) gehört *A. pisiformis* dem Olenusschiefer (Cambrium) West-Gotlands an.

Ein von Schettניהnen bei Braunsberg stammendes Stück schwarzen cambrischen Stinkkalkes zeigt auf einer Bruchfläche dicht gehäuft Kopf- und Schwanzschilder einer *Agnostus*art, die von *A. pisiformis* in bezug auf die Ausbildung des Schwanzschildes ein wenig abweicht, indem die Querfurchen der Spindel sehr undeutlich sind, und statt der kurzen kieförmigen Erhöhung eine länglich runde kleine

1) cf. Steinhardt l. c. pag. 62.

Warze auftritt. Die Schwanzspindel selbst ist hinten etwas mehr zugespitzt als bei der typischen Form des *A. pisiformis*. Diese Unterschiede schienen mir so unbedeutend, dass ich eine Trennung der beiden Formen nicht für angebracht finde.

***Agnostus pisiformis* Linné. var. *socialis* Tullberg.** Taf. IV. Fig. 24 a b.

1882. *Agnostus pisiformis* L. var. *socialis* Tullberg in W. C. Brögger. Die Silur. Etagen 2 u. 3. pag. 56. Taf. I. Fig. 10 a b c.

Das Kopfschild stimmt mit der vorigen Art fast vollständig überein, es ist im ganzen nur etwas stärker gewölbt, mit einer stärkeren Andeutung des Kieles auf der Mitte der Glabella.

Das Schwanzschild ist durch ganz besonders starke buckelförmige Wölbung der Spindel ausgezeichnet. Nach hinten zu verbreitert sich die Spindel etwas und reicht bis nahe an den Randsaum. Viel deutlicher als bei der Hauptform des *A. pisiformis* treten zwei paar Querfurchen an der Spindel auf, die bis zu dem recht kräftig ausgebildeten Kiele gehen, welcher in eine kurze warzenförmige Spitze ausläuft, die zugleich die Stelle der höchsten Wölbung des Schwanzschildes ist.

Fundort: Bäckermühle bei Marienwerder, in dunklem, fast schwarzem, sehr bituminösem Stinkkalk zusammen mit *Olenus truncatus*. Das Gestein gleicht nach einer Mitteilung des Herrn Prof. Lindström dem Alaunschiefer von Westergötland vollkommen. Das Cambrium Schwedens dürfte wohl die Heimat dieser Art sein.

II. Fam.: Harpidae.

Genus: **Harpes Goldfuss.** Beyr. Barr.

Mir lag kein Vertreter dieser Gattung vor, Steinhardt giebt die Beschreibung und Abbildung der Eichwaldschen Art *H. Spaski* aus einem Geschiebe von Königsberg (Masckesche Sammlung), welche ich hier citiere:

***Harpes Spaski* Eichwald.** Taf. IV. Fig. 29.

1860. *Harpes Spaski* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1375. Taf. LII. Fig. 27 a b.

1874. *Harpes Spaski* Steinhardt: *Pr. Trilobiten* pag. 35. Taf. V. Fig. 6.

Das Kopfschild ist etwa halbkreisförmig, im mittleren Teile hochgewölbt. Der flache Randsaum ist weggebrochen, dafür ist die Oberseite des Umschlages, welcher die den Durchbohrungen des Umschlages entsprechenden Höckerchen (vergl. Steinhardt, pag. 35) zeigt, blosgelegt. Die hochgewölbte Glabella zeigt die dritten schräg nach hinten gerichteten Seitenfurchen; die auf den Wangen sitzenden Augen sind weggebrochen. Nach Fr. Schmidt¹⁾ kommt *H. Spaski* im Echinospaeritenkalk C₁ vor.

III. Fam.: Ampycidae.

Gattung: **Ampyx Dalman.**

Mit Angelin²⁾ unterscheiden wir folgende Untergattungen:

1) Fr. Schmidt: *Rev. d. Ostbalt. Sil. Trilob.* pag. 24.

2) cf. Angelin: *Pal. Scand.* pag. 80.

1. Ampyx Dalm. s. str.: Die Glabella ist gedrungen mit drehrundem Stirnfortsatz und seitlichen Eindrücken. 6 Leibesringel.
2. Lonchodomas Angel: Die Glabella geht allmählich in einen langen Stirnfortsatz über, der einen mehr oder weniger prismatischen Durchschnitt zeigt. 5 Leibesringel.
3. Raphiophorus Angel: Die Glabella geht plötzlich in einen oft kantigen Stirnfortsatz über. 5 Leibesringel.

I. Ampyx Dalman, s. str.

Ampyx foveolatus. Angelin. Taf. IV. Fig. 17. 17a.

1852 (1878). Ampyx foveolatus Angelin: Pal. Scand. pag. 80. Taf. XL. Fig. 2.

Das Bruchstück eines Kopfschildes lag mir vor. Randsaum und Randfurche sind deutlich ausgebildet. Die Glabella ist breit, stark gewölbt, von rechts und links oben etwas zusammengedrückt; nach vorn verjüngt sie sich schnell in eine feine drehrunde etwas nach oben gerichtete Spitze. Jederzeit sind auf der Glabella zwei grubenförmige Vertiefungen vorhanden, die schräg von vorn unten nach hinten oben gehen. Bei ihrer Einmündung in die Nackenfurche sind die Rückenfurchen tiefer eingedrückt.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg.

A. foveolatus wurde in einem dem Echinosphäritenkalk ähnelnden Gestein gefunden. Angelin erwähnt unsere Art aus Dalekarlien.

2. Lonchodomas Angelin.

Ampyx (Lonchodomas) rostratus Sars. Taf. IV. Fig. 18. 19. 20. 21. 21a.

1835. Ampyx rostratus Sars: Ueb. einige neue od. unvollst. bek. Tril. — Okens Jsis. pag. 334. Taf. VIII. Fig. 13.

1854 (78). Lonchodomas rostratus Angelin: Pal. Scand. pag. 82. Taf. XL. Fig. 11.

1874. Ampyx (Lonchodomas) rostratus Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 38. Taf. IV. Fig. 10. Taf. V. Fig. 7a. b.

Das Kopfschild ist länglich dreieckig mit ziemlich langen divergierenden Wangenhörnern. Die hochgewölbte Glabella geht allmählich in einen langen geraden Stirnstachel über. Die Glabella ist gekielt, auf ihrem vorderen Teil und auf dem Stirnfortsatz verläuft eine feine Rinne. Am Grunde der Glabella findet sich zu beiden Seiten des Kieles eine kaum vertiefte kreisförmige Zeichnung, die bei fehlender Schale deutlicher hervortritt. Rückenfurchen mit je einem kurzen Schlitz.

Der Leib besteht aus 5 Ringeln mit flacher, schmaler Spindel und längsgefurchten Pleuren.

Das Schwanzschild ist mehr als dreimal so breit als lang. Die Spindel ist flach gewölbt und ebenso wie die Seitenteile undeutlich gegliedert.

Die Schale ist glatt; am Vorderteile der Glabella und am Stirnstachel treten feine längsgestellte Terrassenlinien auf.

A. rostratus ist mehrfach in Ost- und Westpreussen gefunden worden. Nach

Remelé¹⁾ kommt *A. rostratus* im Chasmopskalk Westergötlands vor (dem obersten Echinospaeritenkalk entsprechend). Aus dem russischen Silur habe ich unsere Art nicht erwähnt gefunden.

3. *Raphiophorus Angelin.*

Ampyx (Raphiophorus) culminatus Angelin. Taf. IV. Fig. 22.

1852 (1878). *Raphiophorus culminatus* Angelin: Pal. Scand. pag. 82. Taf. XL. Fig. 8.

1874. *Ampyx (Raphiophorus) culminatus*. Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 39. Taf. IV. Fig. 11.

Steinhardt beschreibt am angef. Orte eine kleine Glabella, die der Angelinischen Bestimmung von *A. culminatus* vollständig entspricht und welche ich hier citiere. Die nach vorn plötzlich in einen dünnen Stachelfortsatz verlängerte Glabella trägt am Grunde jederseits eine tief eingedrückte Grube.

Die Abbildung Taf. IV. Fig. 22. ist eine Copie der Steinhardtschen Abbildung nach einem Stück der Sammlung des Herrn Mascke, Ostpreussen.

A. culminatus gehört dem Chasmopskalk Westergötlands an.²⁾

Ampyx (Raphiophorus) setirostris Angelin.

1852 (1878). *Raphiophorus setirostris* Angelin Pal: Scand. pag. 81. Taf. XL. Fig. 6.

1874. *Ampyx setirostris* Kiesow: Sil. u. Devon. Gesch. W.-Pr. pag. 85. Taf. IV. Fig. 13.

Ein kleines Schwanzschild zeigt die dieser Art eigene Ausbildung: die Spindel zeigt 6 undeutliche Glieder, während auf den Seitenteilen 4 Pleuren angedeutet sind, welche schwach gefurcht erscheinen.

Länge 4,5 mm, Breite 11 mm, Spindelbreite 3 mm.

Fundort: Königsberg Ostpr. [Königsthal Westpr.]

Das Schwanzschild lag in einem Geschiebe vom Alter des Echinospaeritenkalkes. Seine Heimat ist jedenfalls, wie die der anderen Ampyciden aus unseren Geschieben, in Schweden zu suchen.

IV. Fam.: *Phacopidae.*

Gattung: *Phacops* Emmrich.

Salter³⁾ und Fr. Schmidt⁴⁾ unterscheiden folgende Untergattungen:

1. *Trimerocephalus* M.'Coy.
2. *Phacops* Emmrich s. str.
3. *Acaste* Goldfuss.
4. *Dalmania* Emmrich.
5. *Cryphaeus* Green.
6. *Pterygometopus* Fr. Schmidt.

1) cf. Remelé: Unters. üb. d. versteinierungführenden Diluvialgeschiebe I. St. 1883. pag. 50.

2) cf. Remelé: l. c. pag. 134.

3) cf. J. W. Salter: A. Monograph of. t. Brit. Trilob. pag. 12 ff.

4) cf. Fr. Schmidt: Revis. d. Ostbalt. sil. Trilob.: I pag. 60 ff.

7. Chasmops M'Coy.

8. Monorakos Fr. Schmidt.¹⁾

Von diesen 8 Untergattungen kommen 5 in unseren Geschieben vor (Phacops, Acaste, Dalmania, Pterygometopus, Chasmops); Trimeroccephalus, Monorakos und Cryptaeus sind im baltischen Silur bisher nicht gefunden.

I. Phacops Emmr. s. str.

Bezugnehmend auf das pag. 9 gesagte, gebe ich auf Taf. VI. Fig. 15 u. 15a. die Abbildungen des Kopf- und Schwanzschildes des von Herrn Conrektor Seydler angeblich bei Braunsberg gefundenen Exemplares von Ph. latifrons Burm.

Phacops prussica. n. sp. Taf. I. Fig. 28. 28a.

Zwei Kopfschilder lagen mir vor, die dem Ph. elegans Schmidts²⁾ ziemlich nahe stehen, die ich aber doch einiger besonderer Merkmale wegen nicht mit dieser Art vereinigen konnte.

Das Kopfschild ist abgerundet dreiseitig mit gerundeten Hinterecken. Der Vorderrand ist an den Seiten vor der Glabella etwas eingebuchtet. Der Randsaum ist vorne sehr schmal, nur durch eine feine Furche vom Kopfschild abgeschnürt, nach den Seiten wird er breiter; er ist hier von einer breiteren, flachen Randfurche begleitet, die sich in den Hinterecken mit der Hinterrandfurche vereinigt. Die Rückenfurchen divergieren sehr stark. Die Glabella ist mässig gewölbt, von abgerundet fünfeckiger Form. Die ersten Seitenfurchen bestehen aus zwei im stumpfen Winkel zu einander liegenden Stücken, welche nicht zusammenstossen. Der vordere, tiefere Ast geht von den Rückenfurchen schräg nach hinten; der zweite Ast bildet einen flachen nach vorn gerichteten Bogen und liegt etwa dem Hinterrande parallel; er bildet einen sehr feinen fadenförmigen Eindruck. Die zweiten Seitenfurchen sind ebenso ausgebildet, wie die inneren Aeste der ersten und laufen ihnen parallel. Die dritten Seitenfurchen sind tief, sie gehen von den Rückenfurchen aus und schnüren die Glabella so stark ein, dass deren vorderer Teil gestielt erscheint. Die allein deutlich von der Glabella abgeschnürten dritten Seitenlappen bilden einen schmalen, in gestielten Knöpfchen endenden Ring. Von der Vereinigung der dritten Seitenlappen bis etwa zur Mitte der Glabella geht ein deutlicher Kiel. Die Gesichtsnähte gehen vom Aussenrande aus im Bogen zu den Augen, vor denselben convergieren sie etwas, überschreiten die Rückenfurchen und laufen auf dem Rande des Stirnlappens entlang, um vor demselben im Bogen zusammenzustossen. Die Augen sind ziemlich gross und ragten, wie das eine der Stücke erkennen lässt, kaum über die Glabella hervor; sie sind am Grunde von einer Furche umgeben.

Der Nackenring ist schmal und kaum höher gewölbt als die Glabella. Die Oberfläche ist fast ganz glatt, nur auf dem Stirnlappen sind flache Grübchen zu erkennen. Der Umschlag bildet ein schmales schräg gestelltes Band mit abgerundeter oberer Kante.

1) cf. Fr. Schmidt: Ueber einige neue ost-sibirische Trilob. u. verw. Tierformen. Bullet. d. l'Acad. imp. d. sc. d. St. Petersburg. XXX. 1886. pag. 506.

2) cf. Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 72.

Maasse des Kopfes: Länge 13 u. 8 mm, Breite 22 u. 14 mm, Breite des Stirnlappens 14 u. 8 mm.

Fundorte: Wehlau und Cranz in Ostpreussen. Das Gestein ist ein krystalliner gelblich-grauer obersilurischer Kalk.

Von *Ph. elegans*¹⁾ ist *Ph. prussica* durch die abgerundeten Hinterecken — sie sind auch auf dem Steinkern abgerundet —, durch den etwas ausgeschweiften Vorderrand, durch den Kiel auf der Glabella und die grösseren Augen verschieden.

Mit *Ph. Stokesi*²⁾ hat unsere Art die grösseren Augen gemein, doch divergieren die Rückenfurken bei *Ph. Stokesi* stärker, und dann zeigt die Salter'sche Abbildung (Taf. II. Fig. 2a) die Aeste der ersten Seitenfurken ungetrennt!

2. *Acaste* Goldf.³⁾

Phacops (*Acaste*) *Downingiae* Murchison. Taf. I. Fig. 27. 27a. 27b. 27c.

1862. *Phacops Downingiae* Murchison in Salter: A. Monograph. pag. 24. Taf. II. Fig. 17—36.

1874. *Phacops dubius* Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 14. Taf. I. Fig. 7.

1882. *Phacops Downingiae* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 75. Taf. I. Fig. 2. Taf. XI. Fig. 18.

1885. *Phacops Downingiae* Lindström: Förteckn. på Gotl. Sil. Crust. pag. 42.

1888. *Ph. Downingiae* Wiegand: Meklenburg. Trilob. in D. Geol. 1885 pag. 4. Taf. VII. Fig. 2, 3.

Ausser einer grossen Menge von Glabellen und Schwanzschildern liegt mir auch das von Steinhardt a. a. O. als *Ph. dubius* Nvezk. beschriebene Kopfschild vor, aus dessen genauer Untersuchung ich die Ansicht Schmidt's⁴⁾, dass *Ph. dubius* Steinh. dem *Ph. Downingiae* Murch. zuzuzählen sei, vollständig bestätigt finde. Wiegand, der ebenso wie Schmidt den *Ph. dubius* bei Steinhardt von *Ph. dubius* Nieszkowski⁵⁾ trennt, hält ersteren für eine selbständige Art.⁶⁾ Die genaue Vergleichung der Steinhardt'schen Abbildung mit der Wiedergabe seines Originals auf Taf. I. Fig. 27. zeigt, dass Wiegand durch Steinhardt's undeutliche Zeichnung irregeleitet ist.

Das Kopfschild ist gerundet dreiseitig mit abgerundeten Hinterecken; der Vorderrand ist nach vorne vorgezogen, gerundet (bei Steinhardt bildet er einen stumpfen Winkel). Die Rückenfurken divergieren nach vorne, sie sind fast vollkommen gerade. Auf der Glabella sind drei Paare von Seitenfurken vorhanden; die ersten Seitenfurken bestehen aus zwei, ein sehr stumpfes Knie bildenden Stücken und gehen von den Rückenfurken aus. Die zweiten Seitenfurken erreichen die

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. I. *Ph. elegans* pag. 72. Taf. I. Fig. 1. Taf. X. Fig. 10—12. Taf. XI. Fig. 17.

2) cf. J. W. Salter: A. Monograph: pag. 21.

3) Der Auffassung Lindströms, *Acaste* zu *Phacops* s. str. zu zählen, weil es bereits eine Cirrhipedengattung *Acasta* Leach giebt, kann ich mich bei den ausgezeichneten Unterscheidungsmerkmalen zwischen *Acaste* u. *Phacops* nicht anschliessen (cf. Lindström: Förteckning på Gotlands sil. Crust. 1885 pag. 42).

4) cf. Fr. Schmidt l. c. pag. 75, 76.

5) cf. Nieszkowski: Monographie der Trilobiten: *Ph. dudius* pag. 19 (533) Taf. I. Fig. 1.

6) cf. Wiegand: l. c. pag. 42.

Rückenfurchen nicht; die dritten gehen deutlich von den Rückenfurchen aus. Der Nackenring ist über die Glabella gewölbt. Die Oberfläche ist fast glatt, mit feinen Pünktchen besetzt, auf dem Stirnlappen treten kleine Höckerchen auf.

Das Schwanzschild ist fast halbkreisförmig. Die Spindel trägt bis 9 Glieder, die Seitenteile haben 6—7 schwach gefurchte Pleuren. Um das ganze Schild läuft ein schmaler Saum.

Fundort: In Ost- und Westpreussen sehr häufig in Beyrichien Kalken.

In Estland ist *Ph. Downingiae* am Okkessare-Pank auf Oesel (Obere Oesel'sche Schicht K) anstehend gefunden; im gotländischen Ober-Silur ist die Art ebenfalls verbreitet.

3. *Dalmania* Emmr.¹⁾

***Phacops (Dalmania) imbricatula* Angelin.** Taf. I. Fig. 29.

1852 (1878). *Phacops imbricatula* Angelin: Pal. Scand. pag. 10. Taf. VIII. Fig. 3.

Ein grosses breit dreieckiges Schwanzschild zeigt auf der Spindel 17 Glieder, auf den Seitenteilen 10 gefurchte, an ihrem äusseren Ende etwas zurückgebogene Pleuren. Das Schwanzschild ist von einem ziemlich breiten gewölbten Randsaum umgeben. Der Hinterrand ist zu einem Stachel ausgezogen.

Länge des Schwanzschildes bis zum Stachel 30 mm, Breite 42 mm, Spindelbreite 10 mm.

Fundort: Ostpreussen ohne nähere Angabe und Marienwerder, Westpreussen. Anstehend ist *Ph. imbricatula* im Ober-Silur Gotlands gefunden.

***Phacops (Dalmania) caudata* Brünnich.** Taf. I. Fig. 30, 30a.

1852 (1878). *Phacops caudatus* Brünn. in Angelin: Pal. Scand. pag. 10. Taf. VIII. Fig. 2.

1874. *Dalmania caudata* Steinhardt: Pr. Trilobiten. pag. 17. Taf. I. Fig. 8.

1885. *Phacops vulgaris* Salter in Lindström: Gotlands Crustac. pag. 37. Taf. XII, Fig. 1. 2. 5. 6

Mehrere kleine Schwanzschilder zeigten die für diese Art charakteristische Ausbildung: sie sind breit dreieckig, mit abgerundeten Vorderecken. Die Spindel besteht aus 12 Ringeln, von denen die vorderen je 2 Knötchen tragen. Auf den Seitenteilen treten 7 gefurchte, geschwungene Rippen auf. Der Randsaum ist schmal und weniger gewölbt als bei *Ph. imbricatula*. Der Hinterrand ist zu einem Stachel ausgezogen.

Die Stücke lagen zum Teil in graulich grünem Gestein (vergl. pag. 9), zum Teil in gelblichem, krystallinem Kalk.

Fundort mehrfach in Ost- und Westpreussen gefunden.

Anstehend ist *Ph. caudata* von Gotland bekannt.

1) *Dalmania* Emmr. ist nicht gleichwertig der Gattung *Dalmanites* Barr., da Barrande zu *Dalmanites* alle *Phacops*-arten zählt, die zur Bildung von Wangenhörnern neigen, so dass dann also auch die *Chasmops*-arten zu *Dalmanites* gehören würden. Ferner rechnete Barrande auch *Acaste* zu *Dalmanites* (cf. Barrande l. c. I. pag. 528 ff.). Barrande verwarf den Emmrich'schen Namen *Dalmania*, da er 1830 von Robineau Desvoidy bereits einer Dipterengattung beigelegt worden ist (cf. Barrande l. c. I. pag. 341). *Dalmania* bildet jedoch im Emmrich'schen Sinne eine gut umschriebene Gruppe, für die dieser ältere Name beizubehalten ist.

4. *Pterygometopus* Fr. Schmidt.

Phacops (*Pterygometopus*) *exilis* Eichwald. Taf. I. Fig. 15.

1857. *Phacops dubius* Nieszkowski: Monographie pag. 19 (533), Taf. I. Fig. 1. 2.
 1860. *Acaste exilis* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1423. Taf. LII. Fig. 28.
 1882. *Phacops exilis* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 86. Taf. I. Fig. 18—21. Taf. XII. Fig. 13.

Einige Kopfschilder dieser Art liessen sich noch mit Sicherheit bestimmen. Sie sind ungefähr halbkreisförmig, mässig gewölbt. Der Kopfschlag ist vorn gerundet, an den Seiten lässt er eine scharfe obere Kante erkennen. Der grosse Stirnlappen ist seitlich zu Flügeln ausgezogen, welche etwa $\frac{1}{2}$ der Wangenlänge erreichen. Die vorderen Zweige der Gesichtsnäht sind auf dem Stirnlappen als ganz feine, im Bogen zur Mitte des Vorderrandes gehende eingedrückte Linien zu erkennen. Die ersten Seitenlappen sind gerundet dreieckig, die zweiten und dritten bilden fast gleich grosse, länglich viereckige, flache Lappen. Der Nackenring ist ziemlich hoch gewölbt, mit einem kräftigen Mittelhöcker verziert. Die Oberfläche der Glabella ist dicht mit Höckerchen besetzt, während die Wangen nur eingestochene Grübchen erkennen lassen.

Maasse des Kopfes: Länge 13 mm, Breite 25 mm.

Fundorte: Soritten bei Memel, Ostpreussen. Marienburg, Westpreussen.

Ph. exilis gehört dem Echinospaeritenkalk an und ist bisher nur in Estland anstehend gefunden.

Phacops (*Pterygometopus*) *laevigata* Fr. Schmidt. Taf. I. Fig. 20 a b c.

1882. *Phacops laevigata* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 88 u. 235. Taf. I. Fig. 22. Taf. X. Fig. 13. 14. Taf. XII. Fig. 14. 15. Taf. XV. Fig. 24.
 1884. *Phacops laevigata* Kiesow: Sil. u. Devon. Gesch. W.-Pr. pag. 75.

Die mir allein vorliegenden Kopfschilder sind etwa $1\frac{1}{2}$ —2 mal so breit als lang, stark gewölbt, mit gerundeten Hinterecken. Die Rückenfurchen divergieren nach vorne stark, biegen nach aussen um und münden in stumpfem Winkel in die flachen Seitenrandfurchen. Der Stirnlappen ist nach den Seiten in spitzige Hörner ausgezogen, über deren Grund die Gesichtsnähte als feine Eindrücke verlaufen. Drei Paare von Seitenfurchen sind als schmal eingedrückte Rinnen ausgebildet. Der Zwischenraum zwischen den Seitenfurchen auf der Glabella ist breiter als die Seitenlappen selbst. Die Augenhügel sind hoch, in 16 senkrechten Linsenreihen zähle ich je fünf Linsen. Der Nackenring ist breit, hochgewölbt, in der Mitte mit einem Knötchen verziert. Die Oberfläche der Glabella ist glatt, oder mit wenigen Höckerchen besetzt. Im vorderen Teile derselben treten zwei divergierende Grübchenreihen auf; das auf Taf. I. Fig. 20 abgebildete Exemplar trägt merkwürdigerweise statt der Grübchen- zwei Knötchenreihen.

Ph. laevigata gehört der Jevessen Schicht Estlands an, die Art ist in Geschieben dieses Alters sowohl in Ost- als Westpreussen gefunden.

Phacops (Pterygometopus) Kegelensis Fr. Schmidt. Taf. I. Fig. 19.

1882. *Phacops Kegelensis* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 91. Taf. XI. Fig. 8. Taf. XII. Fig. 19. Taf. XV. 25. 26.

Das Kopfschild ist sehr flach, gleichmässig gerundet. Der Stirnlappen ist seitlich zu flachen Hörnern ausgezogen, die deutlich vom Mittelkörper durch die Gesichtsnähte abgetrennt werden. Die drei Seitenfurchenpaare sind deutlich und tief ausgebildet. Die zweiten und dritten Seitenfurchen laufen etwas schräg nach vorn. Die zweiten und dritten Seitenlappen sind fast vollständig gleichgebildet, sie nehmen etwa ein Drittel der Glabellabreite ein. Die Oberfläche der Glabella ist feinkörnelt. *Ph. Kegelensis* kommt anstehend in der Jeweschen Schicht (D) Estlands vor. — Taf. I. Fig. 19 giebt das einzige Bruchstück dieser Art aus einem Ostpreussischen Geschiebe wieder.

5. Chasmops. M'Coy.**Phacops (Chasmops) praecurrens Fr. Schmidt.** Taf. I. Fig. 4. 4a.

1882. *Phacops praecurrens* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 98. Taf. II. Fig. 14, 15. 17. Taf. XV. Fig. 29.

Einige Kopfschilder dieser Art lagen mir vor. Der Umriss ist beinahe halbkreisförmig; die Hinterecken waren nach Schmidt zu langen Hörnern ausgezogen. Die Rückenfurchen gehen nach vorn stark auseinander und münden in die nicht sehr tiefe Randfurche. Die Glabella ist stark gewölbt, nach vorn steil abfallend. Der Stirnlappen ist oval, seitlich über die ersten Seitenlappen etwas hervorragend. Die ersten Seitenlappen sind rundlich dreieckig, ihre Länge an den Rückenfurchen ist grösser als die des Stirnlappens an den Rückenfurchen. Die zweiten Seitenlappen sind klein, schmal, schräg nach hinten gerichtet, ihre Länge beträgt bis zwei Drittel des Hinterrandes der ersten Seitenlappen; die dritten bilden einen schmalen Ring. Der Nackenring ist stark gewölbt und mit einem kräftigen Mittelhöcker verziert. Die Wangen fallen ziemlich steil ab. Die Oberfläche des ganzen Kopfschildes ist mit Höckern besetzt, die auf der Glabella besonders dicht und stark sind.

Masse: Länge des Kopfes 13 mm, 20 mm. Breite 27 mm, 38 mm.

Ph. praecurrens gehört dem Echinospaeritenkalk C1 Estlands an.

Die mir vorliegenden Kopfschilder stammen aus Ostpreussen.

Phacops (Chasmops) Odini Eichwald. Taf. I. Fig. 2. 2a. Taf. VI. Fig. 33.

1857. *Phacops conophthalmus* Nieszkowski: Monographie pag. 20 (534).

1860. *Chasmops Odini* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1429. Taf. LII. Fig. 32.

1874. *Chasmops conicophthalmus* Steinhardt: pag. 15 (z. T). Taf. I. Fig. 4.

1882. *Phacops Odini* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 99. Taf. II. Fig. 1—13. Taf. XV. Fig. 30.

Das Kopfschild ist halbkreisförmig mit langen säbelförmigen Wangenhörnern. Der Vorderrand ist an den Seiten der Glabella etwas eingebuchtet. Eine Randfurche umgiebt das ganze Kopfschild; sie bildet vor der Glabella eine ganz schmale Rinne, auf den Wangen verbreitert sie sich und geht, schwächer werdend, auf die Wangen-

hörner über. Der Umschlag bildet ein schmales, schräg gestelltes Band, oben und unten mit scharfer Kante. Die Glabella ist kräftig gewölbt, nach vorn steil abfallend. Der Stirnlappen ist nicht ganz so breit, als das Kopfschild lang ist; er bildet ein gleichmässiges Oval. Die ersten Seitenlappen bilden gewölbte dreieckige Erhöhungen; alle Winkel des ersten Seitenlappens sind spitz, er nimmt an der Rückenfurche dieselbe Länge ein, wie der Stirnlappen. Die zweiten Seitenlappen bilden kleine deutliche Knötchen; die dritten bilden einen Ring, der etwas schmaler und kürzer ist als der kräftig gewölbte Nackenring. Die Augen sind gross, etwa so lang, wie die ersten Seitenlappen, am Grunde von einer Furche umgeben. Die senkrecht abfallenden Wangenhöcker sind niedriger als die Glabella. Die Oberfläche ist fast glatt bis fein chagrinartig, die Wangenhöcker sind mit dicht gestellten Grübchen bedeckt.

Die Schwanzschilder sind breit, (Länge : Breite = 3 : 4), stark gewölbt, seitlich zusammengedrückt, hinten etwas abgestutzt. Die Spindel ist hoch gewölbt, breiter als ein Drittel des ganzen Schildes; sie besteht aus 9—11 Gliedern. Die Seitenteile haben bis 10 Pleuren, von denen die ersten 5—6 gefurcht sind, die letzten Pleuren laufen der Axe parallel.

In Ost- und Westpreussen ziemlich häufig im Echinospaeritenkalk gefunden, doch meistens nur Schwanzschilder. Das einzige Kopfschild, dass ich mit Sicherheit zu dieser Art stellen kann, ist das auf Taf. VI. Fig. 33 abgebildete aus einem Ostpreussischen Geschiebe.

Heimat: Estland. Echinospaeritenkalk.

Die var. *Itferensis* Schmidt¹⁾ mit kürzeren Wangenhörnern und mehr dreieckigem Schwanzschilde habe ich nicht beobachten können.

Von der nahe verwandten schwedischen Art *Ph. conicophthalma* Ss. et Boeck erwähnt Kiesow²⁾ ein kleines Schwanzschild aus Westpreussen. *Ph. conicophthalma* zeichnet sich durch ganz kurze Wangenhörner und kürzere erste Seitenlappen aus, das Schwanzschild ist stets 11 gliedrig und gleichmässig gerundet.

Phacops (Chasmops) cf. marginata Fr. Schmidt. Taf. I. Fig. 1. 3. u. 24.

1882. *Phacops marginata* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 104. Taf. III. Fig. 5. 6. 7. Taf. X. Fig. 15.

Mehre Kopschilder zeigen geringe Abweichungen von der Schmidtschen Art. Sie sind mehr als doppelt so breit als lang; der Randsaum ist vor dem Kopfschilde nicht so breit, wie die Abbildungen 5 und 7 bei Schmidt für *Ch. marginata* angeben, und dann ist der Umschlag bis ziemlich zur Hälfte der Wangenhörner mit einer scharfen äusseren Kante versehen (bei *Ch. marginata* soll diese Kante nur bis zum Beginn der Wangenhörner gehen). Der grosse Stirnlappen ist wie bei *Ch. marginata* breiter als die ganze Länge des Kopfschildes und zeigt vorn deutlich die divergierenden Grübchenreihen. Die Seitenrandfurche geht deutlich in die Hinterrandfurche über. Der Wangenhöcker ist niedriger als die Glabella. Die Oberfläche erscheint auf den mir vorliegenden Stücken (es sind Steinkerne) fast ganz glatt, nur auf den Wangenhöckern sind feine Grübchen eingedrückt.

1) cf. Fr. Schmidt l. c. pag. 102.

2) cf. Kiesow: Sil. u. Dev. Gesch. pag. 77.

Mit dem einen der Stücke wurde das auf Taf. I Fig. 3 abgebildete Hypostom zusammengefunden; es ist länglich eiförmig, mit stark ausgezogenem Hinterrande.¹⁾ Das Mittelstück ist stark gewölbt, mit wenigen flachen Höckern besetzt, und durch kurze Mittelfurchen in einen grossen Vorderlappen und einen kleinen, schmalen Hinterlappen geteilt.

Maasse des Kopfes: Länge 19 mm, Breite 42 mm, Breite des Stirnlappens 21,5 mm.

„ 18 „ „ 40 „ „ „ „ 19 „

Das auf Taf. I Fig. 24 abgebildete Schwanzschild stimmt mit dem von Schmidt (Taf. III Fig. 6) abgebildeten ziemlich gut überein, so dass ich dasselbe auch zu *Ph. cf. marginata* stelle: es ist sehr breit, fast halbkreisförmig (12 mm: 20 mm) und nicht so stark gewölbt wie die Schwanzschilder von *Ph. Odini*. Die Spindel nimmt etwa $\frac{1}{3}$ der Breite ein (bei Schmidt ist sie etwas breiter) und besteht aus 8 Gliedern; die Seitenteile tragen 7 Pleuren, von denen die ersten 2—3 ganz schwach gefurcht sind; die letzten Pleuren sind sehr undeutlich ausgebildet. Die Schmidtsche Abbildung zeigt die letzten Pleuren auch noch deutlich, und auf den 4 ersten Pleuren Mittelfurchen, während ich bei meinem Stücke nur auf den ersten 2 und 3 Pleuren ganz schwache Furchen beobachten kann.

Ph. cf. marginata ist mehrfach in Ostpreussen gefunden worden. Das Gestein ähnelt dem der Jeweschen Schicht.

Phacops (Chasmops) bucculenta Sjögren. Taf. I. Fig. 16. 17.

1852 (1878). *Phacops bucculenta* Sjögren in Angelin: Pal. Scand. pag. 9. Taf. VII. Fig. 1 u. 2.

1882. *Phacops bucculenta* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 105. Taf. III. Fig. 1—4. Taf. X. Fig. 16.

Ph. bucculenta ist eine der *Ph. marginata* nahe verwandte Form, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet: Das Kopfschild ist etwa halbkreisförmig, der Vorderrand gleichmässig gebogen bis abgestutzt; die Hinterecken sind in breite säbelförmige Wangenhörner ausgezogen. Der Randsaum ist vor der Glabella ganz schmal, auf den Wangen wird er breiter und ziemlich flach. Der Umschlag bildet ein flaches, oben und unten scharfkantiges Band. Die Glabella ist nach vorne zu sehr kräftig gewölbt, zwischen den Augen ist sie niedergedrückt. Der Stirnlappen ist gross, breiter als die Länge des Kopfschildes, mit flachem Vorderrande. Die ersten Seitenlappen sind klein, rundlich dreieckig und durch tiefe Furchen fast ganz von der Glabella abgeschnürt; die zweiten bilden ganz kleine Knötchen, die dritten einen schmalen Ring. Die Wangenhöcker sind sehr hoch, höher als die Glabella, und steil nach den Seiten abfallend; auf ihrer Vorderseite sind die Gesichtsnähte tief eingedrückt. Die hohen Wangenhöcker und die verhältnismässig kleinen ersten Seitenlappen sind besonders charakteristisch für diese Art.

Ch. bucculenta gehört der Jeweschen Schicht an und ist anstehend sowohl in Estland als in Schweden gefunden. Unsere Stücke stammen wohl aus Estland.

¹⁾ In Bezug auf die Benennung der einzelnen Teile des Hypostoms schliesse ich mich an Novák an. cf. A. Novák: Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten. I u. II. Sitzungsber. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wissenschaften. Prag 1874 (475—483) und 1884 (212—229).

Bruchstücke dieser Art sind öfters in Ost- und Westpreussen gefunden worden. Das auf Taf. I. Fig. 17 abgebildete Kopfschild giebt die Seitenansicht eines etwas verdrückten Exemplars, das durch die Ausbildung eines breiten vorderen Randsaumes an *Ph. Wrangeli* Fr. Schmidt¹⁾ erinnert, während der stark gewölbte Stirnlappen und der vorn nur wenig aufgeworfene Rand die Zugehörigkeit zu *Ph. bucculenta* beweisen.

Phacops (Chasmops) Wesenbergensis. Fr. Schmidt. Taf. I. Fig. 14. 14a. 15.

1882. *Phacops Wesenbergensis* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 115. Taf. IV. Fig. 10. 12.
Taf. V. Fig. 1—7. Taf. X. Fig. 20.

1888. *Phacops Wesenbergensis* Wiegand: Mecklenb. Trilob. pag. 52. Taf. VII. Fig. 3.

Das Kopfschild ist fast halbkreisförmig, mit langen, schräge stehenden Wangenhörnern; der Vorderrand ist etwas emporgewölbt, der Umschlag gerundet. Die ziemlich stark gewölbte Glabella ist nach vorne sehr verbreitert. Der Stirnlappen ist breiter als die ganze Länge des Kopfschildes, sein Umriss ist fast ganz elliptisch; in den Vorderrand geht er in ziemlich starker Wölbung, ohne einen deutlichen Randsaum zu bilden über. Die ersten Seitenlappen sind gross, dreieckig, mit spitzem innerem Winkel; ihre Aussenseite nimmt fast die Hälfte der Rückenfurcnenlänge ein. Die zweiten Seitenlappen sind nur als schwache Knötchen ausgebildet; die dritten bilden einen schmalen Ring. Die Glabella ist dicht mit Höckerchen besetzt. Die Gesichtsnaht verläuft vor der Glabella auf dem Aussenrande.

Die nicht sehr stark gewölbten Wangen sind von dem gerundeten Seitenrande durch breite Randfurchen geschieden, die sich mit der Hinterrandfurche vereinigen. Das Hypostom ist länglich eiförmig mit zungenartig ausgezogenem Hinterrande und starken Vorderflügeln.

Das Schwanzschild ist parabolisch mit gleichmässig abfallenden, kräftig gewölbten Seitenteilen. Die Spindel und die Seitenteile tragen bis 14 Glieder.

Maasse: Kopf: Länge 18 mm, Breite 36 mm, Breite des Stirnlappens 19 mm.

Schwanzschild: Länge 24 mm, Breite 29 mm, Spindelbreite 11 mm.

Ch. Wesenbergensis ist sowohl in Ost- als Westpreussen in Geschieben vom Alter der Wesenberger Schicht gefunden worden; seine Heimat ist Estland.

Phacops (Chasmops) macroura Sjögren. Taf. I. Fig. 7. 7a. 9. 10 (8. 11?).

1852 (1878). *Phacops macroura* Sjögren in Angelin: Pal. Scand: pag. 9. Taf. 7.
Fig. 3. 4.

1888. *Phacops macroura*. Wiegand: Mecklenb. Trilob. pag. 49. Taf. VII. Fig. 1. a. b.

Das Kopfschild ist etwa halbkreisförmig. Die Hinterecken sind zu senkrecht stehenden, breiten, säbelförmigen Hörnern ausgezogen. Der Randsaum ist vor der Glabella aufwärts gebogen, an den Seiten ist er durch eine breite Furche von den Wangen getrennt; vor dem Beginn der Wangenhörner biegt diese Furche deutlich zu der Hinterrandfurche um. Die Glabella ist stark gewölbt, deutlich mit Höckern besetzt. Der Stirnlappen ist an seinen Ecken abgerundet, sein Vorderrand ist flach

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 107. Taf. XI. Fig. 10.

gewölbt, doch auch wie die Stücke 7 und 8 zeigen, gradlinig bis ein wenig concav:¹⁾ seine Breite ist nicht ganz der Länge des Kopfes gleich, seine Ausdehnung an der Rückenfurche ist kleiner als die der ersten Seitenlappen. Diese sind gross dreieckig, ihr innerer Winkel ist 90° und grösser. Die zweiten Seitenlappen sind als kleine Knötchen ausgebildet, die dritten als schmaler Ring.

Zu *Ch. macroura* sind diejenigen Schwanzschilder zu stellen, deren Spindel, nach hinten stark verschmälert, fast spitz endet, und deren Seitenteile gleichmässig, mehr oder weniger flach gewölbt sind. Der Umriss des Schwanzschildes ist breit dreieckig bis parabolisch. Spindel und Seitenteile tragen bis 18 Glieder.

Ph. macroura findet sich häufig in Backsteinkalken (typische Exemplare mit vorn convexem Stirnlappen) und in einem dichten, grauen bis braunen, sehr harten kieseligen Kalke mit grossmuscheligem Bruch, Rollsteinkalk (Exemplar Taf. I. Fig. 7.). Die Stücke Taf. I. Fig. 8 und 11 lagen in einem gelbgrauen Kalke mit braunen Kluftflächen, der dem der Kegelschen Schicht ähnlich ist.

Fundorte: Ost- und Westpreussen. Anstehend ist *Ph. macroura* bisher nur aus Schweden bekannt.

Phacops (Chasmops) maxima Fr. Schmidt. Taf. I. Fig. 12. 13. 13a.

1882. *Phacops maxima* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 112. Taf. III. Fig. 11. Taf. IV. Fig. 1—3, 5—7. Taf. X. Fig. 17. 18. Taf. XI. Fig. 13. Taf. XV. Fig. 34. 35.

Für *Ph. maxima* giebt Schmidt als Unterscheidungsmerkmal von *Ph. macroura* an, dass der Stirnlappen vorne gradlinig bis concav sein soll; ferner bilden seine Seitenflügel stumpfe Ecken, und seine Breite ist grösser als die Länge des Kopfschildes; weiter ist der Vorderrand stark aufgeworfen, der Umschlag flach bandartig, die Hinterecken sind zu geraden, schwertförmigen Hörnern ausgezogen, die Oberfläche der Glabella ist glatt bis höchstens chagriniert. Alle diese Merkmale konnte ich bei mehreren Bruchstücken schlecht erhaltener Kopfschilder wohl unterscheiden, und sie daraufhin von *Ph. macroura* trennen; ohne jedoch ein wirklich gutes Stück zu finden, das annähernd die Grösse der Schmidtschen Exemplare²⁾ erreicht hätte.

Mit einem der Bruchstücke wurde das auf Taf. I. Fig. 12 abgebildete Hypostom gefunden. Es ist lang eiförmig, stark gewölbt, mit grossen Vorderflügeln; der Hinterrand ist lang ausgezogen. Der Vorder- und Hinterlappen des Mittelstückes ist mit flachen Höckern bedeckt. Das Schwanzschild ist stärker und ungleichmässiger gewölbt als bei *Ph. macroura*, hinten abgestutzt, die Spindel ist nach hinten weniger verschmälert und endet stumpf. Das Schwanzschild trägt bis 18 Glieder; die Pleuren gehen nicht ganz bis zum Rande; die letzten laufen der Axe parallel.

Bruchstücke von *Ph. maxima* sind öfters in Ost- und Westpreussen in Gesehieben vom Alter der Jeweschen Schicht gefunden worden, deren Heimat Estand ist.

1) Schmidt giebt (Rev. I. pag. 114) für *Ph. macroura* an, dass der Vorderrand des Stirnlappens nicht gradlinig, sondern convex sein soll; doch der seitlich gerundete Stirnlappen, die geringere Breite desselben und die deutliche grobe Tuberkulierung der Glabella, liessen mich die Stücke 7 und 8 zu *Ph. macroura* stellen und nicht zu *Ph. maxima*, für welche Art der vorn gerade Stirnlappen sprechen würde.

2) Schmidt giebt pag. 114 bei 30—35 mm Länge 60—75 mm Breite an, während unsere Stücke bis höchstens 25 mm Länge bei etwa 40—45 mm Breite zeigen.

Phacops (Chasmops) Eichwaldi Fr. Schmidt Taf. I. Fig. 21—23.

1882. Phacops Eichwaldi Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 117. Taf. IV. Fig. 4. Taf. V. Fig. 8. 9. 10. 16. Taf. X. Fig. 21.

Das Kopfschild ist flach gewölbt, etwa eineinhalb mal so breit als lang. Die Hinterecken sind zu langen, flachen, ziemlich steil stehenden Wangenhörnern ausgezogen. Das ganze Kopfschild ist von einem flachen Randsaume umgeben, der von einer ganz flachen Furche begleitet ist, welche deutlich in die Hinterrandfurche übergeht. Die Glabella ist flach, der Stirnlappen vorn convex, nicht so breit, als das Kopfschild lang ist. Vor dem Stirnlappen sind in der Randfurche zwei Grübchen als die Enden der divergierenden Punktreihen zu erkennen. Die ersten Seitenlappen sind gross, abgerundet dreieckig; die zweiten fehlen vollständig. Die dritten Seitenlappen bilden einen schwach gewölbtten schmalen Ring. Der Nackenring ist breit, kaum höher als die Glabella. Die Wangenhöcker sind etwas niedriger als die Glabella, die Augen sind sehr klein. Die Oberfläche ist glatt.

Zu Ph. Eichwaldi stellte ich die Schwanzschilder auf Taf. I. Fig. 22 u. 23. Sie sind nicht sehr stark gewölbt, mehr oder weniger spitz endigend. Die Spindel, aus 13—16 Gliedern bestehend, nimmt etwas mehr als ein Drittel der ganzen Schildbreite ein.

Maasse: Kopf: Länge 16 mm, Breite 24 mm, Breite des Stirnlappens 13,5 mm.

Schwanzschild: Länge 16 mm, Breite 17 mm, Spindelbreite 6,5 mm.

„ 10 „ „ 12 „ „ 5,5 „

Ph. Eichwaldi ist in Ost- und Westpreussen gefunden. Anstehend ist die Art aus der Lyckholmer Zone F₁ Estlands bekannt.

Das auf Taf. I. Fig. 6. 6a abgebildete Kopfschild steht seiner Ausbildung nach zwischen Ph. Eichwaldi und Ph. maxima. Es ist fast halbkreisförmig, flach gewölbt mit fast senkrecht stehenden Wangenhörnern. Von Ph. Eichwaldi unterscheidet es sich dadurch, dass die zweiten Seitenlappen als ein ganz schmaler Ring angedeutet sind; während der vorn convexe Stirnlappen, der schmaler als die Länge des Kopfschildes ist, das Stück von Ph. maxima trennen; ausserdem sind sämtliche Furchen des Kopfschildes viel flacher als bei Ph. maxima. Das Stück liegt in einem gelblichen, etwas erdigen Kalkstein aus Ostpreussen.

Anhang:

Ph. (Chasmops) sp. I. Taf. I. Fig. 5. 5a giebt die Abbildung eines Schwanzschildes, das dem von Ph. bucculenta¹⁾ sehr ähnelt. Die sehr breite Spindel besteht aus 11 Gliedern, deren letzte undeutlich sind; die Seitenteile tragen 12 Pleuren, von denen die acht ersten deutlich gefurcht sind. Steinhardt²⁾ stellte dieses Schwanzschild zu Ph. latifrons. Es liegt in einem grauen kieseligen Kalk, der dem der Jeweschen Schicht ähnelt, und ist in Ostpreussen gefunden worden.

Ph. (Pterygometopus) sp. II. Das Schwanzschild, Taf. I. Fig. 25, gehört einer Pterygometopusart an. Es ist halbkreisförmig, flach gewölbt, achthgliedrig, fast

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 106. Taf. III. Fig. 1 d.

2) cf. Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 12. Taf. I. Fig. 2.

alle Pleuren zeigen eine deutliche Mittelfurche, die grösste Aehnlichkeit hat es mit *Ph. Panderi* F. Schmidt¹⁾. Das Gestein ist Echinospaeritenkalk aus Ostpreussen.

Ph. (Chasmops) sp. III. In einem graubraunen dichten Kalksteine, dem Rollsteinkalk mit *Chasmops macroura* von Römer²⁾ entsprechend, lag das Taf. I. Fig. 32 abgebildete Schwanzschild von fast halbkreisförmigem Umriss. Die schmale Spindel lässt noch 15 Ringel erkennen, sie geht bis nahe an den Hinterrand. Die flachen Seitenteile tragen über 15 geschwungene ungeteilte Pleuren. Um das ganze Schild läuft ein flacher schmaler Randsaum. Jedenfalls gehört das Schwanzschild einer flacheren Varietät von *Ph. macroura* an. Fundort: Ostpreussen ohne nähere Angabe. Die Heimat wird die des *Ph. macroura* sein, also Schweden resp. Oeland.

Phacops sp. IV. Taf. I. Fig. 26 giebt eine kleine Glabella, die nach der Ausbildung der Seitenlappen zwischen den Arten der Untergattung *Pterygometopus* und den Verwandten des *Phacops (Chasmops) praecurrens* steht. Der Stirnlappen ist glatt, der hintere Teil der Glabella ist mit flachen Höckerchen besetzt. Lauth bei Königsberg.

V. Fam.: Cheiruridae.

Gattung: **Cheirurus**. Beyrich. Barr. Salter. Schmidt.

Ceraurus: Green. Fr. Römer. Eichw.

1. Untergattung: **Cheirurus s. str.**

Cheirurus exsul Beyrich. Taf. II. Fig. 1. 2.

1846. *Cheirurus exsul*. Beyrich.: Untersuchungen üb. Tril. II Stück pag. 3. Taf. IV. Fig. 6.

1852 (1878). *Cheirurus exsul*. Angelin: Pal. Scand. pag. 31. Taf. XXI. Fig. 2.

1860. *Ceraurus exsul*. Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1396.

1874. *Cheirurus exsul*. Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 57. Taf. IV. Fig. 12.

1882. *Cheirurus exsul*. Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 137. Taf. VI. Fig. 5—15. (Taf. XI. Fig. 19—20. Taf. XVI. Fig. 2—4.

Kopfschilder dieser Art sind häufig in Geschieben vom Alter des Echinospaeritenkalkes gefunden worden. Das Kopfschild ist etwa zweimal so breit als lang, von einem deutlichen Randsaum umgeben; die Hinterecken sind zu langen, divergierenden Hörnern ausgezogen. Der Rand ist vor der Glabella gerade, an den Seiten des Stirnlappens eingebuchtet, in seinem weiteren Verlauf bogenförmig, nach aussen convex. Die tiefen Rückenfurchen verlaufen fast parallel; vorn stossen sie in einer tiefen Grube mit der Vorder- und Seitenrandfurche zusammen. Die Glabella ist flach gewölbt, nach vorn ganz allmählig, zur Nackenfurche steil abfallend, ihr Umriss bildet ungefähr ein Rechteck. Die beiden ersten Seitenfurchenpaare laufen parallel, sie sind ganz wenig gebogen und stehen fast senkrecht zur Axe. Die dritten Seitenfurchen bestehen aus 2 Aesten, deren vorderer breit und tief ist und sich ein wenig nach hinten wendet, während der hintere, schwächere Ast der Axe parallel gerichtet zur Nackenfurche läuft. Der Stirnlappen bildet ein Trapez, die Seitenlappen sind ungefähr

1) cf. Fr. Schmidt: l. c. pag. 85. Taf. I. Fig. 15 d.

2) cf. F. Römer: *Lethaea erratica* pag. 48.

quadratisch und etwas kürzer als der Stirnlappen. Der Zwischenraum zwischen den Seitenlappen ist etwa ein einhalb mal so breit, als diese selbst. Die Oberfläche der Glabella ist ziemlich dicht mit runden Höckern besetzt. Die flachen Wangen sind mit feinen Grübchen und stumpfen und spitzen Erhöhungen bedeckt.

Das Hypostom ist breit eiförmig mit hoch aufgeworfenem Seitenrande. Das Mittelstück ist stark gewölbt und mit flachen Höckern besetzt.

Das Schwanzschild ist nach Schmidt¹⁾ viergliederig mit hochgewölbter Spindel. Jederseits sind 3 Pleuren vorhanden, von denen das erste Paar in lang säbelförmige Hörner ausgezogen ist, während das zweite und dritte Paar in sehr viel kürzere, gerade nach hinten gewendete Zacken von gleicher Länge wie der kleine Hinterlappen ausläuft.

Fundorte: Häufig in Ost- und Westpreussen.

Die Heimat unserer Geschiebe mit *Ch. exsul*. dürfte wohl Estland sein, obwohl die Art auch in Schweden vorkommt.²⁾

***Cheirurus exsul. forma gladiator. Eichwald.* Taf. II. Fig. 3. 4.**

1860. *Cheirurus gladiator* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1392. Taf. LIV. Fig. 18.

1882. *Cheirurus exsul. subsp. gladiator* Fr. Schmidt: *Rev. I* pag. 146. Taf. VI. Fig. 11—15. Taf. XI. Fig. 19.

Von der Hauptform des *Ch. exsul*. unterscheidet sich die vorliegende Unterart durch die ganz glatte, sehr flach gewölbte Gabella. Der Verlauf der Seitenfurchen entspricht dem der Hauptform, nur sind die inneren Enden der Seitenfurchen durch je eine sehr flache Längsfurche verbunden, die in den zweiten Ast der dritten Furchen übergeht und mit dieser die Nackenfurche erreicht. Die Seitenlappen sind fast ebenso breit wie der Zwischenraum auf der Glabella. Die Wangen tragen breite, kräftige Augenwülste und sind ausser mit flachen Grübchen mit groben flachen Höckern verziert.

Das Schwanzschild zeigt in den Grössenverhältnissen der Pleuren einige Abweichungen von der Hauptform: Die ersten Pleuren sind in sehr grosse, gebogene Hörner ausgezogen; an ihrem Grunde zeigen sie zwischen zwei grossen rundlichen Erhöhungen eine kurze tiefe Furche. Die zweiten und dritten Pleuren sind in kürzere, breit lanzettliche, fast gerade nach hinten gerichtete Zacken ausgezogen. Der kurze dreieckige Hinterlappen erreicht die Länge der zweiten Pleuren, während die dritten darüber weit hinausragen.

Fundorte: Wehlau, Ostpreussen; Rosenberg, Westpreussen.

Ch. exsul. forma gladiator gehört wie die Hauptform dem Echinospaeritenkalk an und ist bisher nur in Estland anstehend gefunden.

***Cheirurus exsul. cf. forma macrophthalma Kutorga.* Taf. II. Fig. 5. 5a.**

1882. *Cheirurus subsp. cf. macrophthalmus* Kutorga in Fr. Schmidt: *Rev. I*. pag. 143. Taf. VII. Fig. 1—5. Taf. XVI. Fig. 4.

Eine gut erhaltene Glabella zeigte deutlich die von Schmidt für diese Unterart angegebenen Charaktere. Ihre äussere Form stimmt mit der der Hauptform des

1) cf. Fr. Schmidt: *Rev. I*. pag. 141.

2) cf. Angelin: *Pal. Scand.* pag. 32.

Ch. exsul. überein; sie ist zum Unterschiede von dieser in der Längsrichtung hochgewölbt, nach den Seiten dachförmig abfallend, die stärkste Wölbung liegt in der hinteren Hälfte; zum Vorderrande ist sie sanft abgedacht, während sie zum Nackenringe ganz steil abfällt. Die ersten beiden Seitenfurchenpaare stehen näher zusammen und sind etwas kräftiger gebogen wie bei der Hauptform, die dritten biegen schneller nach hinten um. Die Oberfläche der Glabella ist ganz glatt, während die Wangen, soweit ein kleines Bruchstück derselben erkennen lässt, nur mit gröberen, dichtstehenden Vertiefungen verziert sind.

Fundort: Rosenberg, Westpreussen.

Ch. exsul. cf. forma macrophthalma ist nach Schmidt¹⁾ in Estland selten, häufiger im Gouvernement Petersburg gefunden; unser Exemplar, in einem Echinophaeritenkalkgeschiebe liegend, stammt jedenfalls aus Estland.

Cheirurus gotlandicus Lindström. Taf. II. Fig. 9. 10.

1885. Cheirurus gotlandicus Lindström: Förteckning på Gotlands sil. Crust. pag. 45.
Taf. XII. Fig. 9. 10.

In einem Geschiebe weissen, krystallinen Kalkes mit Crinoidengliedern wurden mit *Bumastus barriensis*, *Encrinurus punctatus* und *Calymene tuberculata* zwei Bruchstücke von Glabellen und ein Hypostom gefunden, welche ich zu Ch. gotlandicus stelle. Auf der nicht sehr stark gewölbten Glabella treten drei Paare von Seitenfurchen auf; die beiden ersten sind in schwachen Bogen etwas nach hinten gewendet, während die dritten in fast gleichmässigen Bogen zur Nackenfurche gehen. Die Seitenlappen sind kurz, etwa halb so lang als der Stirnlappen. Der Raum zwischen den Seitenlappen auf der Glabella ist schmaler als die Seitenlappen selbst. Der Nackenring bildet, wie das eine der Bruchstücke zeigt, ein schmales in der Mitte nicht verbreitetes Band. Die Oberfläche der Glabella ist mit feinen Höckerchen dicht besetzt; die Oberfläche der einen vorhandenen Wange zeigt dichte eingedrückte Grübchen.

Das Hypostom, Taf. II. Fig. 10, von einem bedeutend grösseren Individuum herrührend, ist stark gewölbt, von einem breiten gewulsteten Randsaume umgeben; der Hinterrand ist schwach eingebuchtet. Das sehr kräftig gewölbte Mittelstück zerfällt in einen grossen, ovalen Vorderlappen und einen kleineren, halbmondförmigen Hinterlappen, der durch kurze schwache Mittelfurchen abgeschnürt wird. Die Oberfläche ist mit feinen dichten Knötchen bedeckt, zwischen die einzelne gröbere Höckerchen eingestreut sind.

Fundort: Rosenberg, Westpreussen.

Ch. gotlandicus ist bisher nur in Gotland anstehend gefunden worden; das Gestein entspricht dem der Lindströmschen Zone f (Crinoiden- und Korallenkalk) von Gotland²⁾.

1) cfr. Fr. Schmidt: Rev. I pag. 145. 146.

2) cfr. Lindström: „Ueb. d. Schichtenfolge d. Sil. a. d. Insel Gotland.“ N. Jahr 1888. pag. 160.

Cheirurus speciosus Hisinger. Taf. II. Fig. 6.

1852 (1878). *Cheirurus speciosus* Hisinger in Angelin: Pal. Scand. pag. 79. Taf. XXXIX. Fig. 14.

1874. *Cheirurus speciosus* Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 56. Taf. IV. Fig. 13.

Eine am Vorderrande beschädigte Glabella dieser Art lag mir vor. Sie ist nach vorne etwas erweitert, stark gewölbt. Die beiden ersten Seitenfurchenpaare sind lang, etwas nach hinten gebogen; die dritten biegen kurz nach hinten zur Nackenfurche um und schnüren die dritten Seitenlappen vollständig ab. Die ersten und zweiten Seitenlappen sind kurz: der dritte ist etwas länger. Der Abstand zwischen den gegenüberliegenden ersten und zweiten Seitenlappen ist kaum $\frac{1}{2}$ ihrer eigenen Breite, während die dritten ungefähr um ihre eigene Breite von einander entfernt sind. Der Nackenring ist schwach gewölbt, in der Mitte, zwischen den dritten Seitenlappen, etwas nach vorne vorgezogen. Die Oberfläche der Glabella ist vollkommen glatt. Die Wangen sind, soweit Angelins Abbildung erkennen lässt, mit dicht gestellten Grübchen verziert.

Fundort: Rosenberg, Westpreussen.

Ch. speciosus ist durch das ganze Ober-Silur Gotlands verbreitet.

Cheirurus dubius. n. sp. Taf. II. Fig. 7. 17.

1874. *Cheirurus spinulosus* Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 56. Taf. IV. Fig. 14.

Die beiden vorliegenden Schwanzschilder sind durch die hochgewölbte, deutlich viergliederige Spindel und die drei deutlich entwickelten Pleuren, wie den kurzen dreieckigen Hinterlappen, als zu *Cheirurus* s. str. gehörend charakterisiert. Steinhardt hat a. a. O. beide zu *Ch. spinulosus* Nieszk.¹⁾ gestellt. Diese Bestimmung Steinhardts ist nicht richtig, da bei *Ch. spinulosus* die zweiten Pleuren bedeutend kürzer sind als die dritten, während unsere beiden Stücke übereinstimmend das umgekehrte Verhältnis zeigen. Nebenbei gehört *Ch. spinulosus* dem Echinospaeritenkalk, resp. der Kucker'schen Schicht an, während das eine Schwanzschild (II. Fig. 17) in einem Beyrichienkalkgeschiebe, das andere in einem blaugrauen, dunklen, dichten Kalke liegt, der dem Chonetenkalk²⁾ sehr ähnelt. Wir haben es hier also mit einer Obersilurischen *Cheirurus*art zu thun, und können deshalb die Schwanzschilder kaum auf eine der bekannten Estländischen Arten, welche alle untersilurisch sind, beziehen. Möglicherweise könnten die Schwanzschilder zu einer der gotländischen *Cheirurus*-arten gehören, von denen man bis jetzt nur das Schwanzschild von *Ch. bimucronatus* Murch.³⁾ kennt, dessen Pleuren jedoch alle gleich lang sind. Da aber die etwaige Zugehörigkeit der vorliegenden Stücke zu einer der Arten *Ch. speciosus*, *conformis* oder *Gotlandicus*, oder zu einer bis jetzt noch nicht bekannten anderen Art nicht festzustellen ist, so benenne ich die vorliegende Art *Ch. dubius*.

Fundort beider Stücke: Westpreussen.

Als Heimat der Art dürfte das jetzt von der Ostsee bedeckte Gebiet zwischen Gotland und Estland anzunehmen sein, vielleicht aber auch Gotland selbst.

1) Vergl. *Ch. spinulosus* Nieszk. in Fr. Schmidt. Rev. I. pag. 148 ff.

2) Nötting: Die Cambr. und Silur. Geschiebe der Prov. Ost- und Westpreussen. Jahrb. der königl. geol. Landesanst. 1882. pag. 303.

3) Salter: A Monograph of the Brit. Trilob. pag. 63. Taf. VI, Fig. 9—18.

2. Untergattung: *Cyrtometopus* Angelin.

Cheirurus (Cyrtometopus) clavifrons Dalman. Taf. II. Fig. 11.

1852 (1878). *Cyrtometopus clavifrons* Angelin: Pal. Scand. pag. 32. Taf. XXI. Fig. 4.

Taf. XXXIX. Fig. 9.

1860. *Ceraurus Zembnitzki* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1400.

1882. *Cheir. (Cyrtometopus) clavifrons* Dalman in Fr. Schmidt: Rev. II. pag. 153.

Taf. VIII. Fig. 4—6. Taf. XVI. Fig. 7—12.

Eine ziemlich vollständige Glabella dieser Art lag mir vor. Sie ist länglich eiförmig; ihre grösste Breite (etwa in der Mitte) ist gleich drei Viertel der Länge. Sie ist recht kräftig gewölbt, nach vorn sanft abfallend. Die beiden ersten Seitenfurchen sind schwach eingedrückt (auf dem Steinkerne etwas deutlicher), sie sind ein wenig zurückgebogen und erreichen noch nicht ein Drittel der Glabellabreite. Die dritten Seitenfurchen sind tief und breit; sie gehen zuerst den vorderen Seitenfurchen parallel und biegen dann, flacher werdend, nach hinten um. Sie schnüren so die dritten Seitenlappen fast vollständig von der Glabella ab. Die Abstände der Seitenfurchen von einander, und mithin auch die Seitenlappen, sind ungefähr gleich gross; von dem vorn gerundeten Stirnlappen werden sie an Längenausdehnung erheblich übertroffen. Die Schale ist, soweit sie noch vorhanden ist, fein chagriniert, während der Steinkern fast vollkommen glatt erscheint.

Maasse der Glabella: Länge 19 mm, grösste Breite 14,5 mm.

Fundorte: Königsberg; Marienburg. [Bruchstück einer Glabella.]

Ch. clavifrons kommt in Estland im Glaukonitkalk und Vaginatenkalk, auf Oeland und dem Festlande Schwedens im unteren grauen Orthocerenkalk vor. Die Heimat unserer Geschiebe mit *Ch. clavifrons* dürfte wohl Estland sein, da das Gestein vollkommen mit estländischem Vaginatenkalke übereinstimmt.

Cheirurus (Cyrtometopus) cf. Plautini Fr. Schmidt. Taf. III. Fig. 8.

[1882. *Ch. (Cyrtometopus) Plautini* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 159. Taf. XII. Fig. 24].

Auf einem Backsteinkalkgeschiebe von Wehlau befand sich eine kleine Glabella die in der allgemeinen Form mit *Ch. Plautini* gut übereinstimmt. Sie ist flach gewölbt, vorn abgestutzt. Die Seitenfurchen sind kurz, kaum gebogen; die beiden vorderen Paare sind deutlicher und tiefer ausgebildet, als bei der vorigen Art. Die dritten Seitenfurchen biegen schnell nach hinten um und schnüren die dritten Seitenlappen kaum ganz von der Glabella ab. Auf der einen erhaltenen festen Wange war das Untergattungsmerkmal, die Fortsetzung des Vorderrandwulstes nach dem Auge zu, noch ziemlich deutlich zu erkennen. Der Augendeckel ragt nur ganz wenig aus dem Wangenfelde vor. Der Nackenring ist schmal. Die Oberfläche erscheint ganz fein gekörntelt; die Wange lässt eingestochene Pünktchen erkennen.

Maasse: Länge der Glabella 3,5 mm, Breite 2,5 mm.

Fundort: Wehlau, Ostpreussen. Die Heimat dieses Geschiebes ist wohl der Estland benachbarte Teil des Ostseebeckens.

Cheirurus (Cyrtometopus) pseudohemicranium. Nieszkowski. Taf. II. Fig. 15. 15a. 16.

1859. *Sphaerexochus pseudohemicranium* Nieszkowski: Zus. zur Monogr. Archiv für Naturk. Livl. etc. Ser. I. Bd. II. pag. 376. Taf. II. Fig. 7. 8.

1874. *Sphaeroxochus pseudohemicranium* Steinhardt: Pr. Tril. pag. 60. Taf. IV. Fig. 17.
 1882. *Ch. (Cyrtometopus) pseudohemicranium*. Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 163. Taf. VIII.
 Fig. 9. 10. 13—16. Taf. XI. Fig. 29. Taf. XVI. Fig. 18—21.

Neben mehreren, mehr oder weniger unvollständigen Kopfschildern lag mir auch das Original der Steinhardtschen Bestimmung *Sphaer. pseudohemicranium* vor. Sämtliche Stücke zeigen die Ausbildung der typischen Form dieser Art: Das stark gewölbte Kopfschild ist breit dreieckig, über doppelt so breit als lang; die Glabella bildet ein ganz kurzes Oval. Sie ist sehr stark, fast halbkugelig gewölbt und wird am Grunde von der Vorderrandfurche, der Nackenfurche und von den Rückenfurchen stark eingeschnürt. Die beiden ersten Seitenfurchen sind nur als ganz feine kurze, auf dem Steinkern kaum zu erkennende Eindrücke ausgebildet, während die dritten breit und tief sind und die dritten Seitenlappen in Form von kräftig gewölbten ovalen Höckern vollständig von der Glabella abschnüren. Die Oberfläche der Glabella ist auf der Schale mit rundlichen Knötchen bedeckt, auf dem Steinkern erscheint sie fast ganz glatt.

Die festen Wangen (bei meinen Stücken nicht vollständig erhalten) waren in kurze nach aussen gerichtete Hörner ausgezogen; sie sind gross, breit dreiseitig und lassen für die freien Wangen nur kleine stumpfwinklig dreieckige Felder frei. Die festen Wangen sind mit ziemlich grossen Grübchen verziert.

Fundorte: Ostpreussen: Königsberg, Wehlau. Westpreussen: Rosenberg.

Ch. pseudohemicranium gehört dem Silur Estlands an, und zwar kommt die bei uns gefundene typische Form in der Jeweschen Schicht D vor, während die ältere Form *Ch. pseudohemicranium* var. *dolichocephala* Fr. Schmidt mit längerer, höher gewölbter Glabella bereits in der Kuckerschen Schicht C₂¹⁾ auftritt.

3. Untergattung: *Nieszkowskia*. Fr. Schmidt.

Cheirurus (Nieszkowskia) variolaris Linnarsson. Taf. II. Fig. 12. 12a.

1869. *Cheirurus variolaris* Linnarsson: Vestergötl. cambr. o. silur. Aflagr. pag. 60.
 Taf. I. Fig. 6.
 1882. *Cheirurus (Nieszkowskia) variolaris* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 183. Taf. IX.
 Fig. 1—8.
 1884. *Cheirurus variolaris* Kiesow: Sil. u. Dev. Gesch. Westpr. pag. 78. Taf. IV. Fig. 7.

Die auf Taf. II. Fig. 12 abgebildete Glabella gehört dieser Art an. Sie ist nicht ganz $1\frac{1}{2}$ mal so lang als breit, hinten am breitesten, von ungefähr rechteckigem Umriss. Vom Vorderrande steigt sie in ganz allmählicher Wölbung an, hinter der Mitte ist sie am stärksten gewölbt; nach hinten läuft sie in ein drehrundes gerades, spitzes Horn aus.²⁾ Dieses Horn soll nach Schmidt³⁾ dicht über dem Nackenringe liegen. Leider ist bei dem vorliegenden Stück der Nackenring weggebrochen, doch die eigentümliche, dichte Verzierung der Glabella mit grossen flachen Höckern von 0,5—1 mm Durchmesser lässt keinen Zweifel, dass hier *Ch. variolaris* vorliegt. Die

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. II. pag. 164. 165.

2) Dieses Horn fehlt der Schmidtschen Varietät *Ch. variolaris* var. *mutica* (Fr. Schmidt l. c. pag. 184. Taf. XI. Fig. 25. 26).

3) cf. Fr. Schmidt l. c. pag. 184.

ersten beiden Seitenfurchen sind kurz, wenig gebogen und unter etwa 30° nach hinten gewendet; die dritten Seitenfurchen sind länger, stärker gebogen und gehen unter grösserem Winkel, etwa 45° nach hinten; wenige Millimeter vor dem Hinterrande der Glabella endigen sie blind. Die ersten beiden Seitenlappenpaare stehen etwa um das doppelte ihrer Breite, das dritte etwa um die eigene Breite von einander ab.

Maasse: Länge der Glabella bis zum Anfange des Hornes: 21 mm, mittlere Breite 16 mm.

Fundorte: Wehlau Ostpreussen. Aus Westpreussen beschreibt Kiesow a. a. O. ein Bruchstück einer sehr grossen Glabella unserer Art von Spengawskén.

Anstehend ist *Ch. variolaris* aus dem Echinospaeritenkalk C_1 , und der Kuckerschen Schicht C_2 Estlands und aus dem Chasmopskalk Westgotlands bekannt. Das Gestein sowohl des Stückes von Wehlau, als des von Spengawskén ist Echinospaeritenkalk; die Heimat beider Stücke ist sicher Estland.

Cheirurus (Nieszkowskia) cephaloceras Nieszkowski. Taf. II. Fig. 13. 13a.

1857. *Sphaerexochus cephaloceras* Nieszkowski: Monographie pag. 70 (600). Taf. I. Fig. 4—5.

1860. *Zethus triplicatus* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1406. Taf. LV. Fig. 2a b.

1882. *Ch. (Nieszkowski) cephaloceras* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 186. Taf. IX. Fig. 9 bis 16. Taf. XI. Fig. 27. Taf. XVI. Fig. 36. 37.

Eine Glabella mit teilweise erhaltener fester Wange liegt mir vor. Sie ist bei ungefähr gleicher Form kräftiger gewölbt als die von *Ch. variolaris*. Wie bei der vorigen Art läuft die Glabella noch hinten in ein drehrundes, etwas gebogenes Horn aus, das nach Fr. Schmidt¹⁾ etwas über dem Nackenringe liegt. Obwohl der Hinterrand der Glabella und der Nackenring fehlen, so lässt doch das Bruchstück der linken festen Wange, welche zum Hinterrande fast senkrecht abfällt, mit Sicherheit darauf schliessen, dass der Nackenring vom Grunde des Hornes etwa dieselbe Entfernung hat, wie das bei Schmidt Taf. IX. Fig. 10 abgebildete Exemplar von Kuckers.

Ausserdem ist die Glabella, wie die Wange mit den für *Ch. cephaloceras* charakteristischen kurzen, etwas spitzigen Höckerchen bedeckt. Der Verlauf der Seitenfurchen ist etwa derselbe wie bei *Ch. variolaris*, nur sind die dritten Seitenfurchen etwas länger und stärker nach hinten gebogen.

Maasse: Länge der Glabella bis zum Grunde des Hornes 16 mm; mittlere Breite 12 mm.

Fundort: Wehlau in Ostpreussen.

Ch. cephaloceras ist anstehend nur in Estland bekannt, und kommt dort im Echinospaeritenkalk C_1 und der Kuckerschen Schicht C_2 vor.

Unser Stück liegt in einem Geschiebe von der Beschaffenheit des Echinospaeritenkalkes.

1) cf. Fr. Schmidt l. c. pag. 186. Taf. IX. Fig. 10 u. 12.

Gattung: **Amphion Pander.**

Als einzigen Vertreter der Gattung *Amphion* aus unseren Geschieben führe ich die Art:

***Amphion priscus* n. sp.** Taf. II. Fig. 19. 19a.

an, welche mir in 2 Bruchstücken von Schwanzschildern vorliegt. Das besser erhaltene, auf Taf. II Fig. 18 abgebildete Stück zeigt eine nach hinten stark verschmälerte Spindel, welche aus 5, durch tiefe Furchen getrennten Ringen und einem kleinen dreieckigen Endgliede besteht. Die Seitenteile sind in ihrer äusseren Hälfte stark nach unten gebogen und tragen je 5, durch tiefe Furchen getrennte Pleuren, welche vom Knie ab frei sind und in scharfen Spitzen endigen. Das letzte Pleurenpaare ist gerade nach hinten gerichtet. Die Oberfläche ist, soweit die dünne Schale noch erhalten ist, fein und dicht gekörnelt. — Länge 10 mm, Breite 12 mm, Spindelbreite 5 mm.

Fundort: Westpreussen-Belschwitz.

A. priscus lag in einem Geschiebe buntfarbigen Glaukonitkalkes (cf. pag. 4) vom Alter des Ceratopygekalkes; als Heimat dieses Geschiebes ist Schweden aufzufassen.

Die nächsten Beziehungen hat *A. priscus* zu *A. (Pliomera) primigenus* Angel¹⁾ mit welcher Art die vorliegenden Stücke in Bezug auf die Pleurenanzahl übereinstimmen, die verschiedene Grösse aber und das Auftreten der grubenförmigen Vertiefung auf dem Endgliede der Spindel bei *A. primigenus* trennen beide Arten.

Anhang:

***Cheirurus?* sp.** Taf. II. Fig. 14.

Das auf Taf. II. Fig. 14 abgebildete Schwanzschild gehört zur Familie der Cheiruriden. Die nach hinten stark verschmälerte Spindel besteht aus drei hochgewölbten Gliedern, die durch tiefe Furchen getrennt sind; auf das dritte Glied folgt ein länglich dreieckiges Endglied mit schwach buckelförmiger Erhöhung in seinem vorderen Teile. Jederseits sind drei, ungefähr gleich lange, stark gewölbte Pleuren vorhanden, die in breite Zähne auslaufen. Diese Zähne, sowie der dem hintersten Spindelgliede folgende breit zahnartig ausgebildete Endlappen sind von einem schmalen, flachen, deutlich abgesetzten Randsaume umgeben. Die Pleuren sind ungefurcht und lassen in ihrer Mittellinie je eine Reihe feiner länglicher Höckerchen (auf dem Abdruck als Vertiefungen erscheinend) erkennen. Die Oberfläche ist im übrigen fast ganz glatt. Länge 20 mm, Breite 28 mm, Spindelbreite 10 mm.

Fundort: Kurschitten in Kurland, nahe der Grenze Ostpreussens.

Die meiste Aehnlichkeit zeigt das vorliegende Stück mit dem von Angelin zu *Platymetopus lineatus*²⁾ gestellten Schwanzschilde. *Platymetopus* ist eine Untergattung von *Lichas*³⁾ und hat als solche nur Arten, deren Schwanzschilder deutlich gefurchte Pleuren tragen. Das Kopfschild der Angelinschen Art *Platymetopus li-*

1) cf. Angelin: Pal. Scand. pag. 90. Taf. XLI. Fig. 15.

2) cf. Angelin: Pal. Scand. pag. 75. Taf. XXXVIII. Fig. 12 u. 13.

3) cf. Fr. Schmidt: Rev. II. pag. 28 u. 29.

neatus gehört sicher zur Gattung Lichas, während das mit dem vorliegenden gut übereinstimmende Schwanzschild durch seine ungefurchten Pleuren von Lichas getrennt ist und auf die Zugehörigkeit zur Familie der Cheiruriden schliessen lässt.

Ausser dem von Angelin irrthümlicher Weise zu *Platymetopus lineatus* gestellten Schwanzschildes kenne ich keines, das mit dem vorliegenden übereinstimmt. Die gleichartige Ausbildung beider Schwanzschilder mit vierteiliger Spindel, 3 freie endigenden ungefurchten Pleuren und dem dreieckigen Endlappen zeigt soviel Uebereinstimmung mit der Gattung Cheirurus, dass ich sie dieser zuzähle; jedenfalls aber gehören sie keiner der bekannten Gruppen von Cheirurus an, sondern bilden eine eigene Untergattung, deren Begrenzung ich nach dem vorliegenden geringen Material nicht wagen darf.

Sphaerexochus? sp. Taf. II. Fig. 18.

In einem harten, sehr dichten, schwärzlichgrauen Geschiebe unbekannten Fundortes (Samml. d. hies. Prov.-Mus.) lag das Taf. II. Fig. 18 abgebildete Schwanzschild. Es ist ungefähr halbkreisförmig, mit breiter 4gliederiger Spindel; jederseits sind 3 frei endigende abgerundete Pleuren vorhanden; der Hinterrand ist gebuchtet. Dem Stücke lag eine Bestimmung „*Sphaerexochus cf. minutus* Nieszkowski“ bei. Ob das vorliegende Schwanzschild in die Verwandtschaft dieser Art, die nach Schmidt¹⁾ garnicht zur Familie der Cheiruriden zu zählen ist, gehört, oder ob es zu *Sphaerexochus mirus* Beyr²⁾, mit dem es viele Aehnlichkeit hat, zu stellen ist, kann ich nicht entscheiden. Da der Fundort des betreffenden Stückes unbekannt ist — möglicherweise ist es garnicht in unserem Diluvium gefunden, denn das Gestein ist wesentlich von dem unserer Geschiebe verschieden, — habe ich die Gattung *Sphaerexochus* garnicht weiter erwähnt.

VI. Fam.: Encrinuridae.

Gattung: **Cybele: Lovén.** Linnarsson. Fr. Schmidt.
(Zethus. Volb. Pand.)

Cybele revaliensis Fr. Schmidt. Taf. V. Fig. 16 u. 19.

1874. Zethus sp. Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 58. Taf. V. Fig. 8.

1882. *Cybele revaliensis* Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 207. Taf. XIII. Fig. 20. Taf. XIV. Fig. 6. Taf. XV. Fig. 6. 7. Taf. XVI. Fig. 40.

Eine Glabella und ein teilweise erhaltenes Schwanzschild liegen mir vor. Die Glabella ist wenig länger als breit, flach gewölbt und nach vorn nur wenig verbreitert. Die drei Paare von Seitenfurchen sind kurz, tief, und alle, das erste Paar am stärksten, schräg nach vorn gezogen, ohne die Rückenfurchen zu erreichen. Die Endgrube und einer der Seitentuberkel sind deutlich zu erkennen. Die Oberfläche trägt neben 8 paarig gestellten Höckern noch einige kleinere unregelmässig verteilte. Diese Besetzung der Glabella mit Höckern würde gegen die Zugehörigkeit zu *C. revaliensis*

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. II. pag. 189.

2) cf. Beyrich.: Unters. üb. Trilob. II. Stück pag. 5. Taf. I. Fig. 8c.

sprechen,¹⁾ wenn nicht aus dem Bruchstücke der einen festen Wange die Stellung des Auges gegenüber der dritten Seitenfurche zu erkennen wäre, wie Schmidt sie für diese Art angiebt¹⁾, ausserdem ist die Nackenfurche zu beiden Seiten der Glabella ebenso wie bei den estländischen Stücken vertieft und verbreitert.

Das Schwanzschild ist ungefähr ebenso lang als breit. Die Spindel verschmälert sich nach hinten zu allmählich, vorn ist sie sehr stark gewölbt, vom vierten Gliede ab ist sie flach. Bei 15 allmählich undeutlicher werdenden Spindelgliedern hat das Schwanzschild je vier gefurchte, stark nach hinten gebogene Pleuren. Das hintere, breitere Band der Pleuren ist gewölbt und mit feinen Höckerchen verziert. Die Pleuren laufen nach Schmidt²⁾ in kurze dreieckige Spitzen aus.

Maasse: Länge der Glabella 13 mm, Breite 10 mm. Länge des Schwanzschildes 15 mm, Breite 14 mm, Spindelbreite 7 mm.

Fundorte: Königsberg, Rosenberg.

Ch. revaliensis gehört dem Echinospaeritenkalk an und ist anstehend nur aus Estland bekannt.

Cybele cf. Grewingki Fr. Schmidt. Taf. V. Fig. 17. 17a.

(1882. Cybele Grewingki Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 211. Taf. XIV. Fig. 1. 2.)

Ein bei Wehlau gefundenes Kopfschild zeigt nur geringe Abweichungen von C. Grewingki, so dass ich es in die Verwandtschaft dieser Art stelle. Die Glabella ist stark gewölbt, auf ihrem Rücken fast dachförmig; der Stirnlappen fällt ziemlich steil zur Randfurche ab. Die Rückenfurchen divergieren nach vorn wenig. Die drei Seitenfurchenpaare erreichen die Rückenfurchen nicht, das erste Paar ist schräg nach vorn vorgezogen. Auf der Glabella sind deutlich die 8 paarigen Knötchen zu erkennen. Der Vorderrand trägt die Bruchstellen von 5 dicht gestellten Randhöckern und der beiden von diesen getrennten „Endtuberkel“. Die festen Wangen sind fast ebenso hoch wie die Glabella gewölbt, in ihrem äusseren Teile sehr stark heruntergebogen, weit kräftiger als es die Abbildung Schmidt's Taf. XIV. Fig. 1a. zeigt. Die Augen liegen gegenüber den zweiten Seitenfurchen. Die Wangen zeigen neben feinen spitzigen Höckerchen flache Grübchen, die weniger dicht stehen als bei der Schmidt'schen Art. Neben den angeführten geringen Unterschieden in Bezug auf die Wölbung und Verzierung der Wangen unterscheidet sich das vorliegende Stück von der echten Cybele Grewingki noch durch seine geringe Grösse.

Länge des Kopfes 9 mm, Breite 25 mm.

Fundort: Wehlau.

Das Gestein entspricht dem der Jeweschen Schicht; die Heimat unserer Art wäre also in Estland oder einem jetzt vom Meere bedeckten Nachbargebiete zu suchen.

Cybele rex Nieszkowski. Taf. V. Fig. 15. 15a.

1857. Zethus rex Nieszkowski: Monographie pag. 100 (614) Taf. I. Fig. 3.

1882. Cybele rex Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 209. Taf. XIII. Fig. 21—23. Taf. XIV. Fig. 3. 4.

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. I. pag. 207.

2) cf. Fr. Schmidt: l. c. pag. 208.

Eine kleine Glabella zeigt die für diese Art charakteristischen Merkmale: Sie ist nach vorn wenig verbreitert, schwach gewölbt, der Stirnlappen fällt sonst zum Vorderrande ab. Die Glabella ist mit 8 paarigen, ziemlich nahe stehenden Höckerchen verziert; zwischen den 4 vorderen Höckerchen liegt noch ein kleineres fünftes. Der Stirnrand ist mit 5 drehrunden, gerade nach vorn gerichteten Zähnen besetzt, von denen die zwei etwas kürzeren „Endtuberkel“ durch eine Lücke getrennt sind (in der Fig. 15. Taf. V. sind diese Tuberkel etwas zu gross gezeichnet). Der Nackenring ist schmal, aber hoch gewölbt, mit drei Höckerchen besetzt.

Länge 9 mm, Breite 6 mm.

Fundort: Puschdorf bei Wehlau, Ostpreussen.

C. rex gehört der Kucker'schen Schicht C_2 an und ist bisher anstehend nur aus Estland bekannt.

Cybele sp. a. Taf. V. Fig. 18.

Das Schwanzschild Taf. V. Fig. 18 liegt in einem Geschiebe hellgrauen dichten Kalkes vom Alter der Jeweschen Schicht. Seine Spindel besteht aus 4 deutlichen und etwa 10—12 undeutlichen Gliedern. Die Seitenteile tragen 4 in stumpfe Spitzen endigende Pleuren, zwischen die sich das spitz dreieckige Endglied der Spindel schiebt.

Fundort: Spittelpark bei Königsberg, Ostpreussen.

Cybele sp. b. Taf. VI. Fig. 35.¹⁾

Ein kleines Geschiebe von Beyrichienkalk enthielt neben *Atrypa reticularis* Linné *Calymene intermedia* Lindstr., *Enerinurus punctatus* Wahlbg. und *Beyrichia Buchiana* var. *nutans* Kiesow auch das auf Taf. VI. Fig. 35 abgebildete Bruchstück einer Glabella von *Cybele*.

Neben 8 deutlicheren paarigen Knötchen treten noch einige feinere unpaarige auf, namentlich zwischen den ganz kurzen tiefen Seitenfurchen. Diese Besetzung der Glabella mit Knötchen, sowie der vor der Glabella sich hinziehende schmale Randsaum mit den Bruchstellen einiger Randhöckerchen lassen keinen Zweifel, dass wir hier eine zur Gattung *Cybele* gehörende Form vor uns haben, die ich mit keiner der bekannten Arten identifizieren kann.

Durch die oben aufgezählten Versteinerungen wird das betr. Geschiebe als obersilurisch charakterisiert: *Cybele* sp. b. gehört mithin dem Obersilur an und ist der erste Vertreter der Gattung in den Schichten dieses Alters. Leider ist das beschriebene Bruchstück auch das einzige vorhandene und so wenig charakteristisch, dass ich darauf hin davon zurückstehen muss, eine neue Art der Gattung *Cybele* zu begrenzen.

Maasse: Länge der Glabella 6 mm, Breite 4 mm.

Fundort: Rosenberg in Westpreussen. Heimat: das Ostseebecken?

1) Vergl. pag. 12.

Gattung: **Encrinurus Emmrich.****Encrinurus obtusus Angelin.** Taf. V. Fig. 25. 25 a.1852 (78). *Cryptonymus obtusus* Angelin: Pal. Scand. pag. 3. Taf. IV. Fig. 9.1885. *Encrinurus obtusus* Lindström: Förteckn. på. Gotl. Sil. Crust. pag. 53.

Ein grösseres und ein kleineres Schwanzschild aus einem grauen ober-silurischen Kalke zeigen die von Angelin angegebenen Charaktere dieser Art. Die Spindel besteht aus 14 Gliedern, welche in der Mitte je ein kleines, rechts und links von einer seichten Einsenkung begleitetes Knötchen tragen. Die stark abwärts gebogenen, gewölbten Seitenteile bestehen aus 10 getrennten, nicht über den Randsaum hervorragenden Pleuren, deren Oberfläche eine ganz feine Körnelung zeigt.

Maasse: Länge 8 mm, Breite 7,5 mm, Spindelbreite 3,5 mm.

Fundort: Wehlau, Ostpreussen.

Anstehend ist *E. obtusus* bisher nur aus Gotland bekannt.**Encrinurus cf. obtusus Angelin.**(1882. *Encrinurus? obtusus* Angelin in Fr. Schmidt. Rev. I. pag. 224.)

Ein kleines Schwanzschild von Pr. Holland zeigt eine mit dem von Schmidt a. a. O. beschriebenen Exemplar aus der oberen öselschen Schicht Estlands übereinstimmende Ausbildung, indem auf der Spindel abwechselnd die zweiten Glieder Knötchen tragen. Die Seitenteile bestehen, wie bei der Hauptform, aus 10 Pleuren. Das von Kiesow¹⁾ als *E. cf. obtusus* beschriebene Schwanzschild von Königsthal bei Danzig scheint zwischen den beiden mir vorliegenden Formen eine Mittelstellung einzunehmen, indem die Knötchen auf den Spindelringen verschieden verteilt sind; sie fehlen auf dem 5., 6., 8. und 10. Ringe; die Pleurenanzahl ist 11.

Encrinurus cf. Seebachi Fr. Schmidt. Taf. V. Fig. 24. 24a.(1882. *Encrinurus Seebachi* Fr. Schmidt, pag. 229. Taf. XIV. Fig. 25. Taf. XV. Fig. 23.)

Das Taf. V. Fig. 24 abgebildete Schwanzschild steht der Schmidtschen Art *E. Seebachi* sehr nahe. Es ist länger als breit, spitz dreieckig. Die Spindel lässt über 30, in der Mitte undeutlicher werdende Glieder erkennen, während die Seitenteile aus 10, in stumpfen Zähnen endigenden, Pleuren bestehen, deren Trennungsfurchen tief sind, aber nicht die Breite der Pleuren erreichen, wie Schmidt²⁾ es für *E. Seebachi* angiebt.

Maasse: Länge 15 mm, Breite 12 mm, Spindelbreite 4 mm.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg.³⁾

E. cf. Seebachi wurde in einem Geschiebe vom Alter der Wesenberger Schicht gefunden. Heimat: Ein Estland benachbartes Gebiet des Ostseebeckens.

1) cf. Kiesow: Sil.- u. Dev.-Gesch. pag. 79, Taf. IV. Fig. 8a—c.

2) cf. Fr. Schmidt. Rev. I, pag. 281.

3) Kiesow erwähnt l. c. pag. 80 ein gleichaltriges Stück ebenfalls als *E. cf. Seebachi* aus Westpreussen.

Encrinurus punctatus Wahlenberg. Taf. V. Fig. 20. 21. 22. Taf. VI. Fig. 32.

1874. Encrinurus punctatus Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 58. Taf. IV. Fig. 15.

1882. Encrinurus punctatus Wahlenberg in Fr. Schmidt. Rev. I. pag. 225 Taf. XIV. Fig. 11—13. Taf. XV. Fig. 18.

Diese in unseren Geschieben sehr häufige Art zeichnet sich durch die nach vorn stark erweiterte birnförmige Glabella aus, die ziemlich gleichmässig mit nicht zu hohen rundlichen Höckern besetzt ist. Am Seitenrande des hinteren Glabellateiles treten zwischen den kurzen, grubenförmigen Seitenfurchen gröbere Höcker auf.

Besonders charakteristisch sind die Schwanzschilder. Sie sind länglich dreieckig, hinten zugespitzt. Die Spindel besteht aus 24—27 Gliedern, die in der Mitte undeutlicher werden. In der Mittellinie der Spindel treten 6 Höckerchen auf, deren Zwischenräume nach hinten zu enger werden. Die Seitenteile bestehen aus 7 bis 8 Pleuren, die stark abwärts gebogen sind und in rundliche Zähnen auslaufen. Der Hinterrand läuft in eine mehr oder weniger aufwärts gebogene Spitze aus. Auf den Pleuren treten in der Nähe der Spindel undeutlichere Knötchen auf, welche jederseits eine neben der Spindel verlaufende Reihe bilden. Das auf Taf. V. Fig. 20a. b. abgebildete Stück ist ein besonders grosses, und breites, leider abgerolltes Exemplar, bei welchem die Knötchen auf den Pleuren des Schwanzschildes jederseits zwei Reihen bilden. Fig. 21 und 22 auf Taf. V. zeigen eine Glabella und ein Schwanzschild der kleineren, sehr häufig gefundenen Form. Taf. VI. Fig. 32 giebt eine freie Wange mit dem gestielten, leider weggebrochenen Auge wieder.

Fundorte: Ost- und Westpreussen, häufig.

E. punctatus geht sowohl durch das ganze Obersilur Estlands als Gotlands.

Encrinurus sp. Taf. V. Fig. 23. 23a.

In einem zum Teil bereits in Backsteinkalk umgewandelten Geschiebe fand sich neben *Mastopora concava* Eichw. das auf Taf. V. Fig. 23 wiedergegebene Schwanzschild. Seine Spindel lässt ungefähr 30 ganz ausgebildete Ringel erkennen, während die Seitenteile aus 7 stark abwärts und nach hinten gerichteten Pleuren bestehen, welche durch tiefe, breite Furchen getrennt sind und in stumpfe gerundete Spitzen auslaufen. Die Ausbildung der Spindel erinnert an *E. Seebachi*, von welcher Art das vorliegende Stück jedoch durch die geringere Pleurenzahl getrennt ist.

Fundort: Mewe in Westpreussen.

Das Geschiebe ist der Jeweschen Schicht gleichalterig. Durch *Mastopora concava* wird Estland als wahrscheinliche Heimat bestimmt.

VII. Fam.: Calymenidae.

Gattung: **Calymene Brongniart.** Emmrich. Dalman (z. T.) Barrandt.

Calymene tuberculata Brünnich. Taf. VI. Fig. 19a b c.

1822. Calymene Blumenbachi Brongniart: Hist. nat. des Crustac. foss. pag. 11. Taf. I. Fig. 1.

1828. Calymene Blumenbachi var. tuberculata Dalman: Palaeaden pag. 35. Taf. I. Fig. 2.3.

1874. Calymene Blumenbachi Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 11. Taf. V. Fig. 1. 2a.

1885. Calymene tuberculata Brünnich in Lindström: Förteckn. på Gotl. Silur. Crustac. pag. 63. Taf. XVI. Fig. 9.

Unter dem Namen *C. Blumenbachi* sind bisher meistens zwei Formen zusammengefasst worden: *C. tuberculata* und *C. tuberculosa*. Dalman unterschied beide Formen noch als Varietäten von *C. Blumenbachi*. Spätere Schriftsteller zogen beide Formen wieder unter dem alten Brongniartschen Namen zusammen, bis endlich durch die oben citierte Arbeit Lindströms über die Gotländischen Silurischen Crustaceen eine genaue Grenze zwischen *C. tuberculata* und *C. tuberculosa* gezogen wurde.

In unseren Geschieben konnte ich nur die eine der Arten, *C. tuberculata*, nachweisen.

Das halbmondförmige Kopfschild ist ringsum von einem sehr stark gewulsteten Randsaume und einer tiefen, aber nicht sehr breiten Randfurche umgeben; vor der Glabella ist der Randsaum stark aufgeworfen. Die Glabella ist hoch gewölbt, jederseits mit drei Lappen, deren vorderster ganz klein ist, während der dritte, grösste, birnförmig gestielt erscheint. Das charakteristische Merkmal, das unsere Art von *C. tuberculosa* unterscheidet, ist der Verlauf der Gesichtsnaht hinter dem Auge: sie geht dort zuerst gerade nach dem Seitenrande zu, biegt dann nach der Hinterecke um, überschreitet die Randfurche kurz vor der Ecke, geht auf den Randwulst über, auf dem sie zuerst eine kurze Strecke gerade nach hinten verläuft, um dann in der Ecke nach unten umzubiegen. (Bei *C. tuberculosa* geht die Naht in gerader Richtung über die Randfurche zur Ecke.)

Der Leib besteht aus 13 Ringen mit hochgewölbter Spindel, die Pleuren sind diagonal gefurcht, ihre abgerundeten Enden sind etwas nach vorne gebogen.

Das Schwanzschild ist gerundet dreiseitig, hochgewölbt. Die Spindel besteht aus 6 bis 8 Gliedern, auf den Seitenteilen sind meisten 6 gefurchte Pleuren zu erkennen.

Die Oberfläche ist feingekörnelt (cf. Taf. VI. Fig. 19a), bei den meisten unserer Geschiebeexemplare ist die Körnelung abgerieben.

Die Grösse wechselt, das auf Taf. VI. Fig. 19 abgebildete Stück zeigt folgende Maasse:

Kopfschild: Länge 16 mm, Breite 31 mm, hintere Glabellabreite 12 mm.

Breite des Schnauzenschildes 14 mm.

Schwanzschild: Länge 14 mm, Breite 24 mm, Spindelbreite 8 mm.

C. tuberculata ist häufig in Ost- und Westpreussen. Anstehend kommt sie auf Gotland vor und wird auch jedenfalls im Obersilur Estlands heimisch sein, von wo Fr. Schmidt in der geologischen Einleitung zu seiner Revision der ostbaltischen Trilobiten nur den Namen *C. Blumenbachi* citiert.

***Calymene intermedia* Lindström. Taf. VI. Fig. 20. 20a.**

1885. *Calymene intermedia* Lindström: Förteckn. på. Gotl. Crust. pag. 71. Taf. XV. Fig. 5—12.

Das Kopfschild ist etwas mehr doppelt so breit als lang, von einer sehr breiten und tiefen Vorder- und Seitenrandfurche und einer schmalen Hinterrandfurche umgeben. Der Randsaum ist vor der Glabella besonders hoch aufgeworfen. Die Glabella ist stark gewölbt, bei dem auf Taf. VI. Fig. 20 abgebildeten Stücke sogar schwach gekielt. Drei Paar, nach hinten an Grösse zunehmende Seitenlappen sind vorhanden. Die Augen liegen weit nach hinten, ungefähr gegenüber den dritten

Seitenfurchen, so dass die festen Wangen hinter den Augen weit schmäler sind als bei *C. tuberculata*. Die Oberfläche ist ganz fein gekörnelt.

Fundort: Balschwitz, Westpreussen. — Ostpreussen ohne Ortsangabe. Beyrichienkalk. *C. intermedia* ist anstehend aus Gotland bekannt, doch wird sie jedenfalls auch in Oesel, der Heimat eines grossen Teiles unserer Beyrichienkalke, vorkommen.

***Calymene spectabilis* Angelin.** Taf. VI. Fig. 21.

1852 (78). *Calymene spectabilis* Angelin: Pal. Scand. pag. 28. Taf. XIX. Fig. 5.

1884. *Calymene spectabilis* Kiesow: Sil.- u. Devon.-Geschiebe Westpr. pag. 81.

Einige schlecht erhaltene Schwanzschilder aus ostpreussischem Beyrichienkalk stimmen mit einem Exemplar von Schüddelkau-Westpreussen, aus der Sammlung des Herrn Dr. Kiesow, gut überein.

Die Spindel ist hochgewölbt, zehnteilig, von sehr tiefen Rückenfurchen begrenzt. Die Pleuren, von denen nur die vier ersten deutlich zu erkennen sind, sind, wie Angelien angiebt, viermal breiter, als die Furchen zwischen ihnen; bei erhaltener Schale ist das Verhältnis noch grösser. Die Oberfläche ist fein chagriniert.

Fundorte: Ost- und Westpreussen in Beyrichienkalcken.

Anstehend ist *C. spectabilis* aus dem Obersilur Gotlands bekannt.

Gattung: ***Homalonotus***: Koenig.

(*Dipleura*, *Trimerus*, Geen.)

Mir selbst lag kein Vertreter dieser Gattung vor. Dr. Kiesow erwähnt¹⁾ ein Schwanzschild von

***Homalonotus cf. rhinotropis* Angelin**

aus Westpreussen (Spengawskén). Nach der von Kiesow gegebenen Diagnose: „Rhachis und Seitenlappen ungefähr gleich breit; die Anzahl der Pleuren beträgt 8, die der Rhachisglieder 10“ steht diese Form augenscheinlich dem Angelinschen *H. rhinotropis*²⁾ sehr nahe. Als Heimat giebt Kiesow Gotland an.

VIII. Fam. Lichidae.

Gattung: ***Lichas* Dalman.**

Arges Goldf. *Nutlainia* Portlock. *Metopias* Eichw.

I. *Arges* Goldfuss. (*Trochurus* Beyrich.)

Die ersten Seitenfurchen endigen blind; die zweiten sind schwach angedeutet, die dritten fehlen. Das Schwanzschild hat jederseits zwei Pleuren, deren hinteres Band schmal, aber hoch gewölbt ist, während das vordere flach ist. Die Oberfläche ist mit feinen Wärzchen besetzt.

1) cf. Kiesow: Sil.- u. Devon.-Geschiebe Westpreussens pag. 24 und 82.

2) cf. Angelin: Pal. Scand. pag. 30. Taf. XX. Fig. 1a—9.

Lichas (Arges) Salteri Fletcher. Taf. VI. Fig. 17.

1854 (1872) *Lichas gibbus* Angelin Pal. Scand. 71. Taf. XXXVII. Fig. 1. (Schwanzschild!).

1874. *Lichas gibba* (?) Angelin in Steinhardt: Preuss. Trilobiten pag. 31. Taf. III. Fig. 10.

1885. *Trochurus Salteri* Fletcher in Lindström: Fökteckning pag. 60.

Die von Lindström¹⁾ gegebene Beschreibung seines *Trochurus Salteri* passt vollständig auf das von Steinhardt als *Lichas gibba* beschriebene Schwanzschild. Es ist von fast halbkreisförmigem Umriss; die Spindel ist schmal, stark gewölbt, ziemlich lang und besonders am vorderen Teil deutlich geringelt. In der Verlängerung der Spindel läuft eine kräftige Rippe zum Hinterrande. Jederseits sind zwei Pleurenpaare vorhanden, deren hinterer Theil als starke Rippe hervortritt. (Der vordere flache Teil des ersten Pleurenpaares ist weggebrochen). Der Rand ist gewulstet. Ueber den Rand ragen die Fortsätze der hinteren Pleurenteile und der Längsrippe als kurze, stumpfe Fortsätze hinaus. Ausserdem ist der Rand hinter den zweiten Pleuren noch mit je zwei dicht zusammenstehenden kurzen Zacken besetzt.

Die Oberfläche ist mit Höckerchen besetzt.

Fundort: Gumbinnen, Ostpreussen.

Nach Lindström kommt *L. Salteri* im mittleren und nördlichen Teile Gotlands vor, sie gehört also dem Ober-Silur an, und zwar den mittleren und oberen Gotländer Schichten.

II. Leilolichas. Fr. Schmidt.

Die Furchen treten nur auf dem Steinkern deutlich hervor. Die zweiten Seitenfurchen fehlen. Das Schwanzschild ist ganz randig, ohne Seitenzähne, mit fünf Furchen auf jeder Seite. Gelenkflächen sind vorhanden.

Lichas illaenoides Nieszkowski. Taf. V. Fig. 12. 13.

1857. *Platymetopus illaenoides* Nieszkowski. Monographie pag. 622. Taf. III. Fig. 3—5.

1874. *Lichas convexa*? Steinhardt: Preuss. Trilobiten pag. 34. Taf. III. Fig. 7a—b.

1885. *Lichas illaenoides* Fr. Schmidt. Rev. II. Acid. u. Lichiden pag. 46. Taf. III. Fig. 27—31.

Die Glabella ist gleichmässig, am Vorderrand etwas stärker gewölbt. Die ersten Seitenfurchen endigen blind, die zweiten fehlen, die dritten erscheinen als Fortsetzung des geraden Teiles der Nachenfurchen. Die dritten Seitenlappen sind sehr kurz, aber stark in die Breite gezogen. Bei erhaltener Schale sind die Furchen kaum zu erkennen.

Das Schwanzschild ist breit, halbelliptisch, hochgewölbt, bei erhaltener Schale ohne jede Andeutung von Furchen. Auf dem Steinkern tritt die kurze flache Spindel deutlich hervor. Sie trägt an ihrem Vorderende ein Glied. Auf den Seitenteilen sind jederseits fünf Furchen vorhanden. An den Seitenteilen des Vorderandes tritt eine schmale, ziemlich lange Gelenkfläche auf, die die Fähigkeit des Tieres, sich einzuzrollen, beweist. Die Oberfläche ist ganz glatt.

1) Vergleiche Lindström: Fökteckning på Gotlands Siluriska Crustaceer pag. 60, in Betreff des Namens *Lichas gibbus* Angelin auch pag. 61 unter *Trochurus pusillus*.

Von dieser so wichtigen Art lag mir nur ein kleines Bruchstück einer Glabella vor. Das von Steinhardt als *L. convexa* beschriebene Stück war mir unzugänglich; — es befindet sich in der Mascke'schen Sammlung. Neben einer Copie nach Steinhardt¹⁾ gebe ich die Copie eines Schwanzschildes nach Schmidt²⁾. Die Beschreibung ist zum Teil aus Schmidt entlehnt.

Fundort: Umgegend von Königsberg.

L. illaenoides gehört der Jewe'schen Schicht an.

Lichas Gageli n. sp. Taf. II. Fig. 33. 33a.

Ein kleines hochgewölbtes Schwanzschild zeigte eine von den bekannten Lichiden so verschiedene Ausbildung, dass ich mich um seiner deutlich ausgeprägten Merkmale willen veranlasst sah, eine neue Art auf dasselbe zu begründen.

Ausgezeichnet ist das Schwanzschild dadurch, dass es an dem erhaltenen vorderen Rande des rechten Seitenlappens die Gelenkfläche ziemlich deutlich zeigt (Taf. II. Fig. 33a.). Die Spindel ist schmaler als jeder der Seitenteile und flach gewölbt; in ihrem vorderen Teile trägt sie ein deutlich begrenztes Glied, hinter welchem durch eine zweite, flache Furche ein zweites Glied schwach angedeutet ist. Die Spindel ist kurz, nach hinten undeutlich begrenzt. Auf den Seitenteilen sind jederseits fünf Furchen, also drei Pleuren vorhanden. Die hinteren Grenzfurchen der dritten Pleuren sind undeutlich, der von ihnen eingeschnürte Hinterlappen ist sehr schmal, am Rande etwas eingebuchtet. Die Mittelfurchen der Pleuren erreichen nicht den Rand des Schwanzschildes. Die Enden der beiden ersten Pleuren bilden ganz kurze, den Rand kaum überragende, nach hinten gerichtete Zähnnchen, doch so, dass das Schwanzschild fast ganzrandig erscheint. Ein ganz schmaler Randsaum umgiebt das ganze Schild. Die Oberfläche ist sehr dicht mit ganz feinen Körnchen bedeckt.

Maasse: Länge 5,5 mm, Breite 8 mm, Spindelbreite 2,5 mm.

Fundort: Cranz, Ostpreussen.

Das mit hellgelber Schale bedeckte Schwanzschild liegt in einem dichten, kieseligen hellgrauen Kalkstein, der dem der Lyckholmer Schicht ähnelt. Heimat: Das „Balticum“.

Das Vorhandensein einer Gelenkfläche, die nur ein deutliches Glied tragende Spindel, die fünf Furchen auf den Seitenteilen bestimmten mich, *L. Gageli* zu *Leilolichas* zu stellen, obwohl die Schale nicht glatt, und der Rand nicht ganz eben ist, wie bei *L. illaenoides*, auf welche einzige Art Schmidt die Gruppe *Leilolichas* begründete.

III. Hoplolichas Dames.

Die ersten Seitenfurchen münden in die Nackenfurche, oder endigen blind. Der Nackenring ist mit einfachen oder gegabelten Fortsätzen verziert. Das Schwanzschild hat jederseits vier Furchen.

1) cf. Steinhardt l. c. Taf. III. Fig. 7a.

2) cf. Fr. Schmidt. l. c. Taf. III. Fig. 30b.

Lichas tricuspidata Beyrich. Taf. II. Fig. 20. 21. 22. 24.

1845. Lichas dissidens Beyrich: Ueb. einige Böhm. Trilob. pag. 30. Fig. 18.

1846. Lichas tricuspidata Beyrich: Unters. üb. Trilobiten. II St. pag. 7. Taf. I. Fig. 7 a b.

1869. Lichas Arenswaldi Karsten: Beitr. z. Landesk. v. Schl.-Holst. I. pag. 66.
Taf. XXII. Fig. 6.

1874. Lichas quadricornis Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 34. Taf. III. Fig. 4.

1875. Hoplolichas tricuspidata Dames: Hoplolichas u. Conolichas. pag. 795. Taf. XII.
Fig. 1. 2. 3. Taf. XIII. Fig. 1.

Die Glabella bildet ein ziemlich regelmässiges Oval. Der Randsaum vor derselben ist durch eine rinnenförmige Furche vom Stirnlappen getrennt. Diese Randfurche geht an den Seiten des Stirnlappens in die Rückenfurchen über, die in schwach S-förmigen Bogen zur Nackenfurche gehen. An der Vereinigungsstelle der Vorderrand- und der Rückenfurchen entspringen die ersten Seitenfurchen, die zuerst sehr stark, dann schwächer bis zum mittleren Teil der Glabella convergieren, von wo aus sie schwach divergierend zur Nackenfurche gehen. Die zweiten Seitenfurchen sind als schwache Eindrücke angedeutet, die dritten sind schärfer ausgeprägt und bilden die direkten Fortsetzungen des mittleren Teiles der Nackenfurche. Der Stirnlappen steigt steil von der Vorderrandfurche an, biegt dann unter etwa 90 Grad um und geht unter ganz flacher Wölbung, fast horizontal zur Nackenfurche. Die ersten Seitenlappen sind länglich, bohnenförmig; in ihrer Mitte sind sie ebenso breit, als der schmalste Teil des Stirnlappens. Die zweiten Seitenlappen bilden rundliche Höcker; die dritten sind oval, stark gewölbt.

Der Nackenring ist in seinem mittleren Teil sehr breit und trägt hier einen langen seitlich etwas zusammengedrückten, starken, nach hinten gerichteten Stachelfortsatz, an dessen Grunde zu beiden Seiten sich je ein starker, spitziger Höcker befindet. Besonders eigentümlich ist bei *L. tricuspidata* die Besetzung der Glabella mit Höckern: Der Stirnlappen trägt vorn, an der Stelle seiner stärksten Wölbung, vier nebeneinander stehende grobe Stacheln, in den Ecken seines Hinterrandes wieder je einen Höcker gröberer Art; die kleinen zweiten Seitenlappen sind ebenfalls durch je einen stärkeren spitzigen Höcker ausgezeichnet. Ausserdem ist die ganze Glabella mit ziemlich starken rundlichen Höckern besetzt. Das Bruchstück einer freien Wange (Taf. II. Fig. 24) stelle ich zu *L. tricuspidata*: es ist grob tuberkuliert, der Augenhöcker ist stark aufgeblasen. Die Seitenrandfurche geht unter einem Winkel von etwa 75 Grad in die Hinterrandfurche über.

Das Schwanzschild ist etwa halbkreisförmig, von einem breiten Randsaum umgeben. Die Spindel ist vorn stark gewölbt, mit zwei deutlichen Ringen versehen; nach hinten fällt sie schräge ab. Die Rückenfurchen convergieren und reichen nur bis zum Randsaume. Jederseits sind auf den schwachgewölbten Seitenteilen vier Furchen vorhanden, welche zwei deutliche, gefurchte Pleuren abschnüren. Die Mittelfurchen der Pleuren gehen bis in den Randsaum. Die Enden dieser beiden ersten Pleuren bilden breite, nach hinten gewendete Zähne, die weit über den Rand hinausragen. Die dritten Pleuren sind ungeteilt, ganzrandig. Der Hinterrand des Schwanzschildes ist in zwei, nahe aneinanderstehende, breite Spitzen ausgezogen. Die Oberfläche des Schwanzschildes ist mit Höckern besetzt.

Fundorte: Ostpreussen: Wehlau, Königsberg, Pr. Holland; Westpreussen: Langenau bei Danzig.

L. tricuspidata gehört dem Echinospaeritenkalk C₁b an, seine Heimat ist Estland.

Taf. II. Fig. 20 und 22 sind Kopieen nach Schmidt (Rev. II. Taf. II. Fig. 12 und 13 nach Stücken aus der Berliner Sammlung); ich gab diese Abbildungen, da mir bis zur Fertigstellung der Tafeln keine wirklich guten Stücke von *L. tricuspidata* zur Verfügung standen.

Lichas affn. tricuspidatae Beyr. Taf. II. Fig. 23.

Eine bei Wehlau gefundene Glabella zeigt in ihrer äusseren Form die nahe Zugehörigkeit zu *L. tricuspidata*; die Besetzung mit Höckern war am Stirnlappen wohl dieselbe, wie bei der vorigen Art: Am vorderen Teil des Stirnlappens sind die Bruchstellen mehrerer grosser, jedenfalls stachelartig ausgebildet gewesener Höcker zu sehen. Von *L. tricuspidata* ist das vorliegende Stück dadurch verschieden, dass die ersten Seitenfurchen vor der schmalsten Stelle des Stirnlappens plötzlich auf eine kurze Strecke stark verflacht sind — bei *L. tricuspidata* bleiben sie gleich tief, — und ferner dadurch, dass die ersten Seitenlappen an ihrem Ende zwei grössere spitze Höcker tragen, die hintereinander liegen und durch eine flache Vertiefung (die zweite Seitenfurchen ?) von einander getrennt sind. Ein kleines spitzes Höckerchen im Verlauf des hinteren Teiles der ersten Seitenfurchen lässt eine Annäherung an *L. proboscidea* Dames erkennen.¹⁾

Fundort: Wehlau. Gestein: Echinospaeritenkalk.

Lichas Plautini. Fr. Schmidt. Taf. II. Fig. 32. Taf. VI. Fig. 18.

1874. *Lichas tricuspidata* Steinhardt: Preuss. Trilobiten pag. 33. Taf. III. Fig. 3 a b.

1874. *Lichas dissidens* Beyr. in Steinhardt: l. c. pag. 30. Taf. III. Fig. 8.

1885. *Lichas Plautini* Fr. Schmidt: Rev. II. Acidaspiden u. Lichiden. pag. 75. Taf. II. Fig. 17—24.

Von *L. Plautini* lagen mir nur zwei unvollständige Schwanzschilder vor. Die von Steinhardt (Taf. III. Fig. 3) abgebildete Glabella gehört der Masckeschen Sammlung an und war mir nicht zugänglich.

Das Kopfschild²⁾ unterscheidet sich von *L. tricuspidata* durch folgende Merkmale: Die Seitenfurchen der Glabella sind viel tiefer ausgebildet, die zweiten Seitenfurchen fehlen vollständig. Die ersten Seitenlappen sind breiter als die schmalste Stelle des Stirnlappens. Die Höcker, mit denen die Glabella von *L. Plautini* besetzt ist, sind spitz kegelförmig, grösser als bei *L. tricuspidata*, und auf dem ganzen Stirnlappen fast von derselben Grösse. Während der mittlere Teil des Stirnlappens bei *L. tricuspidata* 4—5 kleinere Höckerchen neben einander zeigt, treten hier bei *L. Plautini* nur immer etwa je zwei Höcker auf.

1) cf. Dames: *Hoplolichas* u. *Conolichas*. Zeitsch. d. D. geol. Ges. 1877. pag. 801. Taf. XII. Fig. 4.

2) cf. Fr. Schmidt: Rev. II. Acidaspiden u. Lichiden. pag. 76—78.

Der Nackenring trägt einen cylindrischen Fortsatz, am Grunde jederseits von einem spitzen Höcker begleitet.

Das Schwanzschild ist flach, halbkreisförmig. Die Spindel ist mässig gewölbt, stumpf kegelförmig, nach hinten kräftig abfallend. Zwei Segmente sind stets deutlich zu unterscheiden, ein drittes tritt weniger scharf hervor (Taf. VI. Fig. 18 und Fr. Schmidt Taf. II. Fig. 23). Die flachen Seitenteile sind von einem breiten Randsaum umgeben. Jederseits sind vier Furchen vorhanden. Die beiden ersten Pleuren endigen in starke, nach hinten gerichtete Seitenzähne, ihre Mittelfurchen gehen nur bis zum Randsaum. Die dritten Pleuren sind ungeteilt, ihr Aussenrand bildet mit den Zähnen der zweiten Pleuren eine enge tief einschneidende Bucht. Der Hinterrand ist in einen kurzen dreieckigen Zahn ausgezogen.

L. Plautini ist in ost- und westpreussischen¹⁾ Geschieben gefunden worden und gehört dem Echinospaeritenkalk an.

Lichas proboscidea Dames.

1874. Lichas quadricornis var. Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 34. Taf. III. Fig. 5.

1877. Lichas proboscidea Dames: Hoplolichas u. Conolichas pag. 801. Taf. XII. Fig. 4. Taf. XIII. Fig. 23.

Steinhardt erwähnt am ang. Orte eine Glabella aus der Masckeschen Sammlung als L. quadricornis variet. Dames hat nach diesem und ähnlichen Stücken seine Art L. proboscidea begründet, die bei naher Verwandtschaft mit L. tricuspidata sich von dieser durch einen sehr starken grossen Stirnstachel unterscheidet. Ausserdem tritt bei L. proboscidea im Hinterende der ersten Seitenfurchen ein Höckerchen auf (vergl. L. aff. tricuspidatae).

L. proboscidea ist bisher anstehend nicht gefunden worden.²⁾ Das Steinhardtsche Stück stammt aus Ostpreussen. Seine Heimat dürfte das Ostseebecken sein.

Lichas media. n. sp. Taf. II. Fig. 25. 25a.

Mehrere Glabellen, die mit einem Fortsatz am Nackenringe versehen sind, zeigten eine von den anderen Arten der Gruppe Hoplolichas so verschiedene Ausbildung, dass ich sie einer neuen Art zuzähle.

Der vordere Randsaum ist vor dem Stirnlappen schmal, nach den Seiten verbreitert er sich. Die Vorderrandfurchen schneidet tief in den Stirnlappen ein, sie geht seitlich in die schwach S-förmig gebogenen Rückenfurchen über, welche deutlich bis zur Hinterrandfurchen gehen und auch noch eine schwache Fortsetzung auf den etwas wulstigen Hinterrand entsenden. Die ersten Seitenfurchen convergieren zuerst sehr stark; auf dem Rücken der Glabella gehen sie in gleichmässigen schwachen Bogen zur Nackenfurchen; kurz vor der Nackenfurchen biegen sie etwas nach aussen und senden von der Umbiegungsstelle eine flachere Fortsetzung in die Nackenfurchen. Die zweiten Seitenfurchen fehlen; die dritten bilden die Fortsetzung des geraden Teiles der Nackenfurchen. Der Stirnlappen steigt vom Vorderrande steil auf, in seinem

1) cf. Fr. Schmidt: Rev. II. pag. 79.

2) cf. Fr. Schmidt: Rev. II. pag. 39.

mittleren und hinteren Teile ist er flach. Die ersten Seitenlappen sind bohnenförmig und ebenso breit wie der engste Teil des Stirnlappens; sie sind etwas niedriger als derselbe. Die zweiten Seitenlappen sind kaum angedeutet. Die dritten Seitenlappen sind länglich eiförmig und liegen erheblich tiefer als die ersten.

Der Nackenring ist in der Mitte schildförmig verbreitert; sein Hinterrand war zu einem rundlichen Stachelfortsatz ausgezogen.

Die ganze Glabella ist mit Höckern besetzt, welche nach hinten zu gröber werden. An den Hinterecken des Stirnlappens liegen zwei besonders grobe, hohe Höcker, ebenso sind die Enden der ersten Seitenlappen durch je einen grösseren spitzen Höcker verziert.

Fundort: Ostpreussen; Umgegend von Königsberg. Gestein: Echinospaeritenkalk.

L. media bildet den Uebergang zwischen der Gruppe der *Lichas tricuspidata*, die durch Stirnstacheln und ungeteilte Nackenfortsätze ausgezeichnet ist, und der Gruppe der *L. conicotuberculata* ohne Stirnstachel und mit gegabelten Nackenfortsätzen.

IV. *Conolichas Dames.*

Der Stirnlappen allein, oder auch die ersten Seitenlappen springen nach vorn konisch gewölbt vor. Nackenring ohne Fortsätze.

Lichas aequiloba Steinhardt. Taf. V. Fig. 14.

1874. *Lichas aequiloba* Steinhardt: Preuss. Trilobiten pag. 30. Taf. III. Fig. 6.

1886. *Lichas aequiloba* Fr. Schmidt: Rev. II. Acid. u. Lichiden. pag. 89. Taf. V. Fig. 4—10.

Steinhardt begründete seine neue Art *L. aequiloba* auf eine Glabella aus der Sammlung des Herrn Mascke. Mir selbst lag die Art nicht vor, ich citiere sie, als aus preussischen Geschieben stammend, daher nur kurz. Der Stirnlappen zerfällt in einen grossen, stark gewölbten vorderen Teil, und in einen schmalen, flachen, niedrigeren hinteren Teil. Die ersten Seitenlappen sind gross, nach hinten verbreitert und hier noch breiter wie der vordere Teil des Stirnlappens. Die zweiten Seitenlappen fehlen, die dritten sind ganz klein, länglich oval, niedrig.

Die Abbildung Taf. V. Fig. 14 ist eine Copie nach Fr. Schmidt Rev. II. Taf. V. Fig. 8a. (Exemplar von Parizy bei Gatschina).

V. *Homolichas Fr. Schmidt.*

Stirn- und Seitenlappen sind mehr oder weniger stark, gleichmässig gewölbt. Nackenring ohne Fortsätze.

Lichas Branconis n. sp. Taf. II. Fig. 26. 26a.

Der Vorderrand ist in der Mitte schmal, kräftig vorgezogen, nach den Seiten verbreitert. Die Vorderrandfurchen schneiden tief in den Stirnlappen ein. Die Rückenfurchen sind stark Sförmig gebogen. Die ersten Seitenfurchen convergieren zuerst sehr stark, laufen dann in gleichmässigen Bogen über die Glabella und münden in die Nackenfurchen. Die zweiten Seitenfurchen fehlen ganz; die dritten gehen schräg nach innen von den Rückenfurchen zur Nackenfurchen; diese ist sehr breit und, wie

alle Furchen, tief. Der Stirnlappen ist stark nach vorn vorgezogen und steigt von der Vorderrandfurchen, dieselbe überwölbt, hoch auf, dann geht er in gleichmässiger, nicht zu starker Wölbung zur Nackenfurchen, in die er steil abstürzt. In der Mitte der Glabella ist er stark eingeschnürt und etwa nur den fünften Teil so breit, als vorne. Die ersten Seitenlappen sind sehr gross, fast elliptisch, 4 mal so breit als die schmalste Stelle des Stirnlappens; vorn und hinten endigen sie in stumpfe Spitzen. Die zweiten Seitenlappen fehlen; die dritten sind oval, stark gewölbt und liegen unter den ersten Seitenlappen. Der Nackenring, nach den Wangen zu stark abfallend und verschmälert, zeigte einen geraden Hinterrand.

Die ganze Oberfläche ist mit groben Höckern bedeckt, deren Grösse namentlich auf den Seitenlappen nach hinten zunimmt. Zwischen den groben Höckern liegen kleine feinere Knötchen.

L. Branconis lag mir in einer Glabella aus bräunlichem erdigem Gestein vor, das gut mit einem von Kuckers aus Estland stammenden Handstücke übereinstimmt. Unsere Art gehört demnach der Kuckers'schen Schicht C₂ an.

Fundort: Wehlau, Ostpreussen.

L. Branconis scheint mir eine Vorläuferin der *L. deflexa*, die in der Jeweschen Schicht vorkommt, zu sein. Der stark eingeschnürte Mittellappen und die breiten Seitenlappen sprächen dafür, während der vorn hoch gewölbte und weit vorgezogene Stirnlappen *L. Branconis* von *L. deflexa* trennt.

***Lichas deflexa* Sjögren. Taf. II. Fig. 30. 30a.**

1854 (1872). *Lichas deflexa* Sjögren in Angelin Pal. Scand. pag. 71. Taf. XXXVII. Fig. 3a—c.

1874. ? *Lichas conicotuberculata* Steinhardt: Preuss. Trilob. pag. 28. Taf. III. Fig. 2a—c.

1874. *Lichas velata* Steinhardt: l. c. pag. 30. Taf. III. Fig. 9.

1885. *Lichas deflexa* Fr. Schmidt: Rev. II. Acid. u. Lichid. pag. 101. Taf. IV. Fig. 24—35.

Mir lag von dieser Art nur eine sehr verdrückte Glabella vor, an deren Stelle ich auf Taf. II. Fig. 30. 30a. Kopieen eines Kegel'schen Exemplars nach Schmidt (Taf. IV. Fig. 24a. b.) gebe.

Der Kopf ist hochgewölbt, nach den Seiten steil abfallend. Der Vorderrand ist schmal, gerade, an den Seiten des Stirnlappen zurückgebogen. Die Vorderrandfurchen geht in die Rückenfurchen über. Die ersten Seitenfurchen sind tief, sie convergieren stark bis zur Mitte der Glabella, nach der Nackenfurchen zu divergieren sie wieder. Die zweiten Seitenfurchen fehlen; die dritten sind kurz, tief, sie stehen fast senkrecht zur Längsaxe und liegen etwas vor dem mittleren Teil der Nackenfurchen. Der Stirnlappen wird auf der Mitte der Glabella sehr stark eingeschnürt, nach vorne zu wird er stark erweitert, seitlich stumpfe Ecken bildend; zum Vorderrande fällt er ziemlich steil ab. Die ersten Seitenlappen sind gross; oval, fast vier mal so breit als die schmalste Stelle des Stirnlappens; die dritten Seitenlappen sind klein, rundlich dreieckig. Die ganze Oberfläche ist mit ziemlich grossen, niedrigen Höckern besetzt.

Das von Steinhardt¹⁾ als *L. velata* beschriebene Schwanzschild gehört zu *L. deflexa*²⁾. Er ist halbkreisförmig, flach gewölbt. Die Spindel ist mässig gewölbt, zweigliederig, nach hinten verschmälert und schräg abfallend. Jederseits sind fünf Furchen tief eingedrückt. Die beiden ersten Pleuren bilden stark nach hinten gerichtete Seitenzähne. Sie sind fast bis zum Ende gefurcht. Der Hinterrand ist in zwei kurze breite Zähne ausgezogen, die durch eine breite flache Bucht getrennt sind.

L. deflexa ist sowohl in Ostpreussen (Königsberg, Wargitten) als in Westpreussen (Gischkau, Langenau)³⁾ gefunden. Die Heimat unserer Stücke dürfte wohl Estland sein, wo *L. deflexa* in der Kegel'schen Schicht D₂ anstehend gefunden ist.

Lichas Eichwaldi Nieszkowski. Taf. II. Fig. 27. Taf. VI. Fig. 16.

1857. Lichas Eichwaldi Nieszkowski: Monogr. d. Trilob. pag. 570. Taf. I. Fig. 16. 17.

1860. Lichas Eichwaldi Eichwald: Leth. rossica pag. 1381.

1874. Lichas Eichwaldi Steinhardt: Pr. Trilobiten. pag. 28. Taf. III. Fig. 1a—c.

1885. Lichas Eichwaldi Fr. Schmidt: Rev. II. Acid. u. Lichiden. pag. 104. Taf. IV. Fig. 10—17.

Eine Glabella und ein Schwanzschild dieser Art lagen mir vor.

Die flachgewölbte Glabella bildet ein breites, hinten abgestutztes Oval. Der Vorderrand bildet einen gleichmässigen, kräftigen Bogen; die Vorderrandfurchen geht seitlich in die Rückenfurchen über. Die ersten Seitenfurchen entspringen vorn an den Seiten der Glabella, wenden sich sehr stark nach innen, gehen dann in flachen Bogen, fast parallel über die Mitte der Glabella, um vor der Einmündung in die Nackenfurchen wieder nach aussen zu divergieren. Die zweiten Seitenfurchen fehlen⁴⁾; die dritten liegen etwas vor dem mittleren Teile der Nackenfurchen und stossen senkrecht auf die Rückenfurchen. Der Stirnlappen ist vorn sanft gewölbt, sehr breit, seine Ecken umgeben vorn die Seitenlappen fast ganz. Die ersten Seitenlappen sind gross, vorne spitz, hinten gerade abgestutzt, mit schwach gebuchtetem Aussenrande, sie sind etwas breiter als der schmalste Teil des Stirnlappens. Die dritten Seitenlappen sind ungefähr dreiseitig, flachgewölbt. Der Nackenring ist schmal, wenig gewölbt, sein Hinterrand ist schwach konvex.

Die Oberfläche ist gleichmässig dicht mit rundlichen Höckerchen besetzt.

Das Schwanzschild ist flach gewölbt, etwas über einen Halbkreis ausgezogen. Die Spindel ist bedeutend schmaler als die Seitenteile, vorne trägt sie zwei deutliche schmale Ringel, der hintere Teil fällt sanft ab. Die Rückenfurchen convergieren wenig. Auf den flachen Seitenteilen sind je 5 Furchen vorhanden. Die beiden ersten Pleuren endigen in ganz kurzen Zähnen, die kaum über den Rand vorspringen, so dass dieser fast glatt erscheint. Das vordere Band der Pleuren ist schmaler als das hintere; die Mittelfurchen der beiden ersten Pleuren bilden nach vorn convexe Bogen

1) cfr. Steinhardt. l. c. pag. 30. Taf. III. Fig. 9.

2) cfr. Fr. Schmidt. l. c. pag. 102. Taf. IV. Fig. 34. 35.

3) cfr. Kiesow: Sil. u. Devongeschiebe, Westpreussen, pag. 80.

4) Die von Fr. Schmidt l. c. pag. 105 erwähnten Andeutungen der zweiten Seitenfurchen in der Höhe der Augen habe ich bei dem mir vorliegenden Exemplar von *L. Eichwaldi* nicht beobachten können.

und endigen in der Nähe der Zähne. Die Hinter- und Mittelfurchen der dritten Pleuren erreichen den Rand nicht. Der Hinterrand des Schwanzschildes ist schwach eingebuchtet. Um das ganze Schild läuft ein breiter schwacher Randsaum. Die Oberfläche ist fein gekörnelt.

Maasse: Länge der Glabella 25 mm, Breite 19 mm. Vordere Breite des Stirnlappens 17 mm, schmalste Stelle desselben: 4 mm. Breite der Seitenlappen 6 mm.

Schwanzschild: Länge 17 mm, Breite ca. 27 mm, Spindbreite 8 mm.

Fundorte: Belschwitz (Westpreussen). Wehlau (Ostpreussen).

L. Eichwaldi gehört nach Schmidt¹⁾ der Wesenberger Schicht Estlands an.

Lichas cf. Pahleni Fr. Schmidt. Taf. II. Fig. 28. 29. 31.

1885. Lichas Pahleni Fr. Schmidt: Rev. II. Acid. u. Lichiden pag. 97. Taf. IV. Fig. 6—8 (9).

Zwei Glabellen zeigen grosse Aehnlichkeit mit L. Pahleni Fr. Schmidt: Sie sind mässig gewölbt, die ersten Seitenfurchen verlaufen in gleichmässigen Bogen über die Glabella, die dritten Seitenfurchen liegen etwas vor der Nackenfurche und stützen die vorderen Seitenlappen hinten gerade ab, die Oberfläche ist wie bei L. Pahleni fein gekörnelt. Von L. Pahleni sind die beiden Glabellen durch folgende Merkmale unterschieden: Der Stirnlappen ist vorn sehr stark, doch gleichmässig vorgezogen, und fällt zum Rande steiler ab. Die Andeutung der zweiten Seitenfurchen²⁾ fehlt. Die Augenfurche auf der einen erhaltenen festen Wange (Fig. 29) bildet ein stumpfwinkliges Knie und nicht wie bei L. Pahleni einen Bogen.

Mit der einen der Glabellen (Taf. II. Fig. 28) wurde ein kleines wohl erhaltenes Schwanzschild gefunden, das den Hinterrand besser erhalten zeigt, als das von Schmidt (Taf. IV. Fig. 8) abgebildete Schwanzschild von L. Pahleni. Die Spindel ist hoch gewölbt, etwas schmaler als die Seitenteile, nach hinten etwas verengt, und schräge abfallend; sie zeigt zwei deutliche Ringel. Die flachen Seitenteile tragen 5 deutliche Furchen. Die beiden ersten Pleuren endigen in spitze breite, nach hinten gerichtete Zähne; ihre gebogenen Mittelfurchen münden in die Bucht zwischen den Zähnen ein. Die Mittelfurchen der dritten Pleuren erreichen den Rand nicht; die Grenzfurchen derselben konvergieren und gehen fast bis zum Rande. Der Hinterrand bildet zwei kurze spitze Zähne, die durch eine enge tiefe Bucht getrennt sind. Die Oberfläche des Schwanzschildes ist sehr dicht und fein gekörnelt.

Maasse: Länge der Glabella 1,8 mm, Breite 14 mm.

„ „ „ 11 mm, „ 9 mm.

Länge des Schwanzschildes 11 mm, Breite 2,2 mm, Spindbreite 6 mm.

Fundort: Umgegend von Königsberg, in bläulich grauem, feinkörnigem, fast dichtem Kalke, der dem der Jeweschen Schicht ähnelt.³⁾

1) cf. Fr. Schmidt l. c. pag. 107.

2) cf. Fr. Schmidt l. c. Taf. IV. Fig. 6a.

3) L. Pahleni selbst gehört der Jewe'schen Schicht D₁ an; vergl. Fr. Schmidt: Rev. II. Accl. u. Lichid. pag. 100.

Lichas sp. Taf. II. Fig. 35.

Das auf Taf. II. Fig. 35 abgebildete Schwanzschild aus Wesenberger Gestein scheint in die Verwandtschaft der Lichas Pahleni F. Schm. zu gehören. Die Spindel ist hoch gewölbt, vorn mit 2 schwach angedeuteten Ringeln.

Auf den Seitenteilen sind 5 Furchen vorhanden. Die beiden ersten Pleuren endigen in spitze Seitenzähne. Der Hinterrand fehlt. Der Umschlag des Schwanzschildes ist mit feinen Terrassenlinien verziert.

Fundort: Rippkeim bei Wehlau Ostpreussen, in rötlichem Wesenberger Kalk.

Lichas cf. angusta Beyrich. Taf. II. Fig. 34.

1846. Lichas angusta Beyrich: Unters. üb. Trilobiten. II. St. pag. 6. Taf. I. Fig. 6.

1875. Lichas angusta Beyrichin Fr. Schmidt. Rev. II. pag. 108. Taf. IV. Fig. 18—23.

Eine kleine, schlecht erhaltene Glabella aus Ostpreussen zeigt den in der Mitte stark verschmälerten Stirnlappen, wie *L. angusta*, doch der Vorderteil des Stirnlappens ist nicht stumpfwinklig vorgezogen, sondern gleichmässig aber stark gewölbt. Die Oberfläche ist sparsam mit kleinen Höckerchen bedeckt.

Fundort: Wehlau Ostpreussen.

Das Gestein ist dem der Lyckholmer Schicht ähnlich.

Lichas Lindströmi. n. sp. Taf. V. Fig. 10.

Ein Schwanzschild aus einem Geschiebe von Wehlau lag mir vor, das der schwedischen Art *L. triquetrus* Lindström sehr nahe steht. Herr Prof. Lindström, der die Liebenswürdigkeit hatte, das betr. Geschiebe zu begutachten, riet mir die vorliegende Art von *L. triquetrus* zu trennen. Diesen Rat befolgend, erlaube ich mir, diese neue Art *L. Lindströmi* zu benennen. Das Schwanzschild ist flach, nicht ganz doppelt so breit als lang. Die Spindel ist hochgewölbt und wie bei *L. triquetrus*¹⁾ hinten durch eine tiefe Furche deutlich begrenzt, ihr vorderer Teil ist nicht erhalten; er trug jedenfalls 2 Ringe. Jederseits sind auf den Seitenteilen 5 Furchen erhalten. Die beiden ersten Pleuren endigen in stark nach hinten umgebogene Zähne; ihre stark gebogenen Mittelfurchen gehen etwa bis zur Bucht eines jeden Zahnes. Die Grenzfurchen der dritten Pleuren convergieren sehr stark, ohne jedoch wie bei *L. triquetrus* zusammen zu stossen. Die kurzen Mittelfurchen der dritten Pleuren gehen bei *L. Lindströmi* von den hinteren Grenzfurchen etwas hinter der Endfurche der Spindel aus, während sie bei *L. triquetrus* in gleicher Höhe mit dieser Endfurche entspringen. Der etwas zerstörte Hinterrand war in zwei kurze, stumpfe, dichtgestellte Zähnchen ausgezogen. Die Oberfläche ist dicht und fein gekörntelt.

Maasse: Länge 7 mm, Breite 12 mm, Spindelbreite 3,5 mm.

L. Lindströmi gehört dem Ober-Silur an. Nach einer Mitteilung des Herrn Prof. Lindström entspricht das Gestein ungefähr der obersten Gotländer Zone h. (vergl. Seite 12).

1) cf. Lindström: Förteckning på Gotlands siluriska Crustaceer. in. Oefversigt af. K. Vetensk.-Akad. Förhandl. No. 6, pag. 59 (Jahrg. 1885).

V. Oncholichas. Fr. Schmidt.

Die ersten Seitenfurchen münden in hakenförmigen Bogen in die Nackenfurche ein. Am Schwanzschilde sind jederseits 3 vollständig ausgebildete Pleuren vorhanden.

Lichas aranea Lindström. Taf. V. Fig. 11.

1885. *Lichas araneus* Lindström. Förteckning på Gotlands Crustac. pag. 58, Fig. 30, Taf. XV.

Ein Bruchstück eines Schwanzschildes ist gut mit der angeführten Lindströmschen Art zu vereinigen. Die Pleuren sind bis zum Ende deutlich gefurcht, die beiden ersten Pleuren endigen in stumpfe Zähne, die dritten in kurze Vorsprünge. Der Hinterlappen zwischen den dritten Pleuren ist schwach eingebuchtet. Trotz einer grossen Aehnlichkeit mit *L. Visbyensis* Lindström¹⁾ musste ich das vorliegende Stück zu *L. araneus* stellen, da der Abdruck eines Spindelstückes in demselben Geschiebe, den gleichmässigen Abfall der Spindel nach hinten zu zeigte, während *L. Vibyensis* im hinteren Teile der Spindel eine buckelförmige Erhöhung mit steilem Abfall zeigt. Die Schale ist dicht gekörnelt. *L. araneus* ist bei Marienwerder gefunden worden (vergl. pag. 12). Nach Lindström kommt *L. araneus* auf Få-rö, also im oberen Gotländer Obersilur vor.

IX. Fam. Acidaspidae.

Gattung: **Acidaspis Murch:** Barr. Schmidt.
(*Odontopleura*, Emmr., Burm., Beyr., Römer.)

Acidaspis mutica Emmrich. Taf. VI. Fig. 30. 31.

1845. *Odontopleura mutica*: Emmrich: Ueber die Trilobiten. pag. 44.

1846. *Odontopleura mutica*: Beyrich: Unters. üb. Trilob. II. Stück. pag. 19. Taf. III. Fig. 3.

1888. *Acidaspis mutica*: Wiegand: Trilob. d. sil. Gesch. Meklenb. pag. 93. Taf. X. Fig. 19abc. 20.

Eine Glabella und ein Schwanzschild aus graulich grünem Graptolithengestein stelle ich zu dieser Art.

Die Glabella ist breit eiförmig, vorn etwas eingeschnürt. Die ersten Seitenfurchen fehlen, die zweiten biegen bald nach hinten um und erreichen kaum die Umbiegung der dritten Seitenfurchen, welche deutlich bis zur Nackenfurche gehen. Der Nackenring ist breit, hinten convex; die seitlichen Lappen desselben sind ziemlich deutlich ausgebildet. Die Oberfläche ist gekörnelt, in der Mitte des Nackenringes steht ein gröberes Höckerchen.

Der vordere Rand des Schwanzschildes ist gerade, die Vorderecken sind kurz abgerundet. Die Spindel lässt zwei Glieder deutlich, ein drittes undeutlicher erkennen. Dem zweiten Gliede entspricht auf den Seitenteilen ein nach hinten gebogener Wulst, dessen Verlängerung als kräftiger Stachel über den Rand hinausragt. An

1) cf. Lindström l. c. pag. 58. Taf. XVI. Fig. 11.

den Seiten tritt vor diesen Stacheln je ein Zähnchen, am Hinterrande treten vier Zähnchen auf. Die Oberfläche des Schwanzschildes ist fein gekörnelt.

Fundort: Pr. Holland, Ostpreussen, in Graptolithengestein.

Heimat: Das Ostseegebiet zwischen Schweden und Estland.

Anhang:

Das von Kiesow (Sil. und Devon. Geschiebe Westpr. pag. 80 Taf. IV. 9 a b) aus Wesenberger Gestein erwähnte Schwanzschild einer Acidaspisart, scheint mit der Barrandeschen Art *Ac. Hörnesi* (Barr. Bd. I. pag. 723. Taf. XXXVIII. Fig. 30) nahe verwandt zu sein.

Was Steinhardt (Pr. Trilob. pag. 62) für eine Art aus der Masckeschen Sammlung vorgelegen hat, kann ich nicht entscheiden. Steinhardt stellt sie in die Verwandtschaft von *Ac. Prevosti* Barr., doch diese Art hat stets 4—5 Seitenstacheln vor dem eigentlichen Pleurenstachel¹⁾, während Steinhardt nur drei angiebt.

X. Fam.: Proëtidae.

Gattung: **Proëtus-Steininger.** Barrande (z. T.).

(*Forbesia*. M'Coy. *Gerastos*-Goldfuss.)

Proëtus verrucosus Lindström. Taf. V. Fig. 27.

1885. *Proëtus verrucosus* Lindström: Förteckn. på Gotl. sil. Crust. pag. 81. Taf. XVI. Fig. 15.

In einem dichten grauen, etwas mergeligen Kalke aus Westpreussen liegt eine grosse etwas verdrückte Glabella, welche deutlich die Merkmale der Lindströmschen Art *Pr. verrucosus* besitzt: Sie ist ziemlich kräftig gewölbt, nach vorn verschmälert, mit fast gerade abgestutztem Hinterrade. Die Seitenfurchen, drei Paare an der Zahl, sind sehr wenig deutlich; die dritten sind stark nach hinten gerichtet. Auf dem Nackenringe werden durch tiefe Aeste der Nackenfurche ziemlich grosse, rundlich dreieckige, stark gewölbte Seitenbuckel abgeschnürt. Die Oberfläche ist mit flachen, warzenförmigen Höckern bedeckt, die nach hinten zu gröber werden. Der Randsaum vor der Glabella ist mit sehr feinen parallelen Terrassenlinien verziert.

Länge der Glabella 10 mm, hintere Breite 10 mm, vordere Breite 6 mm.

Fundort: Belschwitz in Westpreussen.

Anstehend ist *Pr. verrucosus* bisher nur aus den Mergelschiefern Gotlands bekannt.

Proëtus signatus Lindström. Taf. VI. Fig. 22.

1884. *Proëtus pulcher* Nieszk. var. *Kiesow*: Sil. u. Devon. Gesch. pag. 84. Taf. IV. Fig. 12.

1885. *Proëtus signatus* Lindström: Förteckn. på Gotl. sil. Crust. pag. 80. Taf. XIV. Fig. 16. 17.

Mehrere kleine Glabellen stimmen gut mit der von Lindström a. a. O. für *Pr. signatus* gegebenen Beschreibung: Sie sind ziemlich kräftig, in der Mitte fast

1) cf. Barrande Bd. 1. *Ac. Prevosti* pag. 739. Taf. XXXIX. Fig. 33—41.

dachförmig, gewölbt, nach vorn stark verschmälert. Die Seitenfurchen sind als feine schräg nach innen verlaufende Eindrücke ausgebildet. Die beiden ersten Paare sind kurz, gerade, nach innen etwas verbreitert; die dritten laufen zuerst den vorderen parallel und knicken dann nach hinten um; in der Verlängerung ihres vorderen Astes liegt ein kleiner länglicher Eindruck. Vor den ersten Seitenfurchen sind bei einzelnen Stücken noch kleine kürzere Vertiefungen — je eine auf jeder Seite — zu erkennen.

Die Oberfläche erscheint fein chagriniert. Der vor der Glabella ziemlich stark gewölbte Randsaum ist mit feinen, parallelen Terrassenlinien verziert. Auf dem Nackenringe sind deutlich die länglich dreieckigen Seitenbuckel abgeschnürt; das eine der Stücke (von Belschwitz in Westpreussen) lässt einen feinen Mittelhöcker erkennen.

Maasse: Länge der Glabella 5 mm, Breite 4 mm.

„ „ „ 7 „ „ 5,5 „

Mit dem einen der Stücke wurde ein kleines Schwanzschild gefunden, das bei 5 mm Länge und 7 mm Breite eine hochgewölbte neungliedrige Spindel und sieben längsgefurchte Pleuren zeigte, welche fast bis zum Rande deutlich ausgebildet sind; die Seitenteile fallen in gleichmässiger Wölbung ab. Die Oberfläche ist ebenfalls fein chagriniert.

Fundorte: Pr. Holland, Ostpreussen; Belschwitz: Langfuhr, Westpreussen.

Das Gestein ist ein gelblicher, bröckeliger Kalk mit weissen Kalkspathnestern; seine Heimat ist das gotländische Obersilur.

Proëtus concinnus Dalman. Taf. VI. Fig. 27.

1828. Calymene concinna Dalm: Palaeaden. pag. 40. Taf. I. Fig. 5a—c.

1885. Proëtus concinnus Lindström: Förteckn. på. Gotl. Sil. Crust. pag. 78.

Glabellen dieser Art fand ich mehrfach in grauem körnigem Leperditien-gestein. Sie zeichnen sich durch sehr starke Wölbung aus, und sind nach vorn wenig verschmälert. Von den Seitenfurchen sind nur die beiden letzten Paare als ganz schwache, kaum erkennbare Eindrücke ausgebildet. Die Oberfläche erscheint unter der Lupe kaum chagriniert. Der Nackenring trägt stets deutliche stark gewölbte Seitenbuckel und Mittelhöcker.

Das auf Taf. VI. Fig. 27 wiedergegebene bei Ragnit gefundene Schwanzschild ist ungefähr halbkreisförmig mit hochgewölbter achthgliedriger Spindel, deren erste Ringel besonders kräftig ausgebildet sind. Die flachgewölbten Seitenteile lassen 4—5 gefurchte nicht sehr deutliche Pleuren erkennen, welche bis zu dem, das ganze Schild umgebenden Randsaum gehen.

Fundorte: Ostpreussen, Umgegend von Königsberg, Ragnit (in feinkörnigem gelbgrauem Kalk). Westpreussen, Umgegend von Danzig. Belschwitz.

Pr. concinnus gehört sowohl dem Obersilur Gotlands als Oesels an.

Proëtus affin. concinno Dalman. Taf. VI. Fig. 26.

[1828. Proëtus concinnus Dalman: Palaeaden pag. 40. Taf. I. Fig. 5a—c.]

In einem Geschiebe graulichen, feinkörnigen, etwas mergeligen Kalkes, der

in seiner Beschaffenheit dem Leperditiengestein sehr ähnlich ist, fanden sich mehrere kleine Glabellen einer Proëtusart, welche dem *Pr. concinnus* als nahe verwandt zu erachten ist. Die Glabella ist kurz, ziemlich kräftig gewölbt. Die Seitenfurchen scheinen vollständig zu fehlen. Der Nackenring zeigt bei einigen Bruchstücken deutlich die scharfabgeschnürten Seitenbuckel, wie sie für *Pr. concinnus* charakteristisch sind, und einen kleinen Mittelhöcker. Von der gotländischen Form des *Pr. distans*¹⁾, mit der die vorliegenden Stücke die Form und Ausbildung der Glabella gemein haben, unterscheidet sich unsere Art dadurch, dass die Glabella hart an den aufgeworfenen vorderen Randsaum stösst.

In demselben Geschiebe wurden mehrere Schwanzschilder gefunden, deren hochgewölbte breite Spindel achtgliederig ist, und deren Seitenteile vier deutlich gefurchte Pleuren tragen. Das ganze Schild ist von einem schwächeren undeutlicheren Randsaume umgeben, als die Stammform des *Pr. concinnus*. — Die Oberfläche ist fast ganz glatt.

Maasse: Länge der Glabella: 2,5 mm, Breite: 2,5 mm.

Länge des Schwanzschildes 3 mm, Breite 5 mm, Spindelbreite 2 mm.

Fundort: Königsberg.

Als Heimat dieser Varietät des *Pr. concinnus* ist das Gebiet zwischen Estland und Schweden anzunehmen.

Proëtus distinctus n. sp. Taf. VI. Fig. 23.

Mehrere Glabellen zeigen eine gewisse Aehnlichkeit mit *Pr. ramisulcatus* Nieszk.²⁾ in bezug auf den Verlauf der Seitenfurchen, indem die ersten beiden Paare schräg nach innen gewendet sind, während das dritte Paar wie bei *Pr. ramisulcatus* einen Ast nach hinten zur Nackenfurche sendet. Von *Pr. ramisulcatus* unterscheidet sich unsere Art durch einen erheblich breiteren Nackenring, auf dem die Seitenbuckel als flache längliche dreieckige Erhöhungen abgeschnürt sind. Nieszkowski giebt ausserdem für *Pr. ramisulcatus* einem breiten gewölbten Randsaum an, während bei meinen Stücken der Randsaum vor der Glabella nur flach aufgeworfen erscheint.

Die Oberfläche der Glabella ist dicht gekörnelt; der Randsaum zeigt neben feinen eingestochenen Pünktchen ganz schwache runzelartige Leistchen.

Maasse: Länge der Glabella 6 mm, Breite 5 mm.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg. Wehlau. Pr. Holland.

Das Gestein ist ein grobkörniger, krystalliner, graubrauner Kalk, der dem Phaseoluskalk sehr ähnlich ist. Die Heimat kann das Ostseebecken zwischen Gotland und Oesel, resp. eine dieser beiden Inseln sein.

Ein mit der auf Taf. 6, Fig. 23 abgebildeten Glabella zusammen gefundenes Schwanzschild, das ich zu dieser Art stelle, ist ziemlich genau halbkreisförmig, von einem breiten flachen Randsaum umgeben. Die hochgewölbte Spindel lässt neun Glieder erkennen, während auf den Seitenteilen sieben deutliche gefurchte Pleuren zu unterscheiden sind.

1) cfr. Lindström: Förteckn. pag. 79. Taf. XV. Fig. 21.

2) cfr. Nieszkowski. Monographie pag. 46 (560) Taf. III. Fig. 1.

Proëtus sp. Taf. VI. Fig. 25.

Die auf Taf. VI. Fig. 25 abgebildete Glabella ist ausserordentlich hoch gewölbt und zeigt auf der vollkommen glatten Oberfläche einen ähnlichen Verlauf der sehr schwach angedeuteten Seitenfurchen wie *Pr. signatus*; der Nackenring ist aber verhältnismässig schmaler und mit weniger grossen Seitenbuckeln verziert.

Fundort: Belschwitz, Westpreussen, in gelbgrauem bröckligen ober-silurischem Kalk.

Proëtus sp. Taf. VI. Fig. 24.

In einem dichten graublauen Kalke, der an Chonetenkalk erinnert, fand ich das auf Taf. VI. Fig. 24 wiedergegebene Schwanzschild. Es ist gleichmässig stark gewölbt, von ungefähr halbkreisförmigem Umriss. Die wulstförmige Spindel nimmt etwa ein Drittel der ganzen Schildbreite ein und zeigt acht deutlich abgesetzte Ringel. Die gleichmässig abfallenden Seitenteile haben sieben längsgefurchte Pleuren, welche fast bis zum Rande des Schildes gehen. Der Rand ist glatt, ohne einen deutlichen Saum. Länge 8 mm, Breite 10 mm.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg.

Gattung **Cyphaspis Burmeister.** Barrande (z. T.)
[Gonipleura-Angelin.]

Cyphaspis parvula. n. sp. Taf. VI. Fig. 28. 28a.

In einem hellgrauen, feinkörnigen Kalk fand ich mehrere kleine Glabellen und freie Wangen einer Cyphaspisart, welche ich mit keinem der bekannten Vertreter dieser Gattung identifizieren konnte. Die Glabella ist kurz, nach vorn stark verjüngt, kräftig gewölbt. Die wenig nach hinten konvergierenden tiefen dritten Seitenfurchen schneiden jederseits längliche Lappen von der Glabella ab, welche etwas niedriger gewölbt sind als die Glabella selbst. Vor der Glabella fällt das Kopfschild schräge nach vorn zu dem gewulsteten breiten Randsaum ab. Die Entfernung der Glabella vom Randsaum ist etwa gleich der Breite des Saumes.¹⁾ Die Oberfläche der Glabella erscheint fast ganz glatt,²⁾ der Randsaum ist fein gestreift. Die erhaltenen freien Wangen sind kräftig gewölbt, in ziemlich lange, spitze Wangenstachel ausgezogen. Die Hinter- und Seitenrandfurchen sind sehr tief und stossen in einem Winkel von ungefähr 45° zusammen, die entsprechenden Randsäume sind stark gewulstet. Der Saum des Seitenrandes ist parallel gestreift. Die Augen sind sehr gross, kugelig aufgeblasen, am Grunde von einer tiefen Furche umgeben.

Maasse: Glabellalänge 3,5 mm, -breite 2,5 mm.

Höhe der Wangen (Entfernung des oberen Augenrandes vom Seitenrande) 4 mm.

Fundort: Königsberg, in hellgrauem, an Phaseoluskalk erinnernden, Kalkstein. Weder aus Schweden noch aus Estland ist mir eine ähnliche Art bekannt.

1) Bei der von Nieszkowski aus Estland beschriebenen Art *Cy. megalops* McCoy ist diese Entfernung dreimal so breit als der Randsaum [cf. Nieszkowski: Monographie pag. 50 (564)].

2) Bei der einzigen schwedischen Art, *C. elegantula* Angelin (Pal. Scand. pag. 23. Taf. XVII. Fig. 7) ist die Oberfläche deutlich gekörnelt.

Dem Gestein nach dürfte als Heimat das Ostseebecken zwischen Gotland und Oesel anzunehmen sein,¹⁾ vielleicht auch eine dieser beiden Inseln selbst.

Cyphaspis sp. Taf. VI. Fig. 29.

In graugrünem Graptolithengestein fand sich neben *Acidaspis mutica* Emmr. das auf Taf. VI. Fig. 29 in dreifacher Vergrößerung wiedergegebene Schwanzschild. Es ist kräftig gewölbt mit hoher siebengliedriger Spindel. Auf den Seitenteilen sind fünf Pleuren vorhanden, welche durch eine Längsfurche in ein vorderes breites und ein schmäleres hinteres Band geteilt werden, und deutlich bis zum Rande gehen. Die Oberfläche ist dicht mit spitzigen Höckerchen besetzt.

Fundort: Pr. Holland. Als Heimat ist das Ostseegebiet zwischen Schweden und Estland anzunehmen.

Im Anschluss an die Gattungen *Proëtus* Stein. und *Cyphaspis* Burm. gebe ich noch eine Charakteristik der im Gotländischen Silur vertretenen Gattung:

Phaëtonides Barrande,

welche den Uebergang von *Proëtus* zu *Cyphaspis* bildet. Unten dem Namen Phaëton fasste Barrande die Formen seiner Proëtidengruppe G. zusammen, deren Schwanzschild mit spitzigen Seitenzähnen verziert ist, und zählte dazu die Formen *Pr. Archiaci planicanda* und *striatus*.²⁾ Diese Arten sind zugleich dadurch ausgezeichnet, dass die dritten Seitenfurchen, abweichend von denen der ächten Proëtiden, tiefer ausgebildet und stärker nach hinten gewendet sind, und, ähnlich wie bei der Gattung *Cyphaspis*, die dritten Seitenlappen fast vollständig von der Glabella abschnüren. Dieselbe Eigentümlichkeit der Glabella weisen auch noch die Barrandeschen Arten *Proëtus decorus* und *Astynax*³⁾ auf, deren Schwanzschild aber nicht gezähnt, sondern ganzrandig ist.

Angelin⁴⁾ stellt aus diesen fünf ebengenannten Arten zusammen mit *Phaëtonides Stokesi* Murch. die Gattung *Phaëtonides* Barr. auf und giebt als besonderes Merkmal an: „*Frons ovata utrinque lobo 1 basali distincto, lineisque 2 obsoletis abbreviatis impressis.*“ Nehmen wir diese Diagnose Angelins als Gattungsmerkmal für *Phaëtonides* an, so sind nicht nur die oben genannten Arten Barrandes und Angelins zu *Phaëtonides* zu zählen, sondern auch *Cyphaspis novella* Barrande⁵⁾ und *Cyphaspis punctillosa* Lindstr.,⁶⁾ welche beiden Arten je drei Seitenfurchen auf der Glabella tragen, während bei allen anderen *Cyphaspis*-arten nur allein die dritten Seitenfurchen ausgebildet sind. Bei näherer Betrachtung erscheint auch die Stellung der Augen dieser Arten als eine andere wie bei den echten *Cyphaspiden*.

1) cf. Nötling: Die Cambr. u. Silur. Geschiebe der Provinzen Ost- und Westpr. Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesanstalt 1882, pag. 297.

2) cf. Barrande: Syst. sil. Vol. I, pag. 471 ff. Taf. XVII. Fig. 24–31 und 42–49.

3) cf. Barrande: l. c. pag. 468, Taf. XVII. Fig. 13–21 und pag. 470, Taf. XVII. Fig. 22, 23.

4) cf. Angelin: Pal. Scand pag. 21.

5) cf. Barrande l. c. pag. 491. Taf. XVIII. Fig. 59, 60.

6) cf. Lindström: Förteckning på Gotl. Sil. Crust. pag. 77.

Während nämlich bei letzteren die Augen immer ungefähr in der Mitte der Wangen liegen, rücken sie bei den zu Phaëtonides zu stellenden Arten ganz nahe an die Glabella heran, so dass hierdurch eine Annäherung an die Gattung Proëtus erzielt wird.

Möglicher Weise gehört auch *Cyphaspis depressa* Barr.¹⁾ zu Phaëtonides, wofür die Stellung der Augen dicht an der Glabella spricht. Allerdings hat Barrande nur bei einigen Exemplaren von *Cy. depressa* Andeutungen der zweiten Seitenfurchenpaare gefunden, während die ersten stets fehlen und meistens nur die dritten in der für die Gattung *Cyphaspis* eigentümlichen Form auftreten.

Fassen wir das vorhin Gesagte zusammen, so können wir die von Angelin gegebene Gattungscharakteristik nur bestätigen, und vereinigen unter Phaëtonides diejenigen zur Familie der Proëtiden gehörenden Trilobiten, „deren Glabella drei Paare von Seitenfurchen zeigt, deren dritte Seitenfurchen die hintersten Seitenlappen ähnlich wie bei *Cyphaspis* in Form länglicher Erhöhungen von der Glabella absehnüren, und deren Augen nahe an der Glabella liegen. Als minderwertiges Merkmal kommt dann noch hinzu, dass der Rand des Schwanzschildes glatt oder gezähnt ist.“

Aus unseren Geschieben liegt mir nur eine kleine Glabella aus Beyrichienkalk vor, die das für Phaëtonides eigentümliche Gattungsmerkmal zeigt, ohne dass sie darauf hin näher zu bestimmen wäre. Der Fundort ist Cranz in Ostpreussen.

XI. Fam.: Illaenidae.

Gattung: *Illaenus* Dalman.

I. Untergattung: *Illaenus* s. str.

A. Augentragende.

***Illaenus jevensis* Holm.** Taf. III. Fig. 1. 1a. 2. 3.

1886. *Illaenus jevensis* Holm, in Fr. Schmidt: Rev. III. Illaeniden pag. 57. Taf. X. Fig. 1—7.

Mehrere Bruchstücke von Kopfschildern und einzelne Schwanzschilder dieser Art lagen mir in Steinkernen vor.

Der Kopf ist breit, von halbelliptischem Umriss. Die Wölbung in der Längsrichtung bildet einen gleichmässigen kräftigen Bogen. Der Vorderrand ist abgerundet. Die breite flache Glabella bildet mit den festen und freien Wangen²⁾ eine gleichmässige Wölbung. Die auf dem Steinkerne scharf eingedrückten Rückenfurchen erreichen etwas über ein Drittel der Länge des Kopfes (nach der Wölbung gemessen); sie convergieren, aber nur wenig, bis etwa zum Vorderende des Augendeckels und gehen dann ein wenig auseinander. Die Augen sind gross, etwa dreiviertel ihrer eigenen Länge vom Hinterrande und etwas mehr als die halbe Glabellabreite von den Rückenfurchen entfernt. Die Gesichtsnaht ist hinter dem Auge beinahe ganz gerade und ganz wenig nach aussen gerichtet. Die freien Wangen sind nach Holm³⁾

1) cf. Barrande l. c. pag. 492. Taf. XVI, Fig. 38—40.

2) Holm: l. c. pag. 57.

3) Holm: Illaeniden pag. 58.

flach gewölbt, nach vorn etwas verschmälert, mit geradem Aussenrande und fast rechtwinkliger Hinterecke.

Der Leib ist zehngliederig.¹⁾

Das Schwanzschild ist etwa $1\frac{1}{4}$ mal so breit als lang, sein Umriss bildet einen Abschnitt einer kurzen Ellipse. Es ist wie das Kopfschild ganz gleichmässig gewölbt. Die Spindel ist breit (über ein Drittel der ganzen Schildbreite), stark gewölbt, und nur in ihrem vorderen Teile deutlich durch die stark convergierenden Rückenfurchen begrenzt. Die Gelenkfläche ist gross, stark nach unten gebogen, ihr Hinter- rand etwa doppelt so gross als der Abstand des Knies von der Spindel. Die Furche hinter dem Knie ist breit und tief. Auf den Seitenteilen sind ganz schwache Andeutungen von Rippen zu bemerken. Der etwas gehöhlte Umschlag nimmt nach hinten an Breite zu; in seiner Mittellinie läuft eine schwache Furche, und sein Vorder- rand bildet hier einen stumpfwinklig-zungenförmigen Vorsprung, der etwa bis zur Mitte des Schwanzschildes reicht (Taf. III. Fig. 3).

Die Schale ist glatt. Am Vorderrande des Kopfes und auf dem Umschlage des Schwanzschildes treten Terrassenlinien auf.

Maasse: Kopfschild: Länge (Projection) 19 mm, Breite 32 mm (des Mittelschildes), Glabella: grösste Breite: 21 mm, geringste Breite: 17,5 mm, Augendeckel- länge 6,5 mm.

Schwanzschild: Länge 26 mm, Breite 35 mm, Spindelbreite 13 mm.

„ 25 „ „ 33 „ „ 12 „

Fundorte: Umgegend von Königsberg.

Iliaenus jevensis Holm gehört der Jeweschen Schicht an und ist bisher in anstehendem Gestein nur in Estland gefunden.

***Iliaenus Chiron* Holm. Taf. III. Fig. 4. 4a. 5.**

1848. *Iliaenus crassicauda* Burmeister: „Neue Beobacht. über Trilob.“ in D'Alton u. Burm. Zeitschr. f. Zool. etc. Bd. I. Heft 10. pag. 79. Taf. I. Fig. 18.

1874. *Iliaenus centaurus* Steinhardt. Preuss. Trilobiten pag. 47. Taf. IV. Fig. 4—6. Taf. V. Fig. 10a—d.²⁾

1883. *Iliaenus Chiron* Holm. Svenska Arterna. pag. 88. Taf. III. Fig. 1—17.

1884. *Iliaenus Chiron* Kiesow. Sil. u. Devon. Geschiebe Westpr. pag. 83.

1886. *Iliaenus Chiron* Holm in Fr. Schmidt. Revision III. *Iliaeniden* pag. 64. Taf. XII. Fig. 13. a. b.

Der kurze, stark nach unten gebogene Kopf zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Die Glabella ist durch kurze tief einschneidende Rückenfurchen begrenzt. Sie übertrifft an Höhe die von den Rückenfurchen stark aufsteigenden festen Wangen um einige Millimeter. Auf dem vorderen Teile der Glabella machen sich — namentlich auf dem Steinkern — zwei ziemlich weit nach vorn gehende parallele ganz flache Furchen bemerkbar. Die grossen Augendeckplatten ragen weit aus dem

1) Holm: *Iliaeniden* pag. 58.

2) Die, Tafel V. Fig. 10a und b, von Steinhardt hinzugezeichneten Wangen sind falsch, sie gehören nach Holm (Schmidt: Revision III. pag. 64) einer *Megalaspis*art an.

Mittelschilde hervor; von denselben geht schräg nach innen und vorn je ein grober Wulst, der zugleich die stärkste Wölbung der festen Wangen in der Längsrichtung angiebt. Der Vorder- und Aussenrand des Kopfschildes bilden einen gleichmässigen flachen Bogen. Der Vorderrand ist mit einer groben Falzlinie versehen.

Die freien Wangen sind nach Holm¹⁾ stark nach unten gebogen gewölbt, etwa von Trapezform, mit kurz abgerundeter Hinterecke.

Der Leib besteht aus 10 Segmenten.²⁾

Das Schwanzschild ist etwas über einen Halbkreis vorgezogen (Länge zu Breite etwa = 2 : 3). Bei den meisten Stücken ist die Wölbung nach dem Rande zu gleichmässig, seltener findet sich die Neigung zur Bildung eines Randsaumes mit breiter Randfurche. Holm³⁾ sieht in dieser verschiedenen Ausbildung des Schwanzschildes örtliche Unterschiede, indem Stücke ohne Randsaum nur Schweden, solche mit Randsaum dem russischen Silur angehören sollen. Die Spindel ist ziemlich lang, bei Stücken mit Schale selten bis zur Spitze deutlich ausgebildet. Die Gelenkfläche ist gross und breit, stark nach unten gebogen, ihr Hinterrand ist grösser als der Abstand von der Spindel bis zum Kniee. Die Furche hinter der Gelenkfläche ist breit und tief.

Die Schalenverzierung dieser Art ist sehr charakteristisch: Die sehr dicke Schale ist sowohl auf dem ganzen Kopf- als Schwanzschilde mit groben Terrassenlinien verziert, zwischen denen ziemlich dichtgestellte grobe Punkte eingestochen sind.

Illaenus Chiron ist sowohl in Ost- als Westpreussen ziemlich häufig gefunden. Die Heimat der meisten Stücke scheint mir Schweden zu sein, da Schwanzschilder mit der Neigung zur Bildung eines Randsaumes recht selten sind.

Illaenus Chiron gehört Geschieben vom Alter des eigentlichen Echinospaeritenkalkes C₁ an.

Illaenus tauricornis Kutorga. Taf. III. Fig. 8. 9. 10. 11.

1860. Illaenus cornutus Eichwald. Lethaea rossica pag. 1480. Taf. LIII. Fig. 7.

1874. Illaenus tauricornis Kutorga in Steinhardt. Preuss. Trilob. pag. 51. Taf. VI. Fig. 2a—c.

1874. Illaenus Eichwaldi Steinhardt. Preuss. Trilobiten. pag. 49. Taf. IV. Fig. 7a—d.

1886. Illaenus tauricornis Holm in Fr. Schmidt. Revision III. Illaeniden. pag. 74. Taf. VI. Fig. 1—11.

Diese sehr charakteristische Art liegt mir in mehreren Bruchstücken mit zum Teil wohl erhaltener Schale vor.

Der Kopf ist mehr als zweimal so breit als lang, in der Längsrichtung sehr stark gewölbt, in seinem vorderen Teile gerade zum Vorderrande abfallend. Der Vorderrand ist abgerundet, doch ziemlich scharf. Die stärkste Wölbung des Kopfschildes liegt zwischen den Augen. Die Rückenfurchen sind sehr tief und stark eingedrückt, sie gehen etwa bis zur halben Länge des Kopfschildes. Die Glabella ist

1) cf. Holm: Svenska Arterna pag. 92. Taf. III. Fig. 10.

2) cf. Holm: Svenska Arterna pag. 92. Taf. III. Fig. 1.

3) Holm: Illaeniden (Fr. Schmidt. Revision III) pag. 66.

meistens hochgewölbt und zwischen den Augen sehr stark eingeschnürt, nach vorn und hinten erweitert sie sich fast gleichmässig. Die festen Wangen steigen von den Rückenfurchen hoch auf, so dass die Augendeckel die Höhe der Glabella noch bedeutend überragen. Zum Hinterrande fallen die festen Wangen steil ab. Die Augendeckel sind gross, mehr als einen Halbkreis bildend, kräftig gewölbt, und liegen weit nach hinten; ihr Abstand von den Rückenfurchen beträgt $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ der Glabellabreite und mehr. Die Gesichtsnähte sind hinter dem Auge stark nach aussen gerichtet, vor den Augen divergieren sie in schwach Sförmigen Bogen nach vorne.

Die freien Wangen fallen steil ab. Die Hinterecken sind in lange, drehrunde, nach aussen gerichtete, geschwungene Hörner ausgezogen. Die freie Wange erhält dadurch die Form eines Dreiecks mit dem Aussenrande als längste Seite. Die Sehfläche der Augen ist schmal, bandartig, am Grunde von einer tiefen Furche begrenzt. Der Aussenrand der freien Wangen neigt zur Gratbildung.

Das Schnauzenschild auf dem fast flachen Umschlage ist gross, bis dreimal so breit als lang.

Der Rumpf besteht aus zehn Ringeln, deren Spindel nicht sehr hoch gewölbt ist. Das Schwanzschild ist gerundet dreieckig bis parabolisch, der mittlere Teil ist flach, die Ränder sind ziemlich stark nach unten gebogen. Die Spindel ist kurz, bis zur Spitze deutlich durch die Rückenfurchen begrenzt. Hinter der Spindel ist oft der Ansatz eines schwachen Kieles vorhanden. Der Hinterrand der Gelenkfläche ist kleiner als der Abstand des Knies von der Spindel. Der Umschlag nimmt nach hinten stark an Breite zu und zeigt in der Mittellinie eine ziemlich tiefe Furche. Schalenverzierung: Ueberall treten Terrassenlinien auf, die namentlich auf dem vorderen Teile des Kopfschildes sehr dicht und grob sind. Ausserdem ist das ganze Kopfschild mit Ausnahme der nächsten Umgebung der Rückenfurchen mit sehr groben dichtgestellten eingestochenen Punkten bedeckt. Die Schale des Schwanzschildes zeigt wenige Terrassenlinien, die quer über das ganze Schild hinübergehen.

Maasse: Kopf: Länge (Projektion) 19 mm, Breite ca. 65 mm, Höhe 20 mm. Höhe der Augendeckel über der Glabella 3,5 mm. Glabellenbreite: hinten 17 mm, zwischen den Augen 13 mm, Abstand der Augen von den Rückenfurchen 9 mm, vom Hinterrande 2—3 mm. — Schwanzschild: Länge 23 mm, Breite 42 mm, Spindellbreite 13 mm, Abstand vom Knie bis zur Spindel 9 mm, Hinterrand der Gelenkfläche 6,5 mm.

Illaenus tauricornis Kut. kommt im unteren Echinospaeritenkalk mit Thoneisensteinlinsen — C_{1a} — vor. Die Heimat unserer ost- und westpreussischen Stücke ist Estland.

Der von Steinhardt¹⁾ beschriebene *Illaenus Eichwaldi* ist ganz unzweifelhaft ein *Illaenus tauricornis* von etwas längerer Kopfform. Die anderen für *Ill. tauricornis* angegebenen Merkmale treffen vollständig für das Steinhardtsche Original (ebenfalls aus dem unteren Echinospaeritenkalk) zu.

1) cf. Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 49. Taf. IV. Fig. 7.

Illaenus revaliensis Holm. Taf. III. Fig. 14. 15. 15a.

1874. *Illaenus Wahlenbergi* Eichwald in Steinhardt: Preuss. Tril. pag. 45. Taf. III. Fig. 11a—d.

1886. *Illaenus revaliensis* Holm. in Fr. Schmidt: Rev. III. Illaeniden pag. 87. Taf. II. Fig. 1—9.

Der Kopf ist stark gewölbt, die Glabella in der Mittellinie schwach gekielt und hoch über die stark nach aussen abfallenden festen Wangen gewölbt. Die Rückenfurchen sind lang, zuerst schwach konvergierend, um dann etwa vom Vorderende des Augendeckels ab, ebenso zu divergieren. Die Augendeckel sind mässig gross und stehen etwa um die Hälfte ihrer Länge vom Hinterrande ab, ihr Abstand von den Rückenfurchen kommt ungefähr der halben Glabellabreite gleich. Die Gesichtsnäht hinter dem Auge ist fast gerade nach hinten gerichtet. Eine schlecht erhaltene freie Wange war flach gewölbt, länger als hoch, mit ausgeschweiftem Hinter- und Aussenrande und kurz gerundeter Hinterecke.

Der Leib ist zehngliedrig mit hochgewölbter Spindel, die etwa eineinhalb mal so breit ist, als die Seitenteile. Die Pleuren sind scharf gekniet, ihr äusserer Teil ist bedeutend breiter, als der innere.

Das Schwanzschild ist flach gewölbt, lang, von halbelliptischem Umriss. Die Spindel nimmt vorne ein Drittel der Schildbreite ein, sie ist stark gewölbt, und fast bis zur Spitze durch die stark konvergierenden Rückenfurchen deutlich begrenzt. Hinter der Spindel ist ein flacher Längskiel zu unterscheiden. Die Gelenkfläche ist schwach nach unten gebogen, ihr Hinterrand wenig grösser als der Abstand vom Knie bis zur Spindel. Der Umschlag nimmt nach hinten an Breite zu, läuft hier in eine stumpfwinklige Spitze aus und trägt eine schmale Mittelfurche. Die Schalenverzierung besteht ausser sehr feinen, dichten, eingestochenen Punkten, aus feinen wellenförmigen Terrassenlinien, die namentlich am Vorderteile des Kopfschildes, auf dem Kopfumschlage und dem Schnauzenschilde deutlicher sind. Die Leibesspindel und die äusseren Pleurenteile zeigen ebenfalls kräftigere Terrassenlinien. Auf dem Schwanzschilde sind die Terrassenlinien sehr fein und dicht gestellt; sie sind dem Aussenrande parallel angeordnet, jedoch so, dass die Spindel mit ihrer nächsten Umgebung von ihnen freibleibt. (Die Figur 14 zeigt sie zu grob.)

Maasse: Kopf: Länge 28 mm, Breite des Mittelschildes 30 mm, Glabellabreite (hinten) 17 mm. Schwanzschild: Länge 24 mm, Breite 36 mm, Spindelbreite 9,5 mm.

I. revaliensis gehört nach Holm¹⁾ dem Vaginatenskalke B₃ an, und ist in anstehendem Gestein bisher nur in Estland gefunden. In Ostpreussen ist diese Art bei Königsberg und Pr. Holland in schmutzig graugrünem Gestein mit kleinen Thoneisensteinlinsen gefunden worden.

Illaenus Schmidtii Nieszkowski. Taf. III. Fig. 6. 7.

1857. *Illaenus Schmidtii* Nieszkowski: Monographie d. Trilob. pag. 580. Taf. I. Fig. 10. 11. 12.

1857. *Illaenus centrotus* Nieszkowski: *ibid.* pag. 582.

1) cf. Holm in Fr. Schmidt Rev. III. pag. 92.

- 1) cf. Steinhardt: l. c. pag. 46. Taf. VI. Fig. I.

Mit Sicherheit kann ich dieser Art nur einige kleinere Schwanzschilder zählen, die mit *Illaenus tauricornis* Kut. zusammen im Linsengestein des Echinopaeritenkalkes gefunden sind.

Das Schwanzschild ist langgestreckt, halb elliptisch, flach gewölbt. Die Spindel ist kegelförmig, bis zur Spitze deutlich begrenzt; sie ist kräftig gewölbt und nimmt ein Drittel der vorderen Schildbreite ein. Der Umschlag ist nach hinten sehr stark verbreitert, ganzrandig; eine flache aber deutliche Mittelfurche und eine herzförmige flache Einsenkung habe ich bei mehreren Stücken beobachten können (vergl. *Ill. oblongatus forma excellens* Holm: Rev. III. pag. 119).

Sowohl in Ost- als Westpreussen gefunden. Heimat: Estland.

Ob das Kopfschild — Taf. II Fig. 37a. b. c. — zu dieser Art gehört, kann ich nicht mit Sicherheit feststellen. Es ist stark gewölbt, wie die von Holm erwähnten estnischen Stücke, doch ist die Glabella bei dem vorliegenden Stücke schmaler, und die Gesichtsnaht hinter dem Auge etwas stärker nach aussen gerichtet, als bei den typischen Stücken Holms. Das Gestein des eben angeführten Kopfschildes ist ein harter, heller, dichter Kalk aus Ostpreussen.

***Illaenus angustifrons* Holm. Taf. III. Fig. 12. 12a.**

(Forma typica Holm.)

1861. *Illaenus crassicauda*. F. Roemer: Sadewitz. Diluv. Gesch. pag. 70. Taf. VIII. Fig. 3.

1886. *Illaenus angustifrons* Holm. — Forma typica — Holm in Fr. Schmidt: Rev. III. pag. 131. Taf. IX. Fig. 1—3.

Der Kopf ist schwach gewölbt. Sein Umriss ist nach dem vorliegenden Mittelschilde stumpf, halboval. Die Glabella ist hoch gewölbt und zwischen den Augen stark eingeschnürt. Die scharfen Rückenfurchen erreichen die halbe Länge des Kopfschildes; an der Einschnürungsstelle der Glabella bilden sie ein Knie in Form eines stumpfen Winkels und sind hier besonders tief. Die festen Wangen fallen nach hinten und aussen ziemlich kräftig ab; hinter den Augen sind sie sehr schmal, da hier die Rückenfurchen stark nach aussen gerichtet sind. Die Augendeckel sind etwa doppelt so lang als der Abstand der Augen vom Hinterrande. Die Entfernung der Augen von den Rückenfurchen kommt der halben Breite der Glabella zwischen den Augen gleich. Die Gesichtsnahte sind hinter den Augen gerade, nach aussen gerichtet, vor den Augen sind sie stark S-förmig gebogen. Die freien Wangen sind nach Holm¹⁾ lang, nach vorn stark verschmälert, mit abgerundeter scharfer Hinterecke.

Der Leib besteht aus 10 Gliedern.¹⁾

Der vordere Teil des Kopfes ist mit langen, dichten, feinen Terrassenlinien verziert, zwischen die feine, nur durch die Lupe sichtbare Pünktchen eingestochen sind.

Maasse des Kopfes: Länge 21 mm. Breite des Mittelschildes 23 mm. Glabellabreite: hinten 15 mm, zwischen den Augen 11 mm.

Die Stammform des *Ill. angustifrons* gehört der Lyckholmer Schicht Estlands an. Die Heimat unseres in Ostpreussen gefundenen Exemplars (Taf. III. Fig. 12) ist also Estland.

1) u. 2) cf. Holm in Fr. Schmidt: Rev. III. Illaeniden pag. 131.

Illaenus Roemerii Volb. Taf. III. Fig. 16.

1861. *Illaenus grandis* Römer: Sadew. Dil. Geschiebe. pag. 69. Taf. VIII. Fig. 4.
 1864. *Illaenus Roemerii* Volborth: Neue estl. Illaenen. pag. 7. Taf. II. Fig. 12—15.
 1874. *Illaenus crassicauda* var. Steinhardt: Preuss. Trilobiten, pag. 43 (z. T.)
 Taf. III. Fig. 14.
 1883. *Illaenus vivax* Holm: Svenska Arterna pag. 74. Taf. VI. Fig. 1—7.
 1886. *Illaenus Römeri* Holm. in Fr. Schmidt. Rev. III. Illaeniden. pag. 125.
 Taf. IX. Fig. 4—14.

Das von Steinhardt — Taf. III. Fig. 14a, b, c. — als *Illaenus crassicauda* var. abgebildete Schwanzschild muss ich seiner äusseren Gestalt und der Form seines Umschlages wegen zu *Ill. Roemerii* zählen.

Das Schwanzschild ist beinahe halbkreisförmig, gleichmässig, nicht zu stark gewölbt. Die breite Spindel ist fast bis zur Spitze deutlich durch die flachen stark convergierenden Rückenfurchen begrenzt. Die Spindelbreite beträgt am Vorderrande über $\frac{1}{3}$ der ganzen Schildbreite. Die Gelenkfläche ist sanft nach unten gebogen, ihr Hinterrand weniger als doppelt so gross wie der Abstand vom Knie bis zur Spindel. Die Furche hinter dem Knie ist breit. Besonders charakteristisch für *Ill. Roemerii* ist der schmale, stark rinnenförmige Umschlag, der nach hinten an Breite nicht zunimmt.

Maasse: Länge 31 mm, Breite 43 mm, vordere Spindelbreite 18 mm.

Ill. Roemerii ist nahe verwandt mit dem *Ill. jevensis* Holm. von dem er sich namentlich durch eine breitere Glabella, grösseren Abstand der Augen vom Hinterrande und durch den nach hinten nicht verbreiterten Umschlag des Schwanzschildes unterscheidet.

Ill. Roemerii kommt in der Lyckholmer Zone Estlands und im Leptaenakalk Schwedens vor. Das mir vorliegende Schwanzschild befindet sich in einem harten, feinkörnigen graue Kalke aus Ostpreussen.

Illaenus comes. n. sp. Taf. III. Fig. 19.

Zusammen mit *Illaenus jevensis* wurden in einem Geschiebe bei Spittelpark (Königsberg) mehrere kleine Kopfmittelschilder und Schwanzschilder gefunden, die dem *Ill. jevensis* sehr nahe verwandt scheinen.

Das Kopfschild ist in allen Richtungen gleichmässig und kräftig gewölbt. Die Augen stehen näher am Hinterrande als bei *Ill. jevensis*, und die Gesichtsnähte hinter denselben sind stärker nach aussen gerichtet als bei dieser Art. Die Glabella trägt einen schwachen aber deutlichen Kiel.

Das Schwanzschild, wenig kleiner als der Kopf, stimmt in seiner Form und im Verhältnis seiner Maasse vollkommen mit dem von *Illaenus jevensis* überein, doch scheinen mir die Andeutungen der Rippen auf den Seitenteilen (bis je 3 an der Zahl) bei *Illaenus comes* kräftiger zu sein.

Maasse des Kopfes: Länge 9,5 mm. Breite des Mittelschildes: ca. 11 mm. Breite der Glabella am Hinterrande: 6 mm.

Da *Ill. comes* mit *Ill. jevensis* zusammen gefunden worden ist, gehört er der Jeweschen Schicht an; seine Heimat müsste in Estland oder in benachbarten Gebieten zu suchen sein.

***Illaeus Vanhoeffeni* n. sp.** Taf. III. Fig. 17. 17a.

Mehrere kleine Kopfmittelschilder aus der Sammlung des Herrn Dr. Vanhoeffen (Wehlau) zeigten eine von allen anderen Illaeniden abweichende Ausbildung, durch die ich zur Aufstellung einer neuen Art veranlasst wurde. — Der Kopf ist ziemlich langgestreckt, in seinem hinteren Teile flach, vorn stark gewölbt, und zwar so, dass der Vorderrand des Kopfmittelschildes unten ziemlich weit nach hinten zurückgeschlagen ist. Die Glabella bildet mit den festen Wangen einen gleichmässigen flachen Bogen; sie verschmälert sich nach vorne ziemlich stark. Die scharfen rinnenförmigen Rückenfurchen convergieren etwa bis zum Vorderende des Augendeckels und biegen dann plötzlich noch eine ganz kurze Strecke nach aussen um. Die Augendeckel bilden lange flache Bogen, sie ragen wenig vom Mittelschild vor und liegen ziemlich nahe am Hinterrande; ihr Abstand von den Rückenfurchen ist etwa $= \frac{3}{4}$ der Glabellabreite. Die Gesichtsnaht hinter dem Auge ist schwach nach aussen gerichtet.

Maasse: Länge (Projektion) 10 mm, Breite des Mittelschildes vorn 9,5 mm, zwischen den Augen 11,5 mm, Glabellabreite hinten 7 mm, an der schmalsten Stelle 4,5 mm.

Die Stücke — es lagen mir nur Mittelschilder des Kopfes vor — sind in einem dichten, feinkörnigen, graulichen Kalkstein gefunden, der dem der Jeweschen Schicht sehr ähnelt. Fundort: Wehlau, Ostpreussen.

Der stark nach unten gebogene vordere Teil des Kopfschildes, sowie die zuerst so stark convergierenden Rückenfurchen lassen auf eine Verwandtschaft des *Ill. Vanhoeffeni* mit *Ill. angustifrons* schliessen.

***Illaeus bisulcatus* n. sp.** Taf. III. Fig. 18.

Mehrere Kopfmittelschilder zeigten eine gleiche Ausbildung, die sie deutlich von den anderen Illaeniden schied: Der Kopf ist in der Längsrichtung stark gewölbt; sein vorderer Teil ist fast gerade nach unten gebogen, so dass der Kopf von oben gesehen sehr kurz erscheint. Der Vorderrand bildet einen flachen Bogen; er ist gerundet, ohne Falzlinie. Die Glabella und die festen Wangen bilden einen sehr flachen Bogen, da die Augendeckel fast die Glabellahöhe erreichen. Der vordere Teil der Glabella zeigt das der Art charakteristische Merkmal: zwei, durch einen flachen Wulst getrennte, flache Längsfurchen, die mich bestimmten, die Art *Ill. bisulcatus* zu nennen. Hinter den ziemlich grossen Augendeckeln fallen die festen Wangen stark ab; die Gesichtsnahten sind hier weit nach aussen gerichtet, so dass die festen Wangen in lange feine Spitzen auslaufen.

Maasse des Kopfes: Länge (Projection) 14 mm, (nach der Krümmung) 22 mm. Glabellabreite: hinten 13 mm, vorn 11 mm, Augendeckellänge 6 mm. Abstand des Auges vom Hinterrande 1,5 mm, von der Rückenfurche 7 mm (also mehr als die halbe Glabellabreite).

Fundorte: Wehlau, Königsberg, Westpreussen.

Das Gestein ähnelt dem Echinospaeritenkalk Estlands.

Illaenus sp. cf. Dalmanni Volb. (Holm). Taf. II. Fig. 36. 36a.

1874. *Illaenus crassicauda* form. typ. s. *Dalmanni* Steinhardt: Preuss. Trilobiten. pag. 42. Taf. III. Fig. 12 a b c.

(1886. *Illaenus Dalmanni* Volb. in Holm: *Illaeniden* [Fr. Schmidt Rev. III.] pag. 93.)

Die vorliegende von Steinhardt als *Illaenus crassicauda* form. typ. s. *Dalmanni* beschriebene Art steht dem *Illaenus Dalmanni* Volb in Bezug auf die starke Wölbung des Kopfschildes in der Längsrichtung und die Form der freien Wangen [vergl. die Furche am Grunde der Sehfläche! —] sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihm durch die viel kürzeren Rückenfurchen und den grösseren Abstand der Augen vom Hinterrande.

Der Leib ist zehngliedrig: die Spindel breit, nicht sehr hochgewölbt. Das Gestein ist ein dunkelgrauer harter Kalk aus Ostpreussen.

Steinhardt giebt zu seiner Art noch die Beschreibung und Abbildung zweier Schwanzschilder. Auf das von mir — Taf. III. Fig. 24 — abgebildete Schwanzschild passt Steinhardts Beschreibung sehr gut, weniger stimmen seine Abbildungen.¹⁾ Das Schwanzschild ist stark gewölbt, sein Aussenrand ist fast senkrecht heruntergebogen. Die Spindel ist kurz, durch tiefe Rückenfurchen begrenzt. Der Umschlag nimmt nach hinten stark an Breite zu, er ist rinnenförmig gehöhlt, mit einer deutlichen Mittelfurche versehen. Die Oberfläche des Schwanzschildes ist fein punktiert. Jedenfalls ist dieses Schwanzschild auch der vorliegenden Art zuzuzählen.

Es stammt ebenfalls aus Ostpreussen und liegt in einem ganz ähnlichen Gestein wie das auf Taf. III. Fig. 36 abgebildete Stück. Das Gestein ist von ähnlicher Beschaffenheit, wie einzelne dunklere Varietäten des typischen estländischen Echinophaeritenkalkes.

Illaenus Masckei Holm.

1885. *Illaenus Masckei* Holm in Fr. Schmidt. Rev. III. *Illaeniden* p. 139. Taf. XII. Fig. 1—5.

Holm beschreibt am angef. Orte eine neue *Illaenus*-art, von der ihm das einzige vollständige Stück aus der Mascke'schen Sammlung, die mir nicht zugänglich war, als ostpreussisches Geschiebe vorlag. Ich gebe hier einen kurzen Auszug der Holm'schen Beschreibung:

Der ganze Körper ist sehr flach, niedrig gewölbt.

Die Glabella des niedrigen Kopfes ist flach, lang. Die Rückenfurchen bilden zwischen den Augen je ein stumpfes nach innen gewendetes Knie.

Der Abstand des Auges von der Rückenfurche ist gleich der Glabellabreite.

Die Gesichtsnaht hinter dem Auge geht stark nach aussen. Die Hinterecken der freien Wangen sind spitz.

Der Leib ist 10gliederig. Die Pleurenenden sind sensenartig zugespitzt.

Das Schwanzschild ist sehr flach, halb elliptisch, von einem breiten Randsaum umgeben. Die Spindel ist flach, kurz. Der fast ganz ebene Umschlag nimmt nach hinten stark an Breite zu.

Ill. Masckei gehört der Lyckholmer Schicht Estlands an.

Taf. III. Fig. 1 und 3 bei Holm sind die von Mascke bei Königsberg gefundenen Geschiebeexemplare.

1) cf. Steinhardt l. c. Taf. V. Fig. 11. 12.

Illaeus Linnarssoni Holm. Taf. III. Fig. 13. (Taf. III. Fig. 23?).

1860. Illaeus Rudolphi Eichwald: Lethaea rossica. I. 2. pag. 1482. Taf. LIII. Fig. 6a—c.

1883. Illaeus Linnarssoni Holm: Svenska Arterna: pag. 103. Taf. IV. Fig. 13—27.
Taf. V. Fig. 1—8.

1884. Illaeus Linnarssoni Kiesow: Sil.- und Devon-Gesch. Westpr. pag. 83.

1886. Illaeus Linnarssoni Holm in Fr. Schmidt: Rev. III. Illaeniden pag. 146. Taf. X.
Fig. 14—23.

Mit Sicherheit kann ich nur den Steinkern eines Schwanzschildes aus hartem, grauem, kieseligem Kalke dieser Art zuzählen. Sein Umriss bildet den breiteren Teil einer stumpf-eiförmigen Figur. Der Aussenteil des Schwanzschildes ist stark nach unten gebogen. Die breite Spindel ist nur am Vorderrande deutlich begrenzt, da die Rückenfurken in ihrem weiteren Verlaufe ganz schwach sind. Der gerade Teil des Vorderrandes ist kurz, kaum $\frac{1}{3}$ der Spindelbreite und wenig über $\frac{1}{3}$ des Hinterrandes der Gelenkfläche. Der Umschlag ist schmal, in der Mittellinie zu einer kurzen Spitze ausgezogen, im übrigen schwach rinnenförmig gehöhlt, mit wenigen Terrassenlinien. Die ganze Oberfläche ist dicht mit eingestochenen Punkten verziert.

Maasse des Schwanzschildes: Länge 20 mm. Breite 30 mm. Spindelbreite 11,5 mm. Länge des geraden Vorderrandes 3,5 mm, des Hinterrandes der Gelenkfläche 9 mm.

Fundort: Ostpreussen (Umgegend von Königsberg) aus Lyckholmer Kalk. Westpreussen: aus Backsteinkalk (nach Kiesow).

Anstehend ist Ill. Linnarssoni aus Schweden, wie aus Estland bekannt. Das abgebildete Schwanzschild gehört der typischen Form, die nur in der Lyckholmer Schicht vorkommt, an; die ältere Form aus der Jeweschen Schicht hat einen nach hinten zu verbreiterten Umschlag mit 2—3 stumpfen Zähnen.¹⁾ Das auf Taf. III. Fig. 23 abgebildete Kopfschildbruchstück gehört möglicherweise Ill. Linnarssoni an. Die schwach convergierenden Rückenfurken und die nach unten ziemlich kräftig gebogenen Wangen sprechen dafür. Leider fehlen die Augendeckel und der Verlauf der Gesichtsnaht, die nach Holm²⁾ hinter dem Auge knieförmig gebogen sein soll. Auf der Glabella ist ein schwacher Längskiel zu bemerken, die Oberfläche ist mit eingestochenen Punkten bedeckt. — Fundort: Wehlau in Ostpreussen, in einem dichten roten Kalkstein von der Beschaffenheit des Wesenberger Kalkes.

Illaeus Linnarssoni Holm hat 9 Leibesringe.³⁾

Illaeus nuculus n. sp. Taf. VI. Fig. 34.

1874. Illaeus crassicauda var. Steinhardt: Preuss. Trilobiten pag. 43. Taf. IV. Fig. 3.

In einem bräunlichen, grobkörnigen, mit vielen Quarzkörnchen durchsetzten Gestein fand sich das Taf. VI. Fig. 34 abgebildete Schwanzschild. Es ist gleichmässig, kräftig gewölbt, von halbovalem Umriss. Die Spindel ist besonders hoch gewölbt, nach hinten nicht verschmälert; sie geht allmählich in die Wölbung des

1) cf. Holm: Illaeniden pag. 150. Taf. X. Fig. 10d u. 13.

2) Holm. Illaeniden pag. 149.

3) Holm. Illaeniden pag. 150.

Schwanzschildes über. Die Rückenfurchen sind nur vorne deutlich und tief ausgebildet. Die Gelenkfläche ist lang aber ganz schmal, ihr Hinterrand bedeutend grösser als der Abstand vom Knie zur Spindel. Hinter der Spindel liegt ein schmaler scharfer Kiel. Der Umschlag scheint nach dem Durchschimmern durch die Schale ausserordentlich breit zu sein. Die Oberfläche ist nur mit eingestochenen, sehr dicht gestellten Punkten bedeckt.

Maasse: Länge 9 mm. Breite 15 mm. Spindelbreite 4,5 mm.

Fundort: Ostpreussen — ohne nähere Angabe des Ortes.

Illaenus nculus scheint nahe verwandt mit *Illaenus Bowmani* Salter¹⁾ zu sein, von dem das Schwanzschild sich nur durch stärkere Wölbung und den feinen Kiel unterscheidet. Gehört *Illaenus nculus* hierher, so haben wir in ihm vielleicht eine neungliederige Form vor uns. Die Steinhardtsche Bestimmung als *Illaenus crassicauda* ist irrig, da einmal bei *Ill. crassicauda* die Schwanzspindel sehr stark nach hinten verschmälert ist, und dann ist der Aussenteil des Schwanzschildes bei *Illaenus crassicauda* stark nach unten gebrochen, nicht so gleichmässig abfallend, wie bei der vorliegenden Form. Die typische Form des *Illaenus crassicauda* Wahlberg fehlt in unseren Geschieben.

B. Augenlose.

Illaenus caecus Holm. Taf. III. Fig. 21. 21a.

1886. *Illaenus caecus* Holm in Fr. Schmidt: Rev. III. *Illaeniden* pag. 162. Taf. XI. Fig. 11a—d.

Der Kopf ist kurz kuglig aufgeblasen. Die Glabella ist kurz, nimmt etwa ein Drittel der Kopfbreite ein. Die nach vorn wenig convergierenden Rückenfurchen sind nicht tief. Die festen Wangen fallen von den Rückenfurchen in starker Wölbung ab. Die Gesichtsnähte bilden, von der Mitte des Hinterrandes ausgehend, knieförmig nach aussen gerichtete Bogen bis zur Mitte des Seitenrandes. Der Vorderrand des Kopfes, der nach Holm²⁾ eine Falzlinie tragen soll, ist nicht erhalten; ebenso fehlt der Leib und das Schwanzschild. Die Schale ist, so weit sie erhalten, mit sehr feinen Terrassenlinien bedeckt.

Fundort: Belschwitz in Westpreussen; in hellgrauem Kalk, aus der Lyckholmer Schicht. Heimat: Estland.

II. Untergattung *Bumastus* Murchison.

Illaenus (Bumastus) barriensis Murchison. Taf. III. Fig. 26. 27.

1843. *Illaenus* (Bum.) *Barriensis*. Burmeister. Org. d. Trilob. pag. 120.

1867. *Bumastus Barriensis* Murchison. Siluria pag. 116.

1885. *Illaenus bariensis* Lindström. Förteckning. pag. 82.

1886. *Illaenus barriensis* Holm. in Fr. Schmidt Rev. III *Illaeniden* pag. 164. Taf. XI. Fig. 12—16.

Der Kopf ist in der Querrichtung stärker gewölbt, als in der Längsrichtung. Der Vorderrand bildet einen kräftigen Bogen ohne Falzlinie. Die stark gegen ein-

1) cf. Salter: A. Monograph. pag. 185. Taf. XXVIII. Fig. 6—13. Taf. XXX. Fig. 6.

2) cf. Holm in Fr. Schmidt. Rev. III. *Illaeniden* pag. 162.

ander gewölbten Rückenfurchen schnüren die festen Wangen fast vollständig vom Mittelschilde ab. Die Augendeckplatten sind gross, flach, nahe am Hinterrande stehend.

Das Schwanzschild ist nur wenig breiter als lang und ganz gleichmässig gewölbt, ohne Randsaum.

Die Oberfläche ist mit sehr feinen Terrassenlinien verziert.

Illaenus (Bum.) *barriensis* kommt sowohl in Estland (Oesel und Moon)¹⁾ als auf Gotland vor. Die auf Taf. III. Fig. 26, 27 abgebildeten Stücke stammen aus hellem Korallenkalk, der dem der Insel Gotland (Lindströms Zone f) entspricht. Ein anderes Stück lag in einem mergeligen Kalke, vom Alter der unteren Oeselschen Schicht J aus Estland.

Fundorte: Ostpreussen: Königsberg, Wehlau; Westpreussen: Rosenberg.

***Illaenus* (*Bumastus*), *sulcatus* Lindström. Taf. III. Fig. 28. 28a, b. 29.**

1874. *Bumastus* sp. c. Steinhardt. pag. 84. Taf. IV. Fig. 8a, b.

1883. *Illaenus insignis* Holm: Svenska arterna pag. 127.

1885. *Illaenus sulcatus* Lindström: Förteckning pag. 84. Taf. XII. Fig. 12.

Der Umriss des Kopfes ist parabolisch, der Vorderrand gerundet, ohne Falzlinie. Die stark nach innen gebogenen Rückenfurchen gehen weit nach vorne und endigen in kleinen rundlichen Grübchen. Zwischen den Augen werden die Rückenfurchen etwas tiefer und bilden auf dem Steinkern kleine linsenförmige Eindrücke. Die Augen stehen weiter vom Hinterrande ab als bei *Illaenus barriensis*, doch bei dem mir vorliegenden Stücke nicht so weit als auf der von Lindström²⁾ gegebenen Abbildung. Die Gesichtsnaht hinter dem Auge geht in schwachem Bogen nach aussen. Das Bruchstück einer freien Wange (Taf. III. 28b) zeigt die zugeschärfte Hinterecke und eine kräftige Furche am Grunde des Auges.

Mit dem Bruchstücke eines vollständig übereinstimmenden Kopfschildes wurden bei Wehlau mehrere Schwanzschilder in einem Geschiebe gefunden, die ich dieser Art zuzähle: sie sind länglich schildförmig, nicht sehr stark gewölbt, von einem flachen Randsaume umgeben. Soweit die Schale erhalten ist, lässt sie feine Terrassenlinien erkennen, die quer über das ganze Schild gehen. Die Gelenkfläche ist ziemlich gross, ihr Hinterrand wulstig aufgeworfen. In dem hinteren Teile trägt das Schwanzschild die Andeutung eines Kieles. Der Umschlag ist schmal, nach hinten nicht verbreitert, schwach gehöhlt und mit wenigen Terrassenlinien verziert.

Fundorte: Wehlau, Ostpreussen. Belschwitz, Westpreussen.

Ill. (Bum.) *sulcatus* ist nur aus den obersten Gotländer Schichten (f—h Lindströms³⁾) bekannt.

Die vorliegende Art steht dem *Bumastus insignis* Hall⁴⁾ sehr nahe, ist aber von ihm durch das Fehlen der Falzlinie am Vorderrande des Kopfes verschieden.

1) cf. Holm in Fr. Schmidt Rev. III. *Illaeniden* pag. 169.

2) cf. Lindström: Förteckning pag. 84. Holzschnitt.

3) cf. Lindström: Ueber die Schichtenfolge des Silur auf d. Ins. Gotland. Neues Jahrb. 1888 pag. 160. 161 und Lindström: Förteckning pag. 85.

4) cf. Salter: A Monograph, pag. 207. Taf. XXVII. Fig. 6, 7.

Illaenus (Bumastus) Holmi Lindström. Taf. III. Fig. 30.

1874. Bumastus sp. b. Steinhardt: Trilobiten pag. 54. Taf. VI. Fig. 3a b.

1885. Bumastus Holmi. Lindström: Förteckning pag. 83. Taf. XVI. Fig. 16—20.

Mehrere Schwanzschilder aus den Sammlungen des Mineralienkabinetts und des hiesigen Provinzial-Museums gehören dieser Art an.

Das Schwanzschild ist stark gewölbt, von einem schwachen Randsaum umgeben. Am mittleren, der Spindel entsprechenden, Teil des Vorderrandes verläuft eine schmale Rinne, die nach den Seiten hin in den Randsaum übergeht. Die Gelenkfläche ist ziemlich gross, mit gerundeter Ecke und wulstigem Hinterrande. Auf dem Steinkern tritt ein sehr schwacher Längskiel auf, in dessen Verlängerung sich auf dem Randsaum eine kurze schwache Einsenkung befindet. Die Schale ist glatt, nur in der Umgebung des Hinterrandes der Gelenkfläche finden sich feine Terrassenlinien, sonst ist die ganze Schale und auch der Steinkern mit ziemlich groben eingestochenen Punkten bedeckt.

Fundorte: Belschwitz in Westpreussen und Ostpreussen ohne nähere Ortsangabe.

Heimat: Gotland

Das Gestein ist zum Teil ein grobkrySTALLINER Kalk, dem Gotländischen Korallenkalk ähnelnd, zum Teil ein feinkörniger gelber Kalk.

Anhang:

1. Taf. III. Fig. 25: Eine sehr hohe freie Wange aus Jeveschem Gestein, welche sich besonders durch den stark gebuchteten Aussenrand auszeichnet. Die Oberfläche ist mit eingestochenen Punkten bedeckt. Fundort: Wehlau, Ostpreussen.

2. Taf. III. Fig. 20: Eine Glabella von Wehlau zeigt gewisse Anklänge an *Ill. sulcifrons* Holm; doch sind die Augenhöcker nicht über die Glabella vorgewölbt wie bei dieser Art, sondern liegen ein klein wenig tiefer. Echinospaeritenkalk.

3. Taf. III. Fig. 22: In Vaginatenkalk fand ich mehrfach kleine Schwanzschilder von der Form des auf Taf. III. Fig. 22 abgebildeten: sie sind etwa doppelt so breit als lang, flachgewölbt, mit kurzer Spindel und schwachem Kiel. Die Schale ist mit wenigen feinen, querverlaufenden Terrassenlinien verziert.

4. Taf. II. Fig. 38ab. Die angeführte Glabella erinnert etwas an das von Holm¹⁾ Taf. II. Fig. 6 abgebildete Exemplar von *Illaenus Esmarki* Schloth., doch lassen die breitere Glabella und die geringere Biegung des gefalzten Vorderrandes bei *Ill. Esmarkii* es zweifelhaft erscheinen, ob das vorliegende Stück der Art zuzählen ist.

XII. Fam. Asaphidae.

Gattung: **Asaphus Brongniart** (z. T.). Angelin.

1. Untergattung: **Ptychopyge Angelin.**

Asaphus (Ptychopyge) rimulosus Angelin. Taf. IV. Fig. 13.

1854 (78). *Ptychopyge rimulosa* Angelin: Pal. Scand. pag. 55. Taf. XXX. Fig. 2.

1884. *Asaphus brachyrachis* Remelé in Törnquist: Undersökn. om Siljansområdets Trilobit fauna — pag. 67. Taf. III. Fig. 1.

1) cf. Holm: Svenska arterna af Trilobitsl. *Illaenus*. pag. 58.

Mehrere Schwanzschilder lagen mir vor: Sie sind etwas über einen Halbkreis ausgezogen, flachgewölbt, von einem sehr breiten flachen Randsaum umgeben. Die Spindel ist ziemlich kurz, bis zum Ende deutlich begrenzt; sie endigt in bedeutender Entfernung vor dem flachen Randsaume. 12—13 Spindelglieder sind durch erhabene in der Mitte etwas nach vorn vorgebogene Leisten angedeutet. Auf den Seitenteilen treten 8—9 nicht sehr deutliche Rippen auf, welche ungefähr bis zum Randsaum zu verfolgen sind. Die Gelenkfläche ist sehr breit. Die Schale zeigt unregelmässige, quer über das Schwanzschild verlaufende leistenförmige Linien. Bei dem abgebildeten Exemplar treten auf der Schale unregelmässig verstreute runde flache Höcker auf, die von einer schmalen Rinne umsäumt sind. Ähnliche Höcker fand ich auch bei einzelnen Stücken auf dem breiten mit Terrassenlinien verzierten Umschlage.

Maasse: Länge 60 mm, Breite 72 mm, Spindellänge 41 mm, Spindelbreite 18 mm.

Fundorte: Ost- und Westpreussen.

A. rimulosus ist nur aus dem oberen grauen Orthocerenkalk Schwedens anstehend bekannt.

Das von Törnquist l. c. als *A. brachyrachis* Remelé beschriebene und abgebildete Schwanzschild gehört wohl ohne Zweifel zu *A. rimulosus*.

***Asaphus (Ptychopyge) multicostatus* Angelin.**

1854 (78). *Ptychopyge multicostata* Angelin: Pal. Scand. pag. 55. Taf. XXX. Fig. 4.

In einem hellgrauen harten Kalk mit grossen Schwefelkieskrystallen liegt ein Abdruck des Schwanzschildes dieser Art. Die Spindel ist bis zu ihrer Mitte von zuerst stärker convergierenden, gegen das Ende hin fast parallel verlaufenden Rückenfurken begrenzt; sie endigt abgestumpft und trägt etwa 15—16 Glieder. Auf den Seitenteilen sind elf deutlich begrenzte Pleuren zu erkennen, deren letzte ziemlich stark nach hinten gerichtet sind. Um das ganze Schild läuft ein flacher Randsaum.

Fundort: Ostpreussen, ohne nähere Angabe des Ortes.

Angelin erwähnt *A. multicostatus* aus Dalekarlien und Schonen; die Gesteinsbeschaffenheit des vorliegenden Geschiebes lässt es fraglich erscheinen, ob diese Gebiete als die Heimat des betreffenden Stückes anzunehmen sind. In Estland ist die Art bisher nicht gefunden worden.

***Asaphus (Ptychopyge) sp.* Taf. V. Fig. 4.**

Den Formen des *Asaphus rimulosus* und *multicostatus* steht das auf Taf. V. Fig. 4 abgebildete Schwanzschild nahe. Die Spindel ist zehngliederig, die Seitenteile tragen 8 Pleuren. Spindelglieder wie Pleuren sind ebenso wie bei *A. multicostatus* deutlich abgesetzt.

Fundort: Umgegend von Königsberg, in hellgrauem, an Echinospaeritenkalk erinnerndem Kalkstein.

Asaphus (Ptychopyge) tecticaudatus Steinhardt. Taf. IV. Fig. 10. 11.

1874. *Asaphus tecticaudatus* Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 26. Taf. II. Fig. 9. 10.

1848. *Asaphus* sp. Burmeister: „Neue Beobachtungen über die Organisation d. Trilob. in d'Alton u. Burm.: Zeit f. Zool. etc. pag. 80. Taf. I. Fig. 19.

Die erste Nachricht über diese wohl begrenzte Art finden wir bei Burmeister, welcher a. a. O. eine sehr genaue Beschreibung und Abbildung eines Schwanzschildes aus einem Geschiebe von Stettin giebt. Nach Burmeister hat erst Steinhardt wieder die Art aus preussischen Geschieben erwähnt, und nannte sie *As. tecticaudatus* wegen des fast dachförmigen Abfalls der Seitenteile des Schwanzschildes. Beiden, Burmeister wie Steinhardt, waren nur Schwanzschilder bekannt. Zum ersten Male kann ich jetzt das Kopfschild eines allerdings sehr schlecht erhaltenen vollständigen Exemplares beschreiben.

Der Umriss ist etwa halbkreisförmig. Die Hinterecken nicht, wie bei den bekannten skandinavischen Arten der Untergattung *Ptychopyge*, in Hörner ausgezogen, sondern kurz zugespitzt. Um das ganze Kopfschild läuft ein breiter flacher Randsaum, der auf den Wangen schwach gehöhlt ist. Die Gesichtsnähte stossen im Vorderrande in einem spitzen Winkel zusammen und umkreisen die flach gewölbte Glabella in ziemlich grosser Entfernung. Zwischen den Augen ist die Glabella sehr stark eingeschnürt und trägt hinter dieser ihrer schmalsten Stelle ein kleines spitziges Höckerchen; in ihrem vorderen Teile zeigt sie eine schwache kielartige Erhöhung. Die grösste Glabellabreite übertrifft den Abstand der Augen von einander um wenige mm. Die Nackenfurche und die etwa bis zur Mitte der Wangen gehenden Hinterrandfurchen sind nur flach abgebildet.

Das Schwanzschild liegt mir in sehr vielen Bruchstücken vor. Es ist von parabolischem Umriss, wenig länger als breit, am Hinterrande schwach eingebuchtet. Die Spindel ist lang, flach gewölbt, bis zur Spitze ziemlich deutlich gegliedert. Die Grenzfurchen der 18—20 Spindelglieder setzen sich auf den Seitenteilen noch eine Strecke fort. Auf den Spindelringen verlaufen unregelmässige Querwülstchen, auf den vorderen je zwei, auf den hinteren je eines, welche die Rückenfurchen nicht erreichen. Die Seitenteile fallen von der Spindel in ungefähr dachförmiger Wölbung ab; sie sind von einer flachen Randfurchen umgeben. Der Umschlag des Schwanzschildes zeigt die für die Untergattung *Ptychopyge* eigentümliche Breite, und ist mit dicht gestellten parallelen Terrassenlinien verziert.

Schalenverzierungen: Auf dem Kopfschild treten nur in der Nähe der Hinterecken neben feinen eingestochenen Punkten ganz feine kurze Terrassenlinien auf. Auf dem Schwanzschild laufen vom Rande aus lange nach hinten und innen gewendete Terrassenlinien aus, welche sich allmählich mit den aus der Nähe der Rückenfurchen entspringenden feineren erhabenen leistenförmigen Linien vereinigen.

As. tecticaudatus ist nicht selten in Geschieben vom Alter des Echinospaeritenkalkes in Ost- und Westpreussen. Anstehend ist die Art in Estland bei Reval gefunden worden.

Asaphus (Ptychopyge) undulatus Steinhardt. Taf. IV. Fig. 12.

1874. *Asaphus undulatus* Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 26. Taf. II. Fig. 12

1884. *Asaphus* cfr. *undulatus* Törnquist: Undersökn. öfver Siljansområdets Trilobit-fauna pag. 69. Taf. II. Fig. 22.

Wie Steinhardt, so liegen auch mir nur Schwanzschilder dieser Art vor. Sie unterscheiden sich von denen des *As. tecticaudatus* einmal durch das Fehlen der Randfurche auf den Seitenteilen, und durch sehr undeutliche Gliederung der Spindel, wie der Seitenteile, und dann durch die Schalenverzierung. Die Spindel ist mit sehr feinen wellenförmigen Leisten verziert, welche auf die Seitenteile übergehen und hier von der Spindel aus schräge nach oben und aussen verlaufen. Vom Aussenrande gehen etwas gröbere und längere leistenförmige Linien zu denen des mittleren Schildteiles hin. Der Hinterrand des Schwanzschildes ist wie bei der vorigen Art gebuchtet.

Fundorte: Ost- und Westpreussen.

As. undulatus ist in unseren Geschieben seltener als *As. tecticaudatus*. Das Gestein, in dem *As. undulatus* bisher gefunden ist, erinnert sehr an den oberen grauen Orthocerenkalk Schwedens, so dass dieses, oder Nachbargebiete des Ostseebeckens, die Heimat unserer Geschiebe wäre. Törnquist erwähnt seinen *As. cfr. undulatus*, der dem unsrigen fast vollkommen gleicht aus „Flagkalk“ einer dicht über dem oberen grauen Orthocerenkalk liegenden Schicht.

Asaphus (Ptychopyge) cfr. aciculatus Angelin [Kiesow muscpt]. Taf. V. Fig. 5.

[1854 (78). *Ptychopyge aciculata* Angelin: Pal. Scand. pag. 56. Taf. XXII. Fig. 4. 4 a.]

Ein Schwanzschild aus der Sammlung des Herrn Dr. Kiesow zeigt grosse Aehnlichkeit mit der *Ptychopyge aciculata* Aug. Die Seitenteile lassen, soweit sie erhalten sind, die Teilung der Pleuren in ein breiteres vorderes und ein schmales hinteres Band deutlich erkennen. Die Spindel ist ziemlich stark verjüngt und zählt ungefähr 16 Glieder. Ueber die ganze Spindel laufen zwei convergierende flach rinnenförmige Eindrücke hin. Die Trennungsfurchen der einzelnen Spindelglieder sind nach aussen nicht so stark vertieft und erweitert, wie es die Figur Angelin für *Pt. aciculata* zeigt. Die Oberfläche ist mit feinen dichtgestellten Wellenlinien verziert.

Fundort: Spengaswken in Westpreussen.

As. cfr. aciculatus ist jedenfalls auf ein Schweden benachbartes Gebiet zurückzuführen. Aus dem estländischen Silur ist keine entsprechende Art bekannt.

2. Untergattung: Asaphus Brongniart s. str.**Asaphus oculus n. sp. Taf. IV. Fig. 1. 2. 3. 4.**

1860. *Asaphus Weissi* Eichwald: Lethaea rossica pag. 1452 (z. T.)

1874. *Asaphus expansus* Steinhardt: Pr. Trilobiten pag. 22. Taf. II. Fig. 1. 2. 5. 6. 7. 8.

1884. *Asaphus Weissi* Kiesow: Sil. u. Devon. Gesch. pag. 82.

Asaphus expansus Fr. Schmidt: msrpt.

1882. *Asaphus expansus* var. *incerta* Brögger: Sil. Et. 2 u. 3. pag. 92.

In sehr zahlreichen Bruchstücken lag mir diese Art aus dem typischen oberen Linsengestein [Echinosphaeritenkalk C_{1a}] vor. Steinhardt hat sie als *As. expansus*

beschrieben. Ausser der vorzüglichen Beschreibung Bröggers¹⁾ standen mir noch mehrere Exemplare des echten *As. expansus* zu Gebote, so dass ich sehr bald zu der Ueberzeugung gelangte, dass die Bestimmung Steinhardts falsch ist. Brögger selbst nennt die Steinhardtsche Art *As. expansus* var. *incerta*. Unter den zahlreichen Stücken dieser Art aus der Sammlung des hiesigen Provinzial-Museums befinden sich einige, die mit der Bestimmung „*As. expansus* Fr. Schmidt“ versehen sind, von ihnen gilt dasselbe, wie von Steinhardts Bestimmung. Herr Dr. Kiesow endlich bezeichnete einige Stücke, die ich ihm vorlegte, als seinem, aus westpreussischen Geschieben stammenden *As. Weissi* identisch.

Asaphus Weissi Eichwald umfasst aber, wie bereits Nieszkowski²⁾ nachgewiesen, mehrere Arten, den in unseren Geschieben häufigen *As. oculus*,³⁾ den mit sehr hohen, dünnen Augenstielen versehenen *As. Kowalewski* Lawrow⁴⁾ und den *As. cornutus* Pand.⁵⁾ Eichwald glaubt in der verschiedenen Ausbildung der Augenhöcker Geschlechtsunterschiede sehen zu dürfen, indem die Exemplare mit langen dünnen Stielen (= *As. Kowalewski*) Weibchen, und die mit kürzeren, dickeren Augenhöckern (= *As. cornutus* und *As. oculus*) Männchen sein sollen. Es sind nun aber diese Unterschiede nicht als die der beiden Geschlechter, sondern als vollgiltige Artunterschiede aufzufassen. Wie erwiesen, sind unter dem Eichwaldschen Namen *As. Weissi* mehrere wohl unterschiedene Arten zusammengefasst, es ist daher unumgänglich notwendig, diesen Namen aufzugeben. Den von Brögger gewählten Namen *As. expansus* var. *incerta* möchte ich, obwohl recht bedeutende Aehnlichkeiten mit dem echten *As. expansus* vorhanden sind, um der eigentümlich ausgebildeten Augenhöcker willen mit dem Namen *As. oculus* vertauschen, da in *As. oculus* keine Varietät des *As. expansus*, sondern eine selbständige Art vorliegt. Zur besseren Unterscheidung von *As. expansus* stelle ich die Diagnose dieser und unserer Art neben einander:

As. expansus Linné.⁶⁾

Das Kopfschild ist in der Längsaxe ziemlich kräftig gewölbt, sein Umriss ist ein gleichmässiger, nicht zu stark gewölbter Bogen. Die Hinterecken sind gerundet.

Die Augenhöcker ragen kaum über die Glabella hervor; die Sehfläche ist nicht deutlich abgesetzt.

As. oculosus n. sp.

Das Kopfschild ist in der Längsaxe sehr stark gewölbt, von parabolischem Umriss. Die Hinterecken sind scharf, oder ganz kurz gerundet, erheblich weiter ausgezogen als bei *As. expansus*.

Die Augenhöcker erheben sich weit über die Glabella, sie sind sehr kräftig ausgebildet. Die Sehfläche ist nach unten durch eine Zone eingestochener Punkte begrenzt, unterhalb welcher der Augenhöcker etwas eingeschnürt ist.

1) cf. W. C. Brögger: Sil. Et. 2 u. 3. — pag. 85. *As. expansus*.

2) cf. Nieszkowski: Zus. zur Monogr.-Archiv f. d. Naturk. Liv-, Est- und Kurlands. Ser. I. Band II. pag. 352.

3) cf. die Abbildung von Eichwald: Taf. LIV. Fig. 7 a b c.

4) cf. Verhandl. d. Mineral. Ges. zu St. Petersburg. 1856. Tf. V. Fig. 1.

5) cf. Pander: Beitr. z. Geognosie d. russ. Reiches pag. 137. Taf. VII. Fig. 5.

6) Nach einem russischen Exemplar des hiesigen Mineralogischen Instituts.

Die Gesichtsnaht überschreitet den Hinterrandsaum der Axe ungefähr parallel gerichtet, den Vorderrand erreichen die beiden Aeste in einem sehr stumpfen, fast flachen Winkel.

Die Glabella ist doppelt eingeschnürt, einmal kurz vor den Augen, und dann durch sehr tiefe Gruben zwischen den Augen. Zum Vorderrande fällt sie in kräftiger Wölbung ab; sie ist ungekielt.

Die Gesichtsnaht überschreitet den Hinterrandsaum in stark nach aussen divergierender Richtung; der Verlauf vor den Augen wie bei *As. expansus*; sie ist auf den Augenhöckern sehr stark eingedrückt.

Die Einschnürung der Glabella wie bei *As. expansus*, nur sind die Gruben zwischen den Augen flacher. Nach vorn fällt die Glabella ganz steil ab; in ihrem vorderen Teile zeigt sie, namentlich auf Steinkernen, einen breiten flachen Kiel.

Die sehr hohen Augenhöcker, die mehr zugespitzten Hinterecken und die stärkere Wölbung der Glabella unterscheiden unsere Art so gut von *As. expansus*, dass ich glaube, in *As. oculus* eine eigene Art und nicht nur eine Varietät des *As. expansus* sehen zu müssen.¹⁾

Die Form der 8 Leibesringe unterscheidet sich kaum von denen des *As. expansus*.

Das Schwanzschild ist ungefähr eineinhalb mal so lang als breit. Die Spindel ist bis zur Spitze deutlich begrenzt und lässt, namentlich auf Steinkernen 9—12 Glieder erkennen, die nach der Mitte zu undeutlicher werden. Die Gliederung der Seitenteile ist sehr undeutlich.

Die sehr dicke Schale ist überall mit gröberen, rissigen, kurzen Terrassenlinien bedeckt, die namentlich auf den Augenhöckern sehr dicht stehen, auf der Glabella laufen sie dem Umriss derselben parallel. Auf dem Schwanzschilde treten ausser einzelnen (4—5) von der Spindel schräg nach aussen und hinten gehenden längeren Linien kürzere dichter gestellte in der Nähe des Randes auf, welche in umgekehrter Richtung wie die ersten verlaufen.

As. oculus ist häufig in Ost- und Westpreussen.

Das Gestein, graugrünlcher rotfleckiger Kalk mit grossen Thoneisensteinlinsen deutet auf Estland als Heimat hin.

Asaphus sp. Taf. IV. Fig. 7.

Ein bei Rosehnen, Ostpreussen, gefundenes Kopfschild zeigt in Bezug auf die Ausbildung seiner Augen nahe Beziehungen zu *As. oculus*. Die Augenhöcker sind bedeutend über die Glabella emporgezogen, jedoch nicht so hoch, wie bei der vorigen Art. Die Sehfläche ist am Grunde von einer Zone eingestochener Punkte begrenzt. Der Vorderrand des Kopfschildes ist in eine kurze stumpfe Spitze ausgezogen, in welche die Gesichtsnaht einmünden. Die Hinterecken sind stärker nach hinten gezogen, wie bei *As. oculus*, aber nicht scharf, sondern kurz gerundet. Die Glabella stürzt nach vorne steil ab; zwischen ihr und dem Vorderrande zieht sich ein schmaler, schräg gestellter Saum hin. Zwischen den Augen geht quer über die Glabella eine flache Vertiefung, in die zwei dicht neben einander stehende Gruben

1) Der echte *Asaphus expansus* Linné fehlt jedenfalls ganz in unseren Geschieben, wie er auch in Estland, der Heimat des grössten Teiles unserer Geschiebe, fehlt.

eingesenkt sind. Der Höcker zwischen den Augen ist niedrig und spitz, viel weniger deutlich wie bei *As. oculosus*. Die Schale der Glabella ist mit sehr feinen Terrassenlinien bedeckt, auf den Wangen sind nur dicht gestellte Pünktchen eingedrückt.

Fundort: Strand bei Rosehnen.

Das Gestein erinnert an Echinospaeritenkalk.

***Asaphus jevensis* Fr. Schmidt mnsct. Taf. IV. Fig. 5. 6.**

Mehrere Glabellen und Bruchstücke von Schwanzschildern aus der Sammlung des hiesigen Provinzial-Museums zeigten die Aufschriften „*Asaphus jevensis* Fr. Schmidt;“ von diesen Stücken gebe ich die Abbildung einer Glabella und eines Schwanzschildes (Abdruck), ohne auf die genaue Begrenzung der Art eingehen zu können, da Herr Akademiker Schmidt auf eine diesbezügliche Anfrage mitteilte, dass er selbst zur Zeit die Art *As. jevensis* noch nicht genügend charakterisieren könne.

Die Glabella ist birnförmig, kräftig gewölbt, zum Vorderrande ziemlich steil abfallend. Sie trägt in ihrem vorderen Teile einen deutlichen, aber nicht scharfen Längskiel und gegenüber der Vorderseite der Augenhöcker zwei Paar kurze Querschwülsten (auf den Steinkernen.) Die Rückenfurchen sind von den Augen ab tief, an der breitesten Stelle der Glabella mit einer rundlichen Einsenkung.

Die Schwanzschilder sind ungefähr halbkreisförmig, kräftig gewölbt. Die Spindel lässt auf den Steinkernen etwa 9 Ringel, auf den Seitenteilen 6—7 undeutlich begrenzte Pleuren erkennen. Die Gelenkfläche ist sehr breit, steil nach unten gebrochen. Die Furche von der Spindel bis zum Knie ist sehr tief.

Fundorte: Mehrfach in Ostpreussen in Geschieben vom Alter der Jeweschen Schicht gefunden; als Heimat ist Estland zu bezeichnen.

***Asaphus Branconis* n. sp. Taf. V. Fig. 3a.b.**

In einem grossen Geschiebe, welches durch *Strophomena tenuistriata* Murch. als der Jeweschen Schicht gleichalterig bestimmt wurde, fand ich den auf Taf. V Fig. 3 abgebildeten Asaphiden. Der ganze Körper ist länglich eiförmig. Der Kopf ist etwa $1\frac{3}{4}$ mal so breit als lang, von parabolischem Umriss. Die Hinterecken fehlen, sie scheinen scharf gewesen zu sein. Der Vorderrand ist an den Seiten der Glabella ganz wenig eingebuchtet. Die Gesichtsnähte münden in sehr flachem Winkel in den Vorderrand. Die Glabella ist kräftig gewölbt, nach vorn steil abstürzend, schwach gekielt. Die Augen sind niedrig, ihre Sehfläche steigt direkt von den Wangen an und ist nach unten nur durch eine feine eingedrückte Linie begrenzt.

Die Rumpfspindel nimmt etwas mehr als $\frac{1}{3}$ der ganzen Breite ein. Der innere Teil der Rumpfpleuren ist sehr schmal.

Das Schwanzschild ist halbkreisförmig, mässig gewölbt. Die Spindel nimmt ungefähr $\frac{1}{4}$ der Breite und $\frac{3}{4}$ der Länge des Schwanzschildes ein. Eine Gliederung ist nur auf der Spindel durch 9, quer über dieselbe verlaufende leistenförmige Linien angedeutet. Die Seitenteile sind vollkommen ungegliedert.

Die Schale des ganzen Körpers ist mit feinen Terrassenlinien verziert.

Maasse: Kopf: Länge 7 mm, Breite 12 mm. Rumpf: Länge 8,5 mm, Breite 11 mm. Spindelbreite 4,5 mm. Schwanz: Länge 6 mm, Breite 10 mm, Spindelbreite 2,5 mm.

Fundort: Craussen bei Königsberg.

Durch das Zusammenvorkommen mit *Strophomena tenuistriata* wird Estland als die Heimat des *As. Branconis* bestimmt.

***Asaphus Steinhardti* n. sp. Taf. V. Fig. 1a. b. c.**

1874. *Asaphus raniceps* Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 22. Taf. I. Fig. 11.

Das vorliegende Stück hat Steinhardt als *As. raniceps* Dalm. beschrieben und abgebildet; diese Bestimmung ist irrig, denn bei *As. raniceps* Dalm. fehlt der breite Saum vor der Glabella, welcher die vorliegende Form auszeichnet. Ebenso ist das von Steinhardt l. c. gegebene Synonym *As. raniceps* Nieszk.¹⁾, welche Art nach einer Mitteilung Schmidt's gleich *Ptychopyge globifrons* Eichwald ist,²⁾ unrichtig. Von dieser Eichwaldschen Art unterscheidet sich die vorliegende durch die nach vorn gleichmässig verbreiterte kolbenförmige Glabella.³⁾

Da ich die vorliegende Form mit keiner der bekannten Asaphidenarten vereinigen kann, nenne ich sie nach ihrem ersten Bearbeiter als neue Art *As. Steinhardti*.

Der Kopf ist fast halbkreisförmig, von einem flachen Saum umgeben. Die Hinterecken fehlen, sie waren wahrscheinlich spitz. Die Gesichtsnaht verläuft in einiger Entfernung von der Glabella: sie mündet in spitzem Winkel in den Vorderrand. Die Augen ragen wenig über die flache kolbenförmige Glabella hervor.

Die Spindel des achthgliedrigen Rumpfes nimmt ein Drittel der Breite ein, sie verschmälert sich allmählich nach hinten.

Das Schwanzschild ist breit parabolisch, mit aufgewölbtem Hinterrande. Die Spindel ist schmal, konisch, und trägt etwa elf undeutliche Glieder. Die Seitenteile sind mässig gewölbt, von einer flachen Randfurche umgeben; in der Nähe der Spindel zeigen sie Andeutungen von 4—5 Rippen.

Die Schale ist glatt, nur auf dem Schwanzschilde treten wellenförmige, von aussen schräg nach hinten und innen verlaufende Terrassenlinien auf.

Fundort: Ostpreussen, ohne nähere Angabe.

Das Gestein ähnelt estländischem Echinospaeritenkalk.

***Asaphus cf. raniceps* Dalman.⁴⁾ Taf. VI. Fig. 10 a. b. 11.**

[1828. *As. expansus*. var. β . *raniceps* Dalman: Palaeaden. pag. 83. Taf. III. Fig. 4.]

In den auf Taf. VI Fig. 10 a. b und 11 abgebildeten Stücken liegt eine dem echten *As. raniceps* sehr nahe stehende Form vor.

1) cf. Nieszkowski: Monographie. pag. 36.

2) cf. Eichwald: Lethaea rossica pag. 1471. Taf. LIII. Fig. 2.

3) Für *Ptychopyge globifrons* giebt Eichwald l. c. an: „le lobe frontal bombé est ronde;“ die Eichwaldsche Figur zeigt auch den Vorderteil der Glabella in Form einer Kugelcalotte ausgebildet.

4) Der echte *As. raniceps* Dalm. fehlt in unseren Geschieben wahrscheinlich ebenso wie *As. expansus*.

Das Kopfschild ist kräftig gewölbt, vorn etwas vorgezogen, von einem schmalen schräge stehenden Randsaum umgeben. Die Glabella ist nach vorn sehr stark verbreitert; zwischen den Augen zeigt sie, wie *As. expansus* und *As. raniceps*, die doppelte Einschnürung. Die Gesichtsnähte münden in spitzem Winkel in den Vorderrand.

Das Schwanzschild ist ungefähr halbkreisförmig, (bei *As. raniceps* mehr parabolisch). Die Spindel trägt 7—8 Glieder; die Seitenteile sind vollkommen ungegliedert.

Häufig in Geschieben vom Alter des Echinospaeritenkalkes in Ost- und Westpreussen gefunden.

Taf. VI. Fig. 7 zeigt das Hypostom einer zur Gruppe des *As. raniceps* gehörenden *Asaphus*art. Der Hinterrand ist in der für die Hypostome der Untergattung *Asaphus* s. str. eigentümlichen Weise in zwei lange zugespitzt endigende Lappen ausgezogen. Der Mittelkörper ist kräftig gewölbt; an seinem Hinderrande liegen zwei kleine flache Höckerchen, die als die Reste des Hinterlappens aufzufassen sind. Eine genauere Bestimmung, welcher Art das vorliegende Hypostom zuzuzählen ist, ist kaum möglich.

***Asaphus ornatus* n. sp. Taf. VI. Fig. 3. 4. 5. 6.**

Einzelne Bruchstücke dieser Art aus der Sammlung des Mineralienkabinetts hat Steinhardt als *As. raniceps* bestimmt, jedoch wohl mit Unrecht, da sich die Form ihrer Glabella noch weiter von der des echten *As. raniceps* entfernt als die des vorherbesprochenen *As. cf. raniceps*. Vollständige Exemplare lagen mir nicht vor, sondern nur Glabellen mit Leibesringen und Leibesringe mit Schwanzschildern, doch so, dass ich die Zugehörigkeit der auf Taf. VI unter Fig. 3, 4, 5 und 6 abgebildeten Stücke ausser Zweifel stellen konnte.

Die Gesichtsnähte bilden vor der Glabella einen spitzen Winkel. Die Glabella selbst ist mässig gewölbt, gekielt und lässt auf den Steinkernen zwei Paar querliegende, feine Wülste erkennen, die an *As. acuminatus* Boeck¹⁾ erinnern, bei welcher Art sie jedoch weiter nach vorne liegen, als bei den vorliegenden Stücken. Die Rückenfurchen sind neben der breitesten Stelle der Glabella plötzlich stark vertieft; sie bilden hier eine grössere grubenförmige Einsenkung.

Besonders ausgezeichnet ist die Art dadurch, dass auf der breiten Rumpfspindel zwei parallele Reihen von Höckern — je zwei auf jedem Spindelgliede — verlaufen, welche, wie ich bei einem Stücke von Pr. Holland bemerkte, ganz nahe zusammenrücken können. Das Schwanzschild ist parabolisch, flachgewölbt. Auf der Spindel sind zehn Glieder mehr oder weniger deutlich zu erkennen; der Rücken der Spindel ist etwas kräftiger aufgewölbt.

Die Pleuren der Seitenteile, 7—8 an der Zahl sind durch eine feine Längsrippe zweigeteilt.

Die Schale ist mit feinen wellenförmigen Terrassenlinien verziert.

Fundorte: *As. ornatus* ist häufig in Ost- und Westpreussen gefunden.

1) cfr. W. C. Brögger l. c. pag. 93. Taf. VIII. Fig. 5.

Asaphus sp. Taf. V. Fig. 2.

Das auf Taf. V. Fig. 2 abgebildete Schwanzschild erinnert sehr an *As. ornatus*, indem die Pleuren der Seitenteile ebenfalls durch eine Längsrippe zweigeteilt sind; seine Form stimmt jedoch wenig mit dieser Art überein: es ist von beinahe halbkreisförmigem Umriss, während das von *As. ornatus* ausgesprochen parabolisch ist.

Fundort: Königsberg.

Asaphus obtusus n. sp. Taf. IV. Fig. 8. 9.

In dem pag. 9. erwähnten neuen Geschiebe lagen neben *Holometopus? radia-*
tus m. mehrere Glabellen und Schwanzschilder einer neuen *Asaphus*-art. Die Glabella ist nach vorn sehr stark erweitert, schwach gekielt; zum Vorderrande stürzt sie steil ab. Zwischen den Augen wird sie durch eine quer verlaufende Vertiefung vollständig von dem kleinen Nackenhöcker abgeschnürt und fast gerade abgestutzt, ein Merkmal, welches keiner anderen *Asaphiden*-art eigen ist. Die Gesichtsnähte stossen vorn in einem stumpfen Winkel zusammen.

Das Schwanzschild ist etwa halbkreisförmig, hinten schwach abgestutzt. Die Spindel ist stark gewulstet, neungliederig. Die in gleichmässiger Wölbung abfallenden Seitenteile sind nur ganz in der Nähe der Spindel undeutlich gerippt.

Maasse: Glabella-Länge 10 mm, Breite 8 mm.

„ „ 16 „ „ 13 „

Schwanzschildlänge 10 mm, Breite 17 mm, Spindelbreite 5 mm.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg.

Heimat: Balticum.

Asaphus sp. Taf. VI. Fig. 12.

Ein Schwanzschild (Steinkern) von Kamiontken in Westpreussen zeigt die auf Taf. VI. Fig. 12 wiedergegebene Form: es ist breit parabolisch, von einem undeutlichen Randsaum umgeben; die Spindel lässt neun undeutliche Glieder erkennen, die Seitenteile sind vollkommen glatt. Das Schwanzschild zeigt in Bezug auf die undeutlich gegliederte Spindel und die vollkommen glatten Seitenteile Aehnlichkeit mit dem von *As. latisegmentatus* Nieszk¹⁾. Das Gestein ist Echinospaeritenkalk.

Asaphus sp. Taf. VI. Fig. 13.

Das kleine Schwanzschild zeigt eine von dem der anderen *Asaphiden* abweichende Form: Es ist fast doppelt so breit als lang, hinten abgestutzt. Die bis nahe an den Hinterrand gehende Spindel ist undeutlich siebengliederig. Auf den Seitenteilen sind je fünf Pleuren durch feine leistenförmige Linien angedeutet.

Fundort: Königsberg.

Das Gestein ist Echinospaeritenkalk.

1) Nieszkowski giebt für *As. latisegmentatus* (Monographie pag. 40) an, dass die Spindel nur auf dem Steinkern gegliedert ist, während die Seitenteile auch hier vollkommen glatt bleiben. Einen Randsaum erwähnt Nieszkowski nicht.

Asaphus devexus Eichwald. Taf. VI. Fig. 9.

1860. *Asaphus devexus* Eichwald: *Lethaea rossica* pag. 1458. Taf. LIII. Fig. 10.

Ein Schwanzschild aus dunkelgrauem Echinospaeritenkalk stimmte gut mit der Eichwald'schen Art überein: Es ist fast halbkreisförmig, kräftig gewölbt. Die breite Spindel ist durch tiefe Rückenfurchen deutlich begrenzt; sie trägt ungefähr sieben Glieder. Die Seitenteile sind vollkommen glatt. Der Umschlag ist mit sehr groben Terrassenlinien verziert.

Fundort: Ostpreussen (Pr. Holland).

As. devexus ist bisher nur aus Estland anstehend bekannt.

Asaphus cf. platyurus Angelin. Taf. VI. Fig. 8.

[1854 (78) *Asaphus platyurus* Angelin: *Pal. Scand.* pag. 54. Taf. XXX. Fig. 1.]

Das auf Taf. VI. Fig. 8¹⁾ wiedergegebene grosse Schwanzschild erinnert durch die vielgliederige Spindel, deren einzelne Ringe in der Mitte etwas vorgebogen sind, an *As. platyurus* Angelin, von dem es sich nur durch die schwache Andeutung von Pleuren auf den Seitenteilen unterscheidet.

Fundorte: Königsberg, Marienwerder.

Das Gestein ähnelt dem grauen Orthocerenkalk Schwedens.

3. Untergattung: **Isotelus Dekay.****Asaphus (Isotelus) platyrhachis Steinhardt.** Taf. V. Fig. 7.

1874. *Asaphus platyrhachis* Steinhardt: *Pr. Trilob.* pag. 24. Taf. I. Fig. 10.

Die Beschreibung des Kopfschildes dieser Art kann ich nach einem von Dr. Nötling bei Neuenhof in Estland gesammelten Stücke geben. Es ist halbelliptisch, flach gewölbt, von einem flachen Saume umgeben. Die Hinterecken sind weggebrochen, sie waren jedenfalls in kurze Hörner ausgezogen. Die Gesichtsnähte entspringen am Hinterrande, näher an den Augen als an der Ecke, in den Vorder- und Seitenrand münden sie in stumpfem Winkel. Die Augen sind klein und niedrig. Die Glabella ist nur hinter den Augen durch schwache Rückenfurchen begrenzt, vor den Augen tritt sie in keiner Weise aus der Wölbung des Kopfschildes hervor²⁾.

Der Rumpf besteht aus acht flachgewölbten Gliedern, deren Spindel viel breiter ist, als die Pleuren. Am Hinterrande eines jeden Leibesringes sieht man in der Rückenfurche bei dem Taf. V. Fig. 7 abgebildeten Steinkern deutlich eine etwa stecknadelkopfgrosse Vertiefung, welche den innern Abdruck der zuerst von Burmeister³⁾ beobachteten Gelenkknöpfe repräsentiert. Die Pleuren endigen schwach gerundet; ihr innerer Teil ist kaum halb so breit als der äussere.

Das Schwanzschild ist parabolisch, gleichmässig sanft gewölbt. Die sehr breite Spindel ist seitlich kaum begrenzt, da die Rückenfurchen auf dem Schwanzschilde

1) Der Umschlag ist nach einem anderen vollkommen gleichgebildeten Stücke gezeichnet.

2) cf. Salter's Diagnose für die Untergattung *Isotelus* in Salter: „A Monograph“ pag. 147.

3) cf. Burmeister: „Ueber die Organisation der Trilobiten“, pag. 29.

fast ganz verschwinden. Das Hinterende der Spindel tritt als scharf markierter Buckel hervor. Auf dem Steinkerne erscheint die Spindel undeutlich gegliedert; ausserdem lässt die Spindel auf Steinkernen noch zwei nach hinten convergierende ganz flache Längsfurchen erkennen. Auf den Seitenteilen sind nur bei schalenlosen Exemplaren ganz flache Rippen zu erkennen, welche undeutlich gefurcht erscheinen. Um das ganze Schwanzschild läuft ein schwach gehöhlter Randsaum.

Fundorte: Heiligenbeil, Wehlau, Königsberg in Ostpreussen, Belschwitz in Westpreussen.

As. platyrhachis kommt in Geschieben vom Alter der Lyckholmer Schicht vor. Seine Heimat ist Estland.

II. Gattung: *Megalaspis* Angelin.

Megalaspis limbata Boeck. form. typica Brögger. Taf. IV. Fig. 14. Taf. VI. Fig. 1.

1837. *Trilobites limbatus* Boeck in Keilhau: Gaea norwegica pag. 142.

1852. *Megalaspis limbata* Angelin: Pal. Scand. pag. 18. Taf. XVI. Fig. 3.

1874. *Asaphus* (*Basilicus*) sp. sim. *A. tyranno*. Steinhardt: Pr. Trilobiten. pag. 25 (z. T.). Taf. II. Fig. 11.

1872. *Megalaspis limbata* Boeck forma typica Brögger: Sil. Etage 2 u. 3. pag. 77. Taf. IX. Fig. 1—5. Taf. XII. Fig. 10.

Das Bruchstück eines Kopfschildes und eine ganze Reihe von Schwanzschildern lagen mir vor.

Das Kopfschild ist nach Brögger parabolisch, mit zugespitzten Hinterecken. Die Gesichtsnähte verlaufen vor der Glabella im Bogen zum Vorderrande, in welchen sie in ziemlich spitzem Winkel einmünden. Die Glabella ist kurz, zwischen den Augen wenig eingeschnürt. Die Augenhöcker ragen nicht unbedeutend über die Glabella hervor. Das Schwanzschild ist etwas über einen Halbkreis ausgezogen. Die von schwach gegeneinander gebogenen Rückenfurchen begrenzte Glabella endet bei den vorliegenden Stücken ziemlich undeutlich; sie trägt 12—14 Glieder. Die Seitenteile zeigen etwa sieben Rippen, die schwach gefurcht sind. Das ganze Schild ist von einem Randsaum umgeben, der hinter der Spindel mässig gehöhlt ist. Die von Angelin und Brögger erwähnte innere Grenzfurche des Randsaumes habe ich bei unseren Geschiebeexemplaren nicht beobachten können; der Saum ist eben nur durch das Aufhören der Seitenrippen gekennzeichnet.

Fundorte: Mehrfach in Ost- und Westpreussen in Geschieben von rotem Orthocerenkalk gefunden, der Oeland oder das Festland Schweden als Heimat der betr. Stücke bezeichnet.

Megalaspis limbata Boeck var. *elongata*. m. Taf. IV. Fig. 15.

Mehrere Schwanzschilder zeigten bei gleicher Gliederung der Spindel und Seitenteile eine etwas längliche Form als *Meg. limbata* forma typica und einen hinter der Spindel kräftiger gehöhlten Randsaum. Ich halte die Form für eine Varietät der *Meg. limbata* und nenne sie um ihrer Gestalt willen var. *elongata*.

Fundorte: Mehrfach in Ost- und Westpreussen in dunkelgraugrünem Kalk mit vereinzelt Glaukonitkörnchen gefunden. Die Heimat der betr. Geschiebe kann sowohl Schweden als Estland sein.

Megalaspis planilimbata Angelin. Taf. VI. Fig. 2.

1852. *Megalaspis planilimbata* Angelin Pal. Scand. pag. 18. Taf. XVI. Fig. 2.

1874. As. (*Basilicus*) sp. Asim. A. tyranno Steinhardt Pr. Trilobiten: pag. 25.

Eine ganze Anzahl von Bruchstücken und einige ganze Schwanzschilder der Art langen mir vor.

Das Schwanzschild ist ungefähr parabolisch, ziemlich kräftig gewölbt. Die Spindel zeigt ungefähr 14 Glieder. Die Seitenteile tragen 7, durch tiefe Furchen getrennte mehr oder weniger deutlich zweigeteilte Pleuren. Der um das ganze Schild laufende ziemlich breite Saum ist deutlich durch das Aufhören der Seitenrippen begrenzt, er ist meistens ringsum gehöhlt.

Von *Meg. limbata* unterscheidet sich diese Form durch stärkere Wölbung, durch die deutlicheren Rippen auf den Seitenteilen und durch geringere Breite.

Meg. planilimbata ist häufig in Geschieben von typischem Glaukonitkalk gefunden worden; seine Heimat ist Estland.

Megalaspis gigas Angelin. Taf. V. Fig. 6.

1852. *Megalaspis gigas*. Angelin: Pal. Scand. pag. 16. Taf. XII. Fig. 3.

Ein Schwanzschild dieser Art lag mir vor. Der Umriss ist ein vorn abgeschnittenes Oval. Das ganze, ziemlich kräftig gewölbte Schild ist von einem breiten ebenen Randsaum umgeben. Die stark über die Seitenteile gewölbte Spindel endigt undeutlich; sie lässt bis 25 Ringel erkennen. Die Seitenteile tragen etwa 20 durch tiefe Rinnen von einander getrennte, welche schwach gefurcht sind und bis zu dem oben erwähnten Randsaume gehen.

Maasse: Länge 10 cm, Breite 9,5 cm. Spindelbreite 2,2 cm.

Meg. gigas ist nur einmal im Westpreussen in einem grossen Geschiebe dunkelbraunroten Orthocerenkalkes gefunden worden. Seine Heimat ist Oeland oder das Festland Schweden.

III. Gattung: **Niobe. Angelin.**

Von *Niobe* lag mir nur ein kleines unbestimmbares Bruchstück eines Schwanzschildes vor (Taf. VI. Fig. 14.). Es zeigt die für *Niobe* eigentümliche Ausbildung der Pleuren, welche dachziegelartig aneinander gereiht sind.

Fundort: Königsberg.

IV. Gattung: **Nileus. Dalman.**

Nileus Armadillo Dalman. Taf. III. Fig. 32.

1828. *Nileus Armadillo* Dalman: Palaeaden pag. 49. Taf. IV. Fig. 3a—c.

1852. *Nileus Armadillo* Angelin: Pal. Scand. pag. 19. Taf. XVI. Fig. 5a—c.

1860. *Nileus Armadillo* Eichwald: Lethaea rossica pag. 1490.

1882. *Nileus Armadillo* Brögger: Sil. Et. 2 & 3. pag. 64.

Die typische Form dieser Art lag mir nur in einem Schwanzschilde vor, welches ich auf Taf. III. Fig. 32 wiedergebe. Es ist etwa doppelt so breit als lang, in der Mitte hoch gewölbt, mit abgerundeten Ecken. Die Spindel ist nicht markiert, da die Rückenfurken fehlen; angedeutet wird sie nur am Vorderrande durch die schmalen, nach unten gebogenen Gelenkflächen. Um das Schwanzschild läuft ein ziemlich breiter Saum, der von dem gewölbten mittleren Teile durch eine ziemlich tiefe und breite Furche abgeschnürt ist.¹⁾

Maasse: Länge 18 mm, Breite 42 mm.

Fundort: Pr. Holland in Ostpreussen, in grauem körnigem Kalk, der an den schwedischen Orthocerenkalk erinnert. *N. Armadillo* ist aus Estland bisher nicht mit Sicherheit bekannt, die Heimat unseres Stückes ist also jedenfalls Schweden.

***Nileus* sp. Taf. III. Fig. 33.**

Das auf Taf. III. Fig. 33 abgebildete Schwanzschild lag in einem Geschiebe grauen Orthocerenkalkes zusammen mit *Illaenus chiron* Holm. Es ist etwa nur $1\frac{1}{2}$ mal so breit als lang und ringsum mit einem weniger stark abgesetzten Randsaum umgeben als *N. Armadillo*.

Fundort: Königsberg.

***Nileus?* sp. Taf. III. Fig. 31.**

1874. *Nileus armadillo* Steinhardt: Pr. Trilob. pag. 52. Taf. IV. Fig. 9.

Steinhardt beschreibt das auf Taf. III. Fig. 31 abgebildete Schwanzschild als *N. armadillo* Dalm. Diese Bestimmung kann ich ebensowenig für richtig halten, als die der Volborth'schen Stücke, welche eine undeutlich durchscheinende Schwanzspindel haben sollen.²⁾ Steinhardt giebt a. a. O. an, dass das Schwanzschild keine Spur einer Spindel zeigt; bei genauer Betrachtung bemerkt man jedoch deutlich zwei schwache convergierende Eindrücke, welche die Ausdehnung der breiten Spindel anzeigen; diese Eindrücke fehlen bei *N. armadillo* Dalm. stets. Ausserdem nennt Steinhardt den Hinterrand der Gelenkflächen nur verdickt, während er in Wirklichkeit eine scharfe, erhöhte Kante bildet, von welcher die Gelenkflächen steil abfallen, was bei *N. armadillo* nie der Fall ist. Diese Ausbildung der Gelenkflächen, sowie die hinter denselben auftretenden deutlichen Kniefurchen und das Fehlen des für *N. armadillo* so charakteristischen Randsaumes lassen es ausser Zweifel, dass die Steinhardtsche Bestimmung falsch ist.

Fraglich erscheint es, ob das vorliegende Schwanzschild überhaupt zur Gattung *Nileus* gehört. Da mir nur dieses eine Stück vorlag, konnte ich es auf die Ausbildung seines Umschlages hin nicht untersuchen. Die Form des Umschlages würde ja entscheiden, ob hier ein Vertreter der Familie der Asaphiden überhaupt, oder vielleicht eine mit *Illaenus* verwandte Form vorliegt, an welche Gattung das Schwanzschild lebhaft erinnert.

Das vorliegende Stück wurde in einem grauen, schwach rötlich gefleckten Kalkstein bei Rosenberg in Westpreussen gefunden.

1) Neuerdings mehrfach in rotem Orthocerenkalk gefunden.

2) cf. Volborth: „Ueb. d. m. glatt. Rumpfgliedern versehenen Russ. Trilobiten.“ Mins. de l'Ac. d. Sc. d. St. Petersb. 1863. pag. 37. Taf. IV. Fig. 69.

An die Familie der Asaphiden schliesse ich die Schwanzschilder dreier Formen an, die ich nach den vorhandenen Bestimmungen nur zur Gattung

Holometopus Angelin

stellen kann. Angelin selbst giebt keine genaue Charakteristik dieser Gattung und hat möglicherweise Formen in ihr zusammengefasst, die garnicht zusammen gehören, wie Hol.? elatifrons, von welcher Art Angelin allein das Kopfschild kennt, auf dem der Verlauf der Gesichtsnähte ganz und gar nicht der Angabe Angelins (Pal. Scand. pag. 58) entspricht.¹⁾ Für die vorliegenden Schwanzschilder wiederhole ich die Diagnose Angelins:²⁾

„Abdomen, latiusculum, semicirculare, immarginatum, integerrimum, rhachis distincta, angusta, conica, marginem scuti haud attingens.“ Zu den Asaphiden stelle ich die folgenden Arten, da der Umschlag (bei dem einen der Stücke freigelegt, bei anderen durch die Schale hindurchschimmernd) eine ähnliche Ausbildung zeigt, wie bei den Arten der Gattung Asaphus.

Holometopus? gracilis n. sp. Taf. V. Fig. 8. 8a.

Zwei Schwanzschilder zeigen einen halbkreisförmigen Umriss, sehr kräftige Wölbung des mittleren Schildteiles und einen verhältnismässig breiten, flachen Randsaum. Die Spindel ist nach hinten stark verschmälert, sie läuft in einen Kiel aus, der bis beinahe zum Rande des Schwanzschildes geht. Auf dem vorderen Teil der Spindel sind etwa drei deutlichere Ringe zu erkennen, auf welche eine Reihe ganz undeutlicher folgt. Die Seitenteile tragen je 6, ungefähr radial verlaufende, undeutliche Rippen. Der Umschlag, durch die Schale hindurchschimmernd, nimmt etwas mehr als die halbe Schildbreite ein.

Maasse: Länge 6 mm, Breite 10 mm, Spindelbreite 2 mm.

„ 10 „ „ 28 „ „ 3 „

Die Oberfläche, auch die der Spindel, ist mit sehr feinen, dichtgestellten Wellenlinien verziert.

Fundort: Bäckermühle bei Marienwerder, Westpreussen, in grauem körnigen Kalk, der an schwedischen Orthocerenkalk erinnert.

Holometopus? laevis n. sp. Taf. V. Fig. 9.

Von der Form der vorigen Art, zeigt die vorliegende auf der ebenfalls in einen Kiel auslaufenden Spindel drei deutliche Ringel, während die Seitenteile vollkommen glatt sind.

Maasse: Länge 8 mm, Breite 12 mm, Spindelbreite 3 mm.

Fundort: Nasser Garten bei Königsberg.

H.? laevis lag in dunkel braunrotem Kalk, der mit dem oberen roten Orthocerenkalk Schwedens vollkommen übereinstimmt. Schweden oder Nachbargebiete des Ostseebeckens sind daher die mutmassliche Heimat unserer Art.

1) cf. W. C. Brögger: Sil. Et. 2 u. 3. pag. 128. Taf. III. Fig. 13.

2) cf. Angelin l. c. pag. 58.

Von den nahestehenden Angelinschen Arten *Hol. aciculatus*¹⁾ und *Hol. limbatus*²⁾ sind die beiden eben angeführten Formen durch die kielartige Verlängerung der Spindel geschieden.

***Holometopus? radiatus* n. sp. Taf. IV. Fig. 16.**

Das Schwanzschild ist halbkreisförmig, von einem breiten Randsaum umgeben, die Spindel ist schmal, lang, bis zum Ende deutlich geringelt. Die Seitenteile tragen 6, durch ziemlich tiefe Furchen getrennte, radial verlaufende, gewölbte Pleuren.

Der bei dem abgebildeten Stücke blosgelegte Umschlag ist breit, etwa wie bei der Untergattung *As. s. str.*, gehöhlt, mit sehr dicht gestellten parallelen Terrassenlinien verziert.

Maasse: Länge 10 mm, Breite 18 mm. Spindelbreite 3,5 mm.

Fundort: Königsberg.

Hol.? radiatus zeigt in seiner äusseren Form Ähnlichkeit mit *Hol. ornatus* Ang.³⁾ doch das Fehlen der Höckerchen auf der Spindel und den Seitenteilen bei der vorliegenden Form trennt die beiden Arten.

XIII. Fam.: Remopleuridae.

Gattung: ***Remopleurides*** Barrande. Portlock.

***Remopleurides Jentzchi* n. sp. Taf. I. Fig. 31a. b.**

Aus der Forst Wilhelmswalde bei Skurz in Westpreussen lagen mir mehrere Glabellen vor, welche der des *Remopleurides radians*⁴⁾ ziemlich nahe stehen. Die Glabella ist breiter als lang, flach gewölbt, nach vorn in einen Stirnfortsatz ausgezogen, der erheblich breiter als bei *R. radians* ist. Drei Paar Seitenfurchen sind angedeutet, das erste Paar nur in Form dunklerer Punkte, die beiden hinteren Paare als deutliche Linien.

Der Vorderrand des Stirnfortsatzes ist schwach eingebuchtet, ähnlich wie bei *R. emarginatus* Törnquist, welche Art von unserer vorliegenden ebenso wie *R. radians* durch die Ausbildung der Seitenfurchen verschieden ist. Der Nackenring ist ziemlich breit, in der Mitte desselben liegt ein kleiner schwacher Höcker. Die Augendeckplatten zeigen, soweit sie erhalten sind, die für *Remopleurides* charakteristische Sichelform.

Maasse: Länge der Glabella 8 mm, Breite 9 mm, Breite des Stirnfortsatzes 4 mm, Länge desselben 2,5 mm.

Fundort: Forst Wilhelmswalde bei Skurz, Westpreussen.

R. Jentzchi liegt in einem Geschiebe hellgrauen Echinospaeritenkalkes. Heimat: Das Ostseebecken?

1) cf. Angelin l. c. pag. 58. Taf. XXX. Fig. 5.

2) cf. Angelin l. c. pag. 58. Taf. XXX. Fig. 7a.

3) cf. Angelin l. c. pag. 58. Taf. XXX. Fig. 6.

4) cf. Berraude: Syst. sil. Bd. I. pag. 359. Taf. XLIII. Fig. 33. 36.

XIV. Fam.: Olenidae.

Gattung: *Olenus*: Dalman.*Olenus truncatus* Brünnich. Taf. IV. Fig. 25. 26.1845. *Olenus truncatus* Brünn: in Angelin. Pal. Scand. pag. 48. Taf. XXV. Fig. 1.

Eine sehr grosse Anzahl von Bruchstücken dieser Art liegen mir vor, aus denen ich das Kopfschild Taf. IV. Fig. 25 reconstruiert habe.

Das Kopfschild ist etwas mehr als doppelt so breit als lang, mit fast geradem Vorderrande. Ringsum läuft ein schmaler Randsaum neben einer deutlichen Randfurche. Die Hinterecken sind in wenig divergierende Hörner ausgezogen.

Die Glabella nimmt etwa $\frac{2}{3}$ der Länge und wenig über $\frac{1}{4}$ der Breite des Kopfschildes ein. Sie ist nach vorn wenig verschmälert, abgerundet, von tiefen Rückenfurchen umgrenzt. Drei Paar Seitenfurchen treten auf, die von vorn nach hinten an Länge und Tiefe zunehmen. Sie bilden wenig geschwungene, schräg nach hinten und innen gerichtete Eindrücke. Die Nackenfurche ist tief und tritt deutlicher hervor als die dritten Seitenfurchen. Der Nackenring ist etwas höher gewölbt als die Glabella und trägt einen ganz schwachen Mittelhöcker.

Die festen Wangen sind etwa $\frac{3}{4}$ so breit als die Glabella; zu den kleinen halbmondförmigen Augen geht vom Stirnteile der Glabella ein feiner Augenwulst hin. Die Augendeckplatten sind von einer Furche begrenzt, welche sich auf die freien Wangen fortsetzt und den Augenrund umgrenzt.

Der Schildteil vor der Glabella ist schräge nach unten gebogen, gewölbt. Als schwache Verlängerung der Rückenfurchen setzt sich auf diesen Schildteil eine ganz flache, breite Vertiefung von beiden Seiten des Stirnteils der Glabella zum Vorderrande fort.

Die freien Wangen sind schwach gewölbt.

Die Oberfläche des Kopfschildes ist fast ganz glatt; nur auf den freien Wangen und auf dem breiten Saume vor der Glabella verlaufen sehr feine, radial resp. parallel angeordnete Runzeln. Leibesringe waren nach Angelin¹⁾ 13 vorhanden. Die Spindel ist deutlich abgesetzt, gewölbt, die Pleuren sind längsgefurcht; sie endigen spitz.

Das Schwanzschild ist dreieckig, doppelt so breit als lang. Die Spindel ist 5—6 gliederig; die Seitenteile tragen 4 breite gefurchte Pleuren. Um das ganze Schild läuft ein schmaler Saum.

Maasse: Kopfschild: Länge 6 mm, Breite 12,5 mm. Glabella: Länge 4 mm, Breite 3—3,5 mm. Schwanzschild: Länge 2,5 mm, Breite 5 mm. Spindelbreite 1,5 mm.

Fundort: Bäckermühle bei Marienwerder in Westpreussen.

Heimat: Durch das Gestein (schwarzer cambrischer Stinkkalk) wird Schweden als die Heimat bezeichnet.

1) Angelin. l. c. pag. 43.

Gattung: **Sphaerophthalmus. Angelin.****Sphaerophthalmus alatus Boeck.** Taf. IV. Fig. 27. 27a.

1838. *Trilobites alatus* Boeck in Keilhau: *Gaea norwegica*. pag. 143.

1854. *Sphaerophthalmus alatus* Angelin: Pal. Scand. pag. 49. Taf. XXVI. Fig. 9.

1880. *Sphaerophthalmus alatus* Boeck sp. in Linnarsson: Om Försteningarne i. d. Svenska Lagr. m. *Peltura* och *Sphaer.* pag. 97. Taf. I. Fig. 6—10.

Mir lagen nur Mittelschilder des Kopfes vor.

Die Glabella ist hoch gewölbt, cylindrisch, nach vorn wenig verschmälert; sie reicht bis dicht an den eingebuchteten Vorderrand. Nur die dritten Seitenfurchen sind deutlich ausgebildet; sie fliessen in einen, nach hinten schwach convexen Bogen zusammen. Die vorderen Seitenfurchen sind ganz undeutlich. Der Nackenring ist ebenso breit, wie die dritten Seitenlappen und trägt auf der Höhe seiner Wölbung einen kleinen spitzen Höcker; den langen Nackenstachel, wie ihn Linnarssen l. c. Taf. I. Fig. 8 abbildet, konnte ich bei meinen Stücken nicht constatieren. Die festen Wangen sind wenig schmaler als die Glabella und sehr stark gewölbt; in ihrem vorderen Teile ist ein feiner, fadenförmiger Augenwulst zu bemerken.

Die Augen sind nach Angelin kugelig ohne Augendeckel.

Die ungefähr halbkreisförmigen freien Wangen sind am Rande in einen nach hinten gebogenen, feinen Stachel ausgezogen.

Das Schwanzschild ist klein, keilförmig, mit sehr breiter 3 gliederiger Spindel. Maasse: Länge des Mittelschildes 2,5 mm, Breite 4 mm.

Fundort: Baeckermühle bei Marienwerder.

Sp. *alatus* gehört dem oberen Olenusschiefer Schwedens an. Cambrium.

Gattung: **Peltura. Milne-Edwards.****Peltura scarabaeoides Wahlenberg.** Taf. IV. Fig. 28.

1821. *Entomostracites scarabaeoides*. Wahlenberg: Petrif. Tell. Svec. pag. 41. Taf. I. Fig. 4.

1854. *Peltura scarabaeoides* Angelin: Pal. Scand. pag. 45. Taf. XXV. Fig. 8.

1880. *Peltura scarabaeoides* Wahlbg. sp. Linnarsson: Om Försten. i. d. Lagn. m. *Pelt. o. Sphaer.* pag. 4. Taf. I. Fig. 1—5.

Diese Art ist bis jetzt zweimal in unseren Geschieben gefunden worden, einmal bei Marienwerder in Westpreussen und bei Pr. Holland in Ostpreussen. Beide Geschiebe zeigen nur Mittelschilder des Kopfes.

Die Glabella ist mässig gewölbt, vorn abgestutzt, von ziemlich tiefen Rückenfurchen begrenzt. Drei Paar nach hinten gebogene Seitenfurchen treten auf; sie sind jedoch meistens nur undeutlich zu erkennen; in der Mitte der Glabella stossen sie nicht zusammen. Der Nackenring ist ziemlich breit, wenig gewölbt; durch schräg nach aussen und hinten verlaufende Aeste der Nackenfurche werden bei einigen Stücken deutlich kleine dreieckige Lappen vom Nackenringe abgeschnürt. Der schwache Mittelhöcker auf dem Nackenringe ist selten zu erkennen.

Der Saum vor der Glabella ist schmal. Die festen Wangen sind am Hinterende fünf mal so breit als vorne. Sie sind breit dreieckig, schwach gewölbt. Die

Augen sind weit nach vorne gerückt; die kleinen Augendeckel ragen wenig aus den Wangen hervor.

Der Leib besteht nach Linnarsson jedenfalls aus 12 Ringeln.

Das ungefähr halbkreisförmige Schwanzschild zeigt¹⁾ eine breite dreigliederige Spindel und je drei in Zähne auslaufende Pleuren.

Maasse: Kopfschildlänge 9 mm, Länge der Glabella 7 mm, Breite 7 mm, hintere Breite der festen Wangen 4 mm.

Fundorte: Marienwerder, Pr. Holland.

In dem Geschiebe von Marienwerder lagen neben Kopfschildern von *Pelt. scarabaeoides* noch solche von *Sphaerophthalmus alatus*; durch dieses Zusammenkommen wird das Alter des betreffenden Geschiebes als dem oberen Olenus-schiefer (Cambrium) Schwedens gleichzeitig bestimmt. Die Heimat ist wohl Schweden.

Es sind somit in der vorliegenden Arbeit 140 Trilobitenformen²⁾ aus den Ost- und Westpreussischen Diluvialgeschieben behandelt worden; von diesen boten 25 zu wenig Anhaltspunkte zur spezifischen Bestimmung. Von den übrigen 115 Formen waren 75 bereits aus den russischen und skandinavischen Heimatsgebieten, resp. aus den Geschieben des norddeutschen Flachlandes bekannt. 22 Formen zeigten so bestimmte Merkmale, dass ich neue Arten auf dieselben begründen konnte, 18 Formen bildeten Varietäten der bereits bekannten Arten.

Diese 115 bestimmbaren Formen verteilen sich auf die Provinzen Ost- und Westpreussen, auf die einzelnen Formationen und die Heimatsgebiete, wie aus den folgenden Tabellen hervorgeht.

1) Linnarsson. l. c. pag. 5.

2) Von *Phacops latifrons* wird abgesehen aus oben angegebenen Gründen.

Zur Erläuterung der folgenden Tabelle diene nachstehende vergleichende Uebersicht des estländischen und schwedischen Cambrium und Silur:

Estland:	Schweden:
I. Cambrium: ¹⁾	
Unterer Sandstein	—
(A ₁) Blauer Thon	—
Zone d. Olenellus Mickwitzi	Ephytonsandstein.
Fucoidensand	Fucoidensand.
—	Zone des Olenellus Kjerulfi.
—	Paradoxideszone.
—	Olenuszone.
(A ₂) Ungulitensand	—
(A ₃) Dictyonemaschiefer	Dictyonemaschiefer.
II. Untersilur:	
B ₁ Glaukonitsand	Glaukonitsand
B ₂ Glaukonitkalk	{ Glaukonitkalk.
	{ Unterer Graptolithenschiefer.
B ₃ Vaginatenskalk	{ Unterer roter Orthocerenkalk.
	{ Unterer grauer „
	{ Oberer roter „
	{ Oberer grauer „
C ₁ Echinospaeritenkalk	
C ₂ Kuckersche Schicht }	{ Mittlerer Graptolithenschiefer u. Chasmopskalk.
C ₃ Itfersche Schicht }	
D ₁ Jewesche Schicht }	
D ₂ Kegelsche Schicht }	Trinuclenschiefer.
D ₃ Hemicosmitenkalk }	
—	Brachiopodenschiefer.
—	Oberer Graptolithenschiefer.
E Wesenburger Schicht	—
F ₁ Lyckholmer Schicht }	
F ₂ Borkholmer Schicht }	Leptaenakalk.
III. Obersilur:	[Gotland.]
G ₁ Jördensche Schicht	{ a) Aeltester roter Mergelschiefer.
G ₂ Borealis-Bank	{ b) Stricklandianamergel.
G ₃ Baiküllsche Schicht	{ c) Jüng. Mergelsch. u. Sandst.
H Estonus-Schicht	{ d) Kalksteinsch. m. Mergelbänd.-Oolith.
I Untere Oeselsche Schicht	{ e) Pterygotusschicht.
K Obere Oeselsche Schicht }	{ f) Crinoiden- u. Corallenconglomerat.
	{ g) Megalomusbänke.
	{ h) Cephalopoden- u. Stromatoporenschicht.

1) cf. Fr. Schmidt: Ueber e. neuentd. Untercambr. Fauna in Estland. Mém. d. l'Ac. d. Sc. d. St. Petersb. 1888. pag. 12—13.

	Alter.			Vorkommen in		Heimat.		
	Cambrium.	Unter-Silur.	Ober-Silur.	Ost- Preussen.	West- Preussen.	Est- land.	Balti- cum.	Schwe- den.
<i>Agnostus pisiformis</i> Linné	Olenusschiefer	—	—	—	1)	—	—	+
„ „ var. <i>socialis</i> Tullb.	Olenusschiefer	—	—	—	—	—	—	+
<i>Harpes Spaski</i> Eichwald	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
<i>Ampyx foveolatus</i> Angel.	—	C	—	—	—	—	—	+
— <i>rostratus</i> Sars	—	C	—	—	—	—	[+] ²⁾	+
— <i>culminatus</i> Ang.	—	C	—	—	—	—	[+]	+
— <i>setirostris</i> Ang.	—	C	—	—	—	—	[+]	+
* ³⁾ <i>Phacops prussica</i> n. sp.	—	—	K?	—	—	—	+	—
— <i>Downingiae</i> Murch.	—	—	c. u. K.	—	—	+	—	+
— <i>imbricatula</i> Dalm.	—	—	c—h	—	—	—	—	+
— <i>caudata</i> Brunn	—	—	c	—	—	—	+	+
— <i>exilis</i> Eichw.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>laevigata</i> F. Schm.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>Kegelensis</i> F. Schm.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>praecurraeus</i> F. Schm.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>Odini</i> Eichw.	—	C	—	—	—	+	—	—
— cf. <i>marginata</i> F. Schm.	—	D ₁	—	—	—	+	+	—
— <i>bucculenta</i> Sjögr.	—	D ₁	—	—	—	+	—	+
— <i>Wesenbergensis</i> F. Schm.	—	E	—	—	—	+	—	—
— <i>macroura</i> Sjögren	—	Backstein-Kalk, Chasm.-Kalk	—	—	—	—	+	+
— <i>maxima</i> Fr. Schm.	—	D	—	—	—	+	—	—
— <i>Eichwaldi</i> Fr. Schm.	—	F ₁	—	—	—	+	—	—
— cf. <i>Eichwaldi</i> Fr. Schm.	—	U. S.	—	—	—	—	+	—
<i>Cheirurus exsul</i> Beyr.	—	C ₁	—	—	—	+	—	+
— — f. <i>gladiator</i> Eichw.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— — f. <i>macrophthalma</i> Kut.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>gotlandicus</i> Linnars.	—	—	d	—	—	—	—	+
* — <i>dubius</i> n. sp.	—	—	Ob.-Sil.	—	—	—	+	—
— <i>clavifrons</i> Dalm.	—	C ₁	—	—	—	+	—	+
— cf. <i>Plautini</i> F. Schm.	—	Backstein-Kalk	—	—	—	—	+	—
— <i>pseudohemicranium</i> Nieszk.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>variolaris</i> Linnarss.	—	C ₁	—	—	—	+	—	+
— <i>cephaloceras</i> Nieszk.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>speciosus</i> His.	—	—	b—h	—	—	—	—	+
* <i>Amphion priscus</i> n. sp.	—	B ₂	—	—	—	—	—	+
<i>Cybele revaliensis</i> F. Schmidt	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— cfr. <i>Grewingki</i> F. Schm.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—

1) Die Lage und Stärke der Striche giebt die Häufigkeit der Art an.

2) [+] bedeutet: Die betr. Art kommt wahrscheinlich auch in dem so bezeichneten Gebiete vor.

3) * bedeutet: Neue Art.

	Alter.			Vorkommen in	Heimat.		
	Cambrium.	Unter-Silur.	Ober-Silur.	Ost- West- Preussen.	Est- land.	Balti- cum.	Schwe- den.
<i>Cybele rex</i> Nieszk.	—	C ₂ ?	—	—	+	—	—
<i>Eucrinurus obtusus</i> Angel.	—	—	c	—	—	—	+
— cf. <i>obtus</i> Angel.	—	—	c	—	[+]	+	[+]
— cf. <i>Seebachi</i> F. Schm.	—	E	—	—	—	—	—
— <i>punctatus</i> Wahlbg.	—	—	G—K u. b—h	—	—	—	—
<i>Calymene tuberculata</i> Dalm.	—	—	[G—K] c—h	—	[+]	[+]	—
— <i>intermedia</i> Lindst.	—	—	c—d	—	[+]	[+]	—
— <i>spectabilis</i> Ang.	—	—	c—h	—	[+]	[+]	+
<i>Homalonotus</i> cf. <i>rhinotropis</i> Ang.	—	—	?	—	—	—	—
<i>Lichas Salteri</i> Fletcher	—	—	c	—	—	—	+
— <i>illaenoides</i> Nieszk	—	D ₁	—	—	+	—	—
* — <i>Gageli</i> n. sp.	—	F ₁ ?	—	—	—	—	—
— <i>tricuspidata</i> Beyr.	—	C ₁	—	—	+	—	—
— affin. <i>tricuspidatae</i>	—	C ₁	—	—	—	+	—
— <i>proboscidea</i> Dames	—	C ₁	—	—	—	+	—
— <i>Plautini</i> F. Schm.	—	C ₁	—	—	—	—	—
* — <i>media</i> n. sp.	—	C ₁	—	—	—	—	—
— <i>aequiloba</i> Steinh.	—	F ₁	—	—	—	—	—
— <i>deflexa</i> Sjögr.	—	D	—	—	+	—	+
* — <i>Branconis</i> n. sp.	—	C ₂ ?	—	—	—	+	—
— <i>Eichwaldi</i> Nieszk	—	E	—	—	+	—	—
— cf. <i>Pahleni</i> F. Schm.	—	D ₁	—	—	—	—	—
— cf. <i>angusta</i> Beyr.	—	F ₁	—	—	—	+	—
* — <i>Lindströmi</i> n. sp.	—	—	h?	—	—	—	—
— <i>aranea</i> Lindstr.	—	—	c—d	—	—	—	+
<i>Acidaspis mutica</i> Ennur.	—	—	Graptolith.-Gest.	—	—	+	—
<i>Proetus verrucosus</i> Lindstr.	—	—	c	—	—	—	+
— <i>signatus</i> Lindstr.	—	—	d	—	—	—	+
— <i>concinus</i> Dalm.	—	—	c—h H. u. J	—	—	—	—
— affin. <i>concinno</i> Dalm.	—	—	?	—	—	—	—
* — <i>distinctus</i> n. sp.	—	—	Phaseoluskalk	—	—	+	—
* <i>Cyphaspsis parvula</i> n. sp.	—	—	?	—	—	+	—
<i>Iliaenus Jevensis</i> Holm.	—	D ₁ Backst.-Kalk	—	—	+	—	—
— <i>chiron</i> Holm.	—	C ₁ und Ob.-S. Orth.-Kalk	—	—	+	—	+
— <i>tauricornis</i> Kut.	—	C ₁	—	—	+	—	—
— <i>revaliensis</i> Holm.	—	B ₃	—	—	+	—	—
— <i>Schmidti</i> Nieszk	—	C ₁	—	—	+	—	—
— <i>oblongatus</i> Ang.	—	C ₁	—	—	+	—	—
— <i>angustifrons</i> Holm.	—	F ₁	—	—	—	—	—

	Alter.			Vorkommen in		Heimat.		
	Cambrium.	Unter-Silur.	Ober-Silur.	Ost- Preussen.	West- Preussen.	Est- land.	Balti- cum.	Schwe- den.
<i>Illaenus Römeri</i> Volb.	—	F ₁	—	—	—	+	—	—
* — <i>comes</i> n. sp.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—
* — <i>Vanhöffeni</i> n. sp.	—	D ₁	—	—	—	—	+	—
* — <i>bisulcatus</i> n. sp.	—	C ₁	—	—	—	—	+	—
— sp. cf. <i>Dalmanni</i> Volb.	—	C ₁	—	—	—	—	+	—
— <i>Maskei</i> Holm.	—	F ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>Linnarssoni</i> Holm.	—	F ₁	—	—	—	+	[+]	+
* — <i>nuculus</i> n. sp.	—	?	—	—	—	—	+	—
— <i>caecus</i> Holm.	—	F ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>barriensis</i> Murch.	—	—	J, b—h	—	—	+	—	+
— <i>sulcatus</i> Lindstr.	—	—	d—h	—	—	—	—	+
— <i>Holmi</i> Lindstr.	—	—	c—h	—	—	—	—	+
<i>Asaphus riumlosus</i> Angelin	—	Ob. gr. Orth.-K.	—	—	—	—	—	+
— <i>multicostatus</i> Ang.	—	B ₃	—	—	—	—	+	—
— <i>tecticaudatus</i> Steinh.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>undulatus</i> Steinh.	—	Ob. gr. Orth.-K.	—	—	—	—	[+]	+
— cf. <i>aciculatus</i> Ang.	—	Ob. gr. Orth.-K.	—	—	—	—	+	—
* — <i>oculosus</i> n. sp.	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
* — <i>Branconis</i> n. sp.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—
— <i>jevensis</i> Fr. Schm.	—	D ₁	—	—	—	+	—	—
* — <i>Steinhardti</i> n. sp.	—	C ₁	—	—	—	—	+	—
— cf. <i>raniceps</i> Dalm.	—	C ₁	—	—	—	[+]	+	—
* — <i>ornatus</i> n. sp.	—	C ₁	—	—	—	[+]	+	—
* — <i>obtusus</i> n. sp.	—	?	—	—	—	—	+	—
— <i>devexus</i> Eichwald	—	C ₁	—	—	—	+	—	—
— cf. <i>platyurus</i> Ang.	—	Ob. gr. Orth.-K.	—	—	—	—	—	+
— <i>platyrhachis</i> Steinh.	—	F ₁	—	—	—	+	—	—
<i>Megalaspis limbata</i> Böck.	—	Ob. rot. Orth.-K.	—	—	—	—	—	+
— — var. <i>elongata</i>	—	B ₃	—	—	—	[+]	+	[+]
— <i>gigas</i> Angel.	—	Ob. rot. Orth.-K.	—	—	—	—	—	+
— <i>planilimbata</i> Angel.	—	B ₃	—	—	—	+	—	—
<i>Nileus armadillo</i> Dalm.	—	Ob. roter u. gr. Orthoc.-Kalk	—	—	—	—	—	+
* <i>Holometopus?</i> <i>gracilis</i> n. sp.	—	Gr. Orth.-Kalk	—	—	—	—	+	—
* — <i>laevis</i> n. sp.	—	Roter Orth.-K.	—	—	—	—	—	+
* — <i>radiatus</i> n. sp.	—	?	—	—	—	—	+	—
* <i>Remopleurides Jentzschii</i> n. sp.	—	C ₁	—	—	—	—	+	—
<i>Olenus truncatus</i> Brunn.	Olenusschiefer	—	—	—	—	—	—	+
<i>Sphaerophthalmus alatus</i> Boeck.	Olenusschiefer	—	—	—	—	—	—	+
<i>Peltura scarabaeoides</i> Wahlbg.	Olenusschiefer	—	—	—	—	—	—	+

Unsere Trilobitenfauna besteht also aus:

5 Arten und Varietäten vom Alter des Cambrium					
83	"	"	"	"	Unter-Silur
27	"	"	"	"	Ober-Silur.
Davon kommen sowohl in Ost- als Westpreussen vor . . 54					
allein Ostpreussen gehören an 46					
„ Westpreussen „ „ 15					

Das Verhältniß der Trilobitenfauna der einzelnen Provinzen in Bezug auf Alter und Heimat der Form wird durch folgende Tabelle erläutert:

		Estland.	Balticum.	Schweden.	Estland und Schweden.	
I. Ost-Preussen:	Cambrium .	—	—	2	—	2
	Unter-Silur .	37	24	9	7	77
	Ober-Silur .	—	7	10	4	21
		37	31	21	11	100
		= 37 %	= 31 %	= 21 %	= 11 %	
II. West-Preussen:	Cambrium .	—	—	5	—	5
	Unter-Silur .	21	10	7	7	45
	Ober-Silur .	—	2	13	4	19
		21	12	25	11	69
		= 30,4 %	= 17 %	= 36,2 %	= 16 %	

Ein Vergleich dieser Zahlen ergibt, dass sich die Trilobitenfauna Ostpreussens mehr an Estland, die Westpreussens mehr an Schweden anlehnt: Ein abermaliger Beweis für die bereits von Nötling und Kiesow im Allgemeinen und von Gagel¹⁾ in Bezug auf die Brachiopoden gefundene Thatsache. Eigentümlich ist es ferner, dass wir keine Trilobiten aus dem Estländischen Cambrium und ebenso keine specifisch estländische obersilurische Trilobitenform haben, während die Hauptmasse unserer untersilurischen Trilobiten — 48 resp. 47 % — auf Estland zurückzuführen ist.

1) cf. C. Gagel: Die Brachiopoden d. cambr. u. sil. Gesch. d. Prov. Ost- u. Westpr., Diss. 1890. pag. 71 u. 72.

Nach Fertigstellung des Druckes der Arbeit erhielt ich noch mehrere, für das Diluvium unserer Provinzen neue Trilobitenformen: Ampyx sp. aus Glaukonitkalk, Symphysurus sp. aus Ob. rot. Orthocerenkalk, Calymene sp. aus einem gelbbraunen, etwas sandigen Kalke, welche ich leider in diese Arbeit nicht mehr aufnehmen konnte.

Inhaltsverzeichnis für den Palaeontologischen Teil.

	Seite.	Taf.	Fig.		Seite.	Taf.	Fig.
Acaste siehe Phacops.				Conolichas siehe Lichas.			
Acidaspis mutica Emmr.	53	VI	30	Cybele cf. Grewingki F. Schm.	37	V	17
Agnostus pisiformis Linné	14	IV	23	revaliensis F. Schm.	36	V	16
— var. socialis Tullb.	15	IV	24	rex. Nieszk.	37	V	15
Amphion priscus n. sp.	35	II	19	Cyphaspis parvula n. sp.	57	VI	28
Ampyx culminatus Ang.	17	IV	22	Cyrtometopus siehe Cheirurus.			
foveolatus Ang.	16	IV	17	Dalmania siehe Phacops.			
rostratus Sars.	16	IV	18	Encrinurus obtusus Ang.	39	V	25
setirostris Ang.	17			punctatus Emmr.	40	V	20
Arges siehe Lichas.				cf. Seebachi F. Schm.	39	V	24
Asaphus cf. aciculatus Angel.	75	V	5	Harpes Spaski Eich.	15	IV	29
Branconis n. sp.	78	V	3	Homalonotus cf. rhinotropis Ang.	42		
devexus Eichw.	82	VI	9	Homolichas siehe Lichas.			
jevensis F. Schm.	78	IV	5	Holometopus gracilis n. sp.	86	V	8
multicostatus Ang.	73			laevis n. sp.	86	V	9
obtusus n. sp.	81	IV	8	radiatus n. sp.	87	IV	16
oculosus n. sp.	75	IV	1	Hoplolichas siehe Lichas.			
ornatus n. sp.	80	VI	3	Isotelus siehe Asaphus.			
cf. platyrus Ang.	82	VI	8	Illaenus angustifrons Holm	65	III	12
platyrhachis Steinh.	82	V	7	barriensis Murch	70	III	26
cf. raniceps Dalm.	79	VI	10	bisulcatus n. sp.	67	III	18
rimulosus Ang.	72	IV	13	caecus Holm	70	III	21
tecticaudatus Steinh.	74	IV	10	chiron Holm	60	III	4
Steinhardti n. sp.	79	V	1	comes n. sp.	66	III	19
undulatus Steinh.	75	IV	12	cf. Dalmanni Volb.	68	II	36
Bumastus siehe Illaenus.				Holmi Lindstr.	72	III	30
Calymene intermedia Lindst.	41	VI	20	jevensis Holm	59	III	1
spectabilis Ang.	42	VI	21	Linnarssoni Holm	69	III	13
tuberculata Dalm.	40	VI	19	Mascke Holm	68		
Chasmops siehe Phacops.				nuculus n. sp.	69	VI	34
Cheirurus cephaloceras Nieszk.	34	II	13	oblongatus Holm	64	II	39
clavifrons Dalm.	32	II	11	revaliensis Holm	63	III	14
dubius n. sp.	31	II	7	Roemeri Volb.	66	III	16
exsul Beyr.	28	II	1	Schmidti Nieszk.	63	III	6
gladiator Eichw.	29	II	3	sulcatus Lindstr.	71	III	28
macrophthalma Kut	29	II	5	tauricornis Kut	61	III	8
Gotlandicus Lindstr.	30	II	9	Vanhöffeni n. sp.	67	III	17
cf. Plautini F. Schm.	32	III	8	Lichas aequiloba Steinh.	48	V	14
pseudohemieranium Nieszk.	32	II	15	cf. angusta Beyr.	52	II	34
speciosus His.	31	II	6	aranea Lindst.	53	V	11
variolaris Linnrs.	33	II	12	Branconis n. sp.	48	II	26

	Seite	Taf.	Fig.		Seite	Taf.	Fig.
<i>Lichas detlexa</i> Sjögr.	49	II	30	<i>Phacops exilis</i> Eichw.	21	I	15
<i>Eichwaldi</i> Nieszk.	50	VI	16	<i>imbricatula</i> Ang.	20	I	29
<i>Gageli</i> n. sp.	44	II	33	<i>Kegelensis</i> F. Schm.	22	I	19
<i>illaenoides</i> Nieszk.	43	V	12	<i>laevigata</i> F. Schm.	21	I	20
<i>Lindströmi</i> n. sp.	52	V	10	<i>latifrons</i> Burm.	18	VI	15
<i>media</i> n. sp.	47	II	25	<i>macroura</i> Sjögr.	25	I	7
cf. <i>Pahleni</i> F. Schm.	51	II	28	cf. <i>marginata</i> F. Schm.	23	I	1
<i>Plautini</i> F. Schm.	46	VI	18	<i>maxima</i> F. Schm.	25	I	13
<i>proboscidea</i> Dames	47			<i>Odini</i> Eichw.	22	I	2
<i>tricuspidata</i> Beyr.	45	II	20	<i>praeurrens</i> F. Schm.	22	I	4
affin. <i>tricuspidatae</i> Beyr.	46	II	23	<i>prussica</i> n. sp.	18	I	28
<i>Salteri</i> Fletch.	43	VI	17	<i>Wesenbergensis</i> F. Schm.	25	I	14
<i>Megalaspis gigas</i> Angel.	84	V	6	<i>Phaëtonides</i> Barr.	58		
<i>limbata</i> Boeck	83	IV	14	<i>Peltura scarabaeoides</i> Wahlbg.	89	IV	28
—var. <i>elongata</i>	83	IV	15	<i>Proëtus concinnus</i> Dalm.	55	VI	27
<i>planilimbata</i> Ang.	84	VI	2	affin. <i>concinno</i> Dalm.	55	VI	26
<i>Nieszkowskia</i> siehe <i>Cheirurus</i> .				<i>distinctus</i> n. sp.	56	VI	23
<i>Nileus armadillo</i> Dalm.	84	III	32	<i>signatus</i> Lindstr.	54	VI	22
<i>Olenus truncatus</i> Brunn.	88	IV	25	<i>verrucosus</i> Lindstr.	54	V	27
<i>Phacops bucculenta</i> Ang.	24	I	16	<i>Pterygometopus</i> siehe <i>Phacops</i> .			
<i>caudata</i> Emmer.	20	I	30	<i>Remopleurides Jentzschii</i> n. sp.	87	I	31
<i>Downingiae</i> Murch.	19	I	27	<i>Sphaerexochus</i> sp.	36	II	18
<i>Eichwaldi</i> F. Schm.	25	I	21	<i>Sphaerophthalmus alatus</i> Boeck.	89	IV	27
cf. <i>Eichwaldi</i> Schmidt	25	I	6				

Tafel-Erklärungen.

[Pr. M. K.] = Samml. d. Prov.-Mus. Königsberg.

[M. I. K.] = „ d. Min.-Inst. Königsberg.

[S. K. D.] = „ d. Herrn Dr. Kiesow-Danzig.

[S. V. W.] = „ d. Herrn Dr. Vanhöffen-Wehlau.

[S. Z. H.] = „ d. Herrn Lehrer Zinger-Pr. Holland.

[S. S. B.] = „ d. Herrn Konrektor Seydler-Braunsberg.


[S. P. K.] = meine Sammlung.

Erklärung der Tafel I.

Fig. 1. a. b.	Phacops cf. marginata Fr. Schmidt.	Königsberg.	[Pr. M. K.]	Seite 23
Fig. 2. a.	Phacops Odini Eichw.	Ostpr.	[M. I. K.]	" 22
Fig. 3.	Phacops cf. marginata Fr. Schmidt.	Königsberg.	[Pr. M. K.]	" 23
Fig. 4. a.	Phacops praecurrens. Fr. Schmidt.	Wehlau.	[Pr. M. K.]	" 22
Fig. 5.	Phacops sp. [? bucculenta].	Wehlau.	[Pr. M. K.]	" 27
Fig. 6.	Phacops sp. [? Eichwaldi].	Ostpr.	[M. I. K.]	" 27
Fig. 7. 7a.	Phacops macroura Sjögr.	Detmitten.	[Pr. M. K.]	" 25
Fig. 8.	"	"	Heilsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 9.	"	"	Ostpr. [M. I. K.]	
Fig. 10.	"	"	Ostpr. [M. I. K.]	
Fig. 11.	"	"	Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 12.	Phacops maxima Fr. Schmidt.	Hypostom.	Cranz. [Pr. M. K.]	" 26
Fig. 13. 13a.	"	"	Schwanzschild. Wargitten. [Pr. M. K.]	
Fig. 14. 14a.	Phacops Wesenbergensis Fr. Schmidt.	Wehlau.	[Pr. M. K.]	" 25
Fig. 15.	"	"	Kruglanken. [Pr. M. K.]	
Fig. 16.	Phacops bucculenta Ang.	Wargitten.	[Pr. M. K.]	" 24
Fig. 17.	"	"	Cranz. [Pr. M. K.]	
Fig. 18.	Phacops exilis Eichw.	Soritten.	[Pr. M. K.]	" 21
Fig. 19.	Phacops Kegelensis. Fr. Schmidt.	Kaidau.	[Pr. M. K.]	" 22
Fig. 20. a. b. c.	Phacops laevigata Fr. Schmidt.	Gr. Schönau.	[Pr. M. K.]	" 21
Fig. 21.	Phacops Eichwaldi Fr. Schmidt.	Wehlau.	[S. V. W.]	" 27
Fig. 22. 23.	"	"	Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 24.	Phacops sp. [? marginata].	Königsberg.	[Pr. M. K.]	" 23
Fig. 25.	Phacops sp. [? Panderi].	Königsberg.	[Pr. M. K.]	" 27
Fig. 26.	Phacops sp. Lauth bei Königsberg.		[Pr. M. K.]	" 28
Fig. 27. a. b. c.	Phacops Downingiae Murch.	Belschwitz.	[M. I. K.]	" 19
Fig. 28. 28a.	Phacops prussica n. sp.	Cranz.	[S. P. K.]	" 18
Fig. 29.	Phacops imbricatula Ang.	Kamiontken.	[Pr. M. K.]	" 20
Fig. 30. 30a.	Phacops caudata Emmr.	Dirschkeim.	[M. I. K.]	" 20
Fig. 31. a. b.	Remopleurides Jentzschii n. sp.	Wilhelmswalde.	[Pr. M. K.]	" 87
Fig. 32.	Phacops sp. [cf. macroura].	Ostpr.	[M. I. K.]	" 28

POMPECKI: TRILOBITEN.

Beitrage zur Naturkunde Preussens, VII 1890



POMPECKI: TRILOBITEN.

Beiträge zur Naturkunde Preussens VII. 1890.

Taf. II




Erklärung der Tafel II.

Fig. 1.	<i>Cheirurus exsul</i> Beyr. Königsberg. [Pr. M. K.] — Das Wangenhorn nach einem anderen Stück	Seite 28
Fig. 2.	<i>Cheirurus exsul</i> Beyr. Hypostom. Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 3.	„ „ „ „ „ forma gladiator Eichw. Rosenberg. [M. I. K.]	„ 29
Fig. 4.	„ „ „ „ „ „ Wehlau. [S. V. W.]	
Fig. 5. 5a.	„ „ „ „ „ forma macrophthalma. Rosenberg. [M. I. K.]	„ 29
Fig. 6.	<i>Cheirurus speciosus</i> His. Rosenberg. [M. I. K.]	„ 31
Fig. 7.	<i>Cheirurus dubius</i> n. sp. Rosenberg. [M. I. K.]	„ 31
Fig. 8. 8a.	<i>Cheirurus</i> cf. <i>Plautini</i> Fr. Schmidt. Wehlau. [S. V. W.] 4/1	„ 32
Fig. 9. 10.	<i>Cheirurus gotlandicus</i> Lindstr. Rosenberg. [Pr. M. K.]	„ 30
Fig. 11.	<i>Cheirurus clavifrons</i> Dalm. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 32
Fig. 12. 12a.	<i>Cheirurus variolaris</i> Linnrs. Wehlau. [S. V. W.]	„ 33
Fig. 13. 13a.	<i>Cheirurus cephaloceras</i> Nieszk. Wehlau. [M. I. K.]	„ 34
Fig. 14.	<i>Cheirurus?</i> sp. Kurschitten (Kurland). [Pr. M. K.]	„ 35
Fig. 15.	<i>Cheirurus pseudoemicranium</i> Nieszk. Ostpr. [M. I. K.]	„ 32
Fig. 16.	„ „ „ „ „ Königsb. [Pr. M. K.]	
Fig. 17.	<i>Cheirurus dubius</i> n. sp. Rosenberg. [M. I. K.]	„ 31
Fig. 18.	<i>Sphaerexochus?</i> sp. Fundort unbek. [Pr. M. K.]	„ 36
Fig. 19. 19a.	<i>Amphion priscus</i> n. sp. Belschwitz. [M. I. K.]	„ 35
Fig. 20.	<i>Lichas tricuspidata</i> Beyr. [Kopie nach Schmidt Rev. II, Taf. II, Fig. 12.]	„ 45
Fig. 21.	„ „ „ „ „ Wehlau. [M. I. K.]	
Fig. 22.	„ „ „ „ „ [Kopie nach Schmidt Rev. II, Taf. II, Fig. 13.]	
Fig. 23.	<i>L. affin. tricuspidatae</i> Beyr. Wehlau. [S. V. W.]	„ 46
Fig. 24.	<i>L. sp. [? tricuspidata]</i> . Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 45
Fig. 25. 25a.	<i>Lichas media</i> n. sp. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 47
Fig. 26. 26a.	<i>Lichas Branconis</i> n. sp. Wehlau. [M. I. K.]	„ 48
Fig. 27.	<i>Lichas Eichwaldi</i> Nieszk. Wehlau. [Pr. M. K.]	„ 50
Fig. 28. ab. 29. 31.	<i>Lichas</i> cf. <i>Pahleni</i> Fr. Schmidt. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 51
Fig. 30. 30a.	<i>Lichas deltoxa</i> Sjogr. [Kopie n. Fr. Schmidt. Rev. II, Taf. IV, Fig. 24.]	„ 49
Fig. 32.	<i>Lichas Plautini</i> Fr. Schmidt. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 46
Fig. 33. 33a.	<i>Lichas Gageli</i> n. sp. Cranz. [S. P. K.] 3/1	„ 44
Fig. 34.	<i>Lichas</i> cf. <i>angusta</i> Beyr. Wehlau. [Pr. M. K.]	„ 52
Fig. 35.	<i>Lichas</i> sp. Wehlau. [Pr. M. K.]	„ 52
Fig. 36. 36a.	<i>Iliaenus</i> sp. cf. <i>Dalmanni</i> Volb. Ostpr. [M. I. K.]	„ 68
Fig. 37. a. b.	<i>Iliaenus oblongatus?</i> Holm. Ostpr. [M. I. K.]	„ 64
Fig. 38. a. b.	<i>Iliaenus</i> sp. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 72
Fig. 39.	<i>Iliaenus oblongatus</i> Holm. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 64

Erklärung der Tafel III.

Fig. 1. 1a.	<i>Illaenus jevensis</i> Holm.	Königsberg. [Pr. M. K.]	Seite 59
Fig. 2.	" " "	Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 3.	" " "	(auf Backsteinkalk). Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 4. 4a.	<i>Illaenus chiron</i> Holm.	Marienwerder. [Pr. M. K.]	" 60
Fig. 5.	" " "	Marienwerder. [Pr. M. K.]	
Fig. 6.	<i>Illaenus Schmidtii</i> Nieszk.	Pr. Holland. [M. I. K.]	" 63
Fig. 7.	" " "	Wilhelmswalde. [Pr. M. K.]	
Fig. 8.	<i>Illaenus tauricornis</i> Kut.	Königsberg. [Pr. M. K.]	" 61
Fig. 9.	" " "	Ostpr. [M. I. K.]	
Fig. 10.	" " "	Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 11.	" " "	Rosenberg. [M. I. K.]	
Fig. 12. 12a.	<i>Illaenus angustifrons</i> Holm.	Ostpr. [M. I. K.]	" 65
Fig. 13.	<i>Illaenus Linnarssoni</i> Holm.	Ostpr. [M. I. K.]	" 69
Fig. 14.	<i>Illaenus revaliensis</i> Holm.	Ostpr. [M. I. K.]	" 65
Fig. 15. 15a.	" " "	Pr. Holland. [M. I. K.]	
Fig. 16.	<i>Illaenus Roemeri</i> Volb.	Ostpr. [M. I. K.]	" 66
Fig. 17. 17a.	<i>Illaenus Vanhoeffeni</i> n. sp.	Wehlau. [S. V. W.]	" 67
Fig. 18.	<i>Illaenus bisulcatus</i> n. sp.	Wehlau. [M. I. K.]	" 67
Fig. 19.	<i>Illaenus comes</i> n. sp.	Königsberg. [Pr. M. K.]	" 66
Fig. 20.	<i>Illaenus</i> sp.	Wehlau. [S. V. W.]	" 72
Fig. 21. 21a.	<i>Illaenus caecus</i> Holm.	Belschwitz. [M. I. K.]	" 70
Fig. 22.	<i>Illaenus</i> sp.	Königsberg. [Pr. M. K.]	" 72
Fig. 23.	<i>Illaenus</i> sp. [? <i>Linnarssoni</i>].	Wehlau. [M. I. K.]	" 69
Fig. 24.	<i>Illaenus</i> sp. cf. <i>Dalmanni</i> Volb.	Ostpr. [M. I. K.]	" 68
Fig. 25.	<i>Illaenus</i> sp.	Wehlau. [M. I. K.]	" 72
Fig. 26.	<i>Bumastus barriensis</i> Murch.	Rosenberg. [Pr. M. K.]	" 70
Fig. 27.	" " "	Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 28. a. b.	<i>Bumastus sulcatus</i> Lindstr.	Ostpr. [M. I. K.]	" 71
Fig. 29.	" " "	Wehlau. [Pr. M. K.]	
Fig. 30.	<i>Bumastus Holmi</i> Lindstr.	Rosenberg. [M. I. K.]	" 72
Fig. 31.	<i>Nileus?</i> sp.	Rosenberg. [M. I. K.]	" 85
Fig. 32.	<i>Nileus armadillo</i> Dalm.	Pr. Holland. [M. I. K.]	" 84
Fig. 33.	<i>Nileus</i> sp.	Marienwerder. [Pr. M. K.]	" 85


POMPECKI: TRILOBITEN.



POMPECKI: TRILOBITEN.

Beitrage zur Naturkunde Preussens, VII, 1890.

Taf. IV



Erklärung der Tafel IV.


Fig. 1.	Asaphus oculus n. sp.	Königsberg.	[Pr. M. K.]	Seite 75
Fig. 2.	"	"	"	Königsberg.	[Pr. M. K.]
Fig. 3.	"	"	"	Königsberg.	[Pr. M. K.]
Fig. 4.	"	"	"	Königsberg.	[Pr. M. K.]
Fig. 5.	Asaphus jevensis	Fr. Schmidt.	Gr. Schönau.	[Pr. M. K.] " 75
Fig. 6.	"	"	"	Trömpau.	[Pr. M. K.]
Fig. 7.	Asaphus sp.	Strand bei Rosehnen.	[Pr. M. K.]	" 77
Fig. 8. 9.	Asaphus obtusus n. sp.	Königsberg.	[Pr. M. K.]	" 81
Fig. 10.	Asaphus tecticaudatus	Steinh.	Königsberg.	[Pr. M. K.] " 71
Fig. 11.	"	"	"	Königsberg.	[Pr. M. K.]
Fig. 12.	Asaphus undulatus	Steinh.	Pr. Holland.	[M. J. K.] " 75
Fig. 13.	Asaphus rimulosus	Ang.	Königsberg.	[Pr. M. K.] " 72
Fig. 14.	Megalaspis limbata	Boeck.	Königsberg.	[Pr. M. K.] " 80
Fig. 15.	Megalaspis limbata	Boeck.	var. elongata n. var.	Rosenberg.	[M. I. K.] " 80
Fig. 16.	Holometopus? radiatus n. sp.	Königsberg.	[Pr. M. K.]	" 87
Fig. 17. 17a.	Ampyx foveolatus	Aug.	Königsberg.	[Pr. M. K.] " 10
Fig. 18. 19. 20.	Ampyx rostratus	Sars.	Wehlau.	[Pr. M. K.] " 10
Fig. 21. 21a.	"	"	"	Königsberg.	[M. I. K.]
Fig. 22.	Ampyx culminatus	Ang. 4/1.	Königsberg.	[Kop. n. Steinh., Taf. IV, Fig. 11.] " 17
Fig. 23. 23a.	Agnostus pisiformis	Linné.	Neukuhren?	[Pr. M. K.] " 13
Fig. 24. 24a. 24b.	Agnostus pisiformis	L. var. socialis	Tullb.	Marienwerder.	[Pr. M. K.] " 15
Fig. 25a. b. 26.	Olenus truncatus	Brünn. 3/1.	Marienwerder.	[Pr. M. K.] " 88
Fig. 27. 27a.	Sphaerophthalmus alatus	Boeck. 4/1.	Marienwerder.	[Pr. M. K.] " 80
Fig. 28.	Peltura scarabaeoides	Wahlbg. 2/1.	Marienwerder.	[Pr. M. K.] " 80
Fig. 29.	Harpes	Spasski.	Eichw.	[Kopie n. Steinh., Taf. V, Fig. 6.] " 15

Erklärung der Tafel V.

Fig. 1. a. b. <i>Asaphus Steinhardti</i> n. sp. Ostpr. [M. I. K.]	Seite 79
Fig. 2. <i>Asaphus</i> sp. [? ornatus]. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 80
Fig. 3. a. b. <i>Asaphus Branconis</i> n. sp. Craussen. [Pr. M. K.]	„ 78
Fig. 4. <i>Asaphus</i> sp. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 73
Fig. 5. <i>Asaphus</i> cf. <i>aciculatus</i> Ang. Spengawskens. [S. K. D.]	„ 75
Fig. 6. <i>Megalaspis gigas</i> Ang. Westpr. [M. I. K.]	„ 84
Fig. 7. <i>Asaphus platyrhachis</i> Steinh. Ostpr. [M. I. K.]	„ 82
Fig. 8. 8a. <i>Holometopus?</i> <i>gracilis</i> n. sp. Marienwerder. [Pr. M. K.]	„ 86
Fig. 9. <i>Holometopus?</i> <i>laevis</i> n. sp. Königsberg. [M. I. K.]	„ 86
Fig. 10. <i>Lichas Lindströmi</i> n. sp. 3/1. Wehlau. [S. V. W.]	„ 52
Fig. 11. <i>Lichas aranea</i> Lindstr. Marienwerder. [Pr. M. K.]	„ 53
Fig. 12. <i>Lichas illaenoides</i> Nieszk. [Kopie nach Steinh., Taf. III, Fig. 7a.]	„ 43
Fig. 13. „ „ „ [Kopie n. Schmidt Rev. II, Taf. III, Fig. 30a.]	
Fig. 14. <i>Lichas acquiloba</i> Steinh. [Kopie n. Schmidt Rev. II, Taf. V, Fig. 8a.]	„ 48
Fig. 15. 15a. <i>Cybele rex</i> Nieszk. 3/1. Wehlau. [S. P. K.]	„ 37
Fig. 16. <i>Cybele revaliensis</i> F. Schmidt. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 36
Fig. 17. 17a. <i>Cybele</i> cf. <i>Grewingki</i> Fr. Schmidt (2/1). Wehlau. [S. V. W.]	„ 37
Fig. 18. <i>Cybele</i> sp. a. Königsberg. [Pr. M. K.]	„ 38
Fig. 19. <i>Cybele revaliensis</i> Fr. Schmidt. Westpr. [M. I. K.]	„ 36
Fig. 20. a. b. <i>Encrinurus punctatus</i> Wahlbg. Wormditt. [Pr. M. K.]	„ 40
Fig. 21. 22. „ „ „ Königsberg. [Pr. M. K.]	
Fig. 23. 23a. <i>Encrinurus</i> sp. Mewe. [Pr. M. K.]	„ 40
Fig. 24. 24a. <i>Encrinurus</i> cf. <i>Seebachi</i> . Fr. Schmidt. Königsberg. [S. P. K.]	„ 39
Fig. 25. 25a. <i>Encrinurus obtusus</i> Ang. Wehlau. [S. V. W.]	„ 39
Fig. 26. <i>Phacops</i> sp. Ostpr. [M. I. K.]	
Fig. 27. <i>Proetus verrucosus</i> Lindstr. Belschwitz. [M. I. K.]	„ 54

POMPECKI: TRILOBITEN.


Beiträge zur Naturkunde Preussens VII, 1890



POMPECKI: TRILOBITEN.

Beitrage zur Naturkunde Preussens. VII. 1890.

Taf. VI.



Erklärung der Tafel VI.

Fig. 1.	<i>Megalaspis limbata</i> Boeck. Rosenberg. [M. I. K.]	Seite 83
Fig. 2.	<i>Megalaspis planilimbata</i> Angel. Braunsberg. [S. S. B.]	"
Fig. 3.	<i>Asaphus ornatus</i> n. sp. Ostpr. [M. I. K.]	"
Fig. 4.	" " " Königsberg. [Pr. M. K.]	"
Fig. 5.	" " " Ostpr. [M. I. K.]	"
Fig. 6.	" " " Königsberg. [Pr. M. K.]	"
Fig. 7.	<i>Asaphus</i> sp. Bischofswerder. [Pr. M. K.]	" 80
Fig. 8.	<i>Asaphus</i> cf. <i>platyurus</i> Ang. Marienwerder. [Pr. M. K.]	" 82
Fig. 9.	<i>Asaphus devexus</i> Eichw. Pr. Holland. [M. I. K.]	" 82
Fig. 10.	10a. 10b. <i>Asaphus</i> cf. <i>raniceps</i> Dalm. Königsberg. [Pr. M. K.]	" 79
Fig. 11.	" " " " Marienwerder. [Pr. M. K.]	"
Fig. 12.	<i>Asaphus</i> sp. [? <i>latisegmentatus</i>]. Marienwerder. [Pr. M. K.]	" 81
Fig. 13.	<i>Asaphus</i> sp. Königsberg. [Pr. M. K.]	" 81
Fig. 14.	<i>Niobe</i> sp. Königsberg. [Pr. M. K.]	" 84
Fig. 15.	15a. <i>Phacops latifrons</i> Burm. ? Braunsberg. [S. S. B.]	" 18
Fig. 16.	<i>Lichas Eichwaldi</i> Nieszk. Belschwitz. [M. I. K.]	" 50
Fig. 17.	<i>Lichas Salteri</i> Fletch. Gumbinnen. [M. I. K.]	" 48
Fig. 18.	<i>Lichas Plautini</i> Fr. Schmidt. Ostpr. [M. I. K.]	" 46
Fig. 19.	a. b. c. <i>Calymene tuberculata</i> Dalm. Marienburg. [Pr. M. K.]	" 40
Fig. 20.	20a. <i>Calymene intermedia</i> Lindstr. Belschwitz. [M. I. K.]	" 41
Fig. 21.	<i>Calymene spectabilis</i> Ang. Wargitten. [Pr. M. K.]	" 42
Fig. 22.	<i>Proëtus signatus</i> Lindström. 2/1. Pr. Holland. [Pr. M. K.]	" 54
Fig. 23.	<i>Proëtus distinctus</i> n. sp. 2/1. Königsberg. [M. I. K.]	" 56
Fig. 24.	<i>Proëtus</i> sp. 2/1. Königsberg. [Pr. M. K.]	" 57
Fig. 25.	<i>Proëtus</i> sp. Belschwitz. [M. I. K.]	" 57
Fig. 26.	<i>Proëtus</i> affin. <i>concinno</i> Dalm. 3/1. Königsberg. [Pr. M. K.]	" 55
Fig. 27.	<i>Proëtus concinnus</i> Dalm. 2/1. Ragnit. [Pr. M. K.]	" 55
Fig. 28.	28a. <i>Cyphaspis parvula</i> n. sp. 3/1. Königsberg. [Pr. M. K.]	" 57
Fig. 29.	<i>Cyphaspis</i> sp. 3/1. Pr. Holland. [S. Z. H.]	" 58
Fig. 30.	31. <i>Acidaspis mutica</i> Emmr. 2/1. Pr. Holland. [S. Z. H.]	" 53
Fig. 32.	<i>Encrinurus punctatus</i> Wahlbg. Detmitten. [Pr. M. K.]	" 40
Fig. 33.	<i>Phacops Odini</i> Eichw. Ostpr. [M. I. K.]	" 22
Fig. 34.	<i>Illaenus nculus</i> n. sp. Ostpr. [M. I. K.]	" 69
Fig. 35.	<i>Cybele</i> sp. b. 2/1. Belschwitz. [M. I. K.]	" 38

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00755 1591

